

Proton

49. ^{perplexifolium} *P. foliis cordatis lanceolatis subrepandis subtus in anis petiolis subtus
apice glandulis sphaericis raris in aruncationis*
50. flavum *P. foliis cordatis oblongis integerrimis utrinque tomentosis, ramulis densius tomentosis*
51. balsamiferum *P. foliis cordato-ovatis lanceolatis subserrulatis utrinque tomentosis subtus
in anis glandulosis*
52. affrotes *P. foliis ovalibus subcordatis integerrimis utrinque stellatis tomentosis, ramulis
densius tomentosis*
53. Crassifolium *P. foliis cordato-ovatis integerrimis utrinque tomentosis margine tomen
toso ciliatis, glandulis petiolaribus pedicellatis*
54. humile *P. foliis cordatis integerrimis scabris subserratis subtus tomentosis, caule striato*
55. pyriforme *P. foliis cordato-ovatis crenatis lobatis subtus villosis, glandulis in apice
petioli sessilibus raris*
56. gossypifolium *P. foliis cordatis trilobis tomentosis, petioli subtus glandulis sessilibus
apice glandulosis*
57. lobatum *P. foliis inermi serratis inferioribus quinquelobis, superioribus trilobis*
58. frunopura *P. foliis palmatis quinquelobi serratis, foliis caule adpresso
subsessilibus*

bedonin Dept. Thaur

montanum

Croton foliis ovatis remote glandulose serratis supra glabris lobis
subtus argenteis, ramis elongatis

Habitat in Guadeloupe ~~pro~~ locis montosis Forst 5

Rami teretes, apice angulati, ciliati. Folia petiolata, palmata et ul-
tra, pinnata utraque tomentosa - incana, trinerviâ, venosa, acuta: glandula
vis in apice petioli supra. Pedunculis terminalibus, ut. flores incani,
angulati: pedicelli aggregati. Flores foeminei inferne.

oppositifolium Croton foliis subcordato-ovatis denticulatis subtus petiolisque tomento

sis.

Habitat in Guinea Desf 5

Rami teretes, oppositi, glabri, fustis purpurascens, superae incani. Folia
petiolata, bi-^{lani}-s. tripollicaria, attenuata, supra obsolete venosa glabra, re
motè denticulata, subtus incana. Stipulae minutae, petalae 2. Spicae
terminales, in cano.

5 Stur foliosum

Proton

Habitat in Teglonia Nonij. herb Royeni & Gall martha Cergalerfun

Saccus Cr. sesquiflori

♂ Cal. 5 que sedui, campanulatus. Petala 5, Nectano campanulato margine cinnato, erecta, ovata, apice parum laciniata, Calyce minor. Filamenta 5 que adelphica, basi nectano innata, basi campanulata, apice soluta, longitudine calycis. Anthera parva, globosa, sapor carine. Styli 3. steriles, Disco anthera uniti

♀ Cal. et Cor. utra mare. Nectar. ut in mare. Germe globosum, trifidum, glabrum. Styli tres depressi, planiusculi, germine parum longiores. Stigmata bifida, obtusiuscula, parum latiora, rubra. Capsula tuberculata, tuberculorum elastice. Filiceno. Semina solitaria Nonij

nūtans ^{Croton} ~~ovato~~ ^{ovato} ~~subrotundis~~ ^{subrotundis} acuminatis undulatis glabris ^{nūtans} ~~mutantibus~~
~~est prodr. pag. 67. glandulis marginalibus glandulosis~~
Habitat in Societate americana et novarum Hebriidum Tafala

Similis C. I.

[Litr. Bb. pag. 97.]

Croton nūtans foliis rhombico-subrotundis acuminatis undulatis
glabris nūtans ~~est prodr. pag. 67.~~
Habitat in Societate americana et novarum Hebriidum Tafala

Similis C. sebiferis et folia minus acuminata. glandulo
~~non in petiolo ad insertionem foliorum sed parum supra~~
~~basin in eplo fere margini parum supra basin.~~ ^{subtis.}
Spica elongata. flores distincti

300 sebiferum C. foliis rhombico-^{ovatis} acuminatis glabris glandulis
subpetiolantibus. ^{planis}

febriferum & foliis rhombeo ovatis acuminatis integerrimis glabris linc. Spic.
pl. pag. 1425. & S. V

Ricinus chinensis febrifera, populi nigro folio Pet. Gar. 53. t. 34. fig. 3.
Euonymo affinis senarum, populi nigro folio tri-capsulari, granis
nigris candidissima substantia obductis, febrifera Pluk. amalt.
76. tab. 390. fig. 2.

Habitat in China humidis

Tota glabra. Folii petiolata fissura fere Populi tremula venis
simplicibus subtus glaucescentibus. glandulo duo sessiles ad
basin petiol. apicem petiol. ^{supra} Spica terminalis bracteis

planis glabris glandulis petiolaribus

Speciem Sapi credit Gussone
Stallone Sineses secundum Richard

Pespetiflorum. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis glabris, floribus
sessilibus axillaribus dioicis pentandris Sw. prodr. pag. 100.

Habitat in Hispaniola ramuli veluti
Rami teretes a caesp. foliorum serotina tuberculati. folia petiolati
ovato oblonga vel sub elliptica utroque modo bipollicaria sub
cylindrica nervosa areata. flores plures in axillis
Hamulae sive distincta ~~Rubra~~, dioica. Genus distinctum a familia Rham-
nonum

~~nonum~~

tomentosum Couston

Habitat

herb Thouni

Totum tomentosum incanum. Folia subperfoliata, pollicaria, lanceolata, integerrima, obtusissima, mucronata. Spicae laterales et terminales, pollicares. Calycis laciniis ovatis.

Chrysothalle ~~Medetoma~~

fernyneum Boston

Dioscorea Cr.

Habitat in insula St. Crucis ad Lima - Tree Bay, Peru
Folia oblonga subtus tomentosa.

Senyol Galam Proton

Habitat ad Senyol Galam Dedit Kuisen

Launnum Q. foliis oblongis acutis integerrimis confertibus glabris,
petiolis scabris foliisque subtus punctatis; ramis axillaribus
longissimis patulis; caule arborecente *Pw. prodr. pag. 100.*
Habitat in Jamaica 5

non vidi

Croton

Habitat in Porto Rico herb. Desfont. 5

Rami glabri compressi angulati, folia petiolata, alterna, bipolliciana vel parum
ultra, ovato-oblonga, interjerrima, interdum ex his vespis obfolata remota
dentata, parum acuminata, obtusifolia, utrinque glabra. Pedunculi axil-
lares, unguiculares, petulo parum longiores. Capsulae glabrae, p. 2 duplo
maiores

Croton folius oblongo integerrimis subtus micans obtusi

Præcisio fructu parvo fructuoso curassavicus etc: Plukin. 107. fig. 6.

Habitat in america. herb. musci

*Rami micani, apice ~~simpliciter~~ pubescentes, oculo armato ad præsi punctis flavescen-
tibus, tenues. Folia petiolata, alterna, semipollicaria, supra pallida
viridia, subtus argentea. Petioli longitudine folii. Nervi laterales
pedunculati, pollicares. glandula nulla.*

brooides Brotton foliis cordatis ovatis integerrimis glabris, caule frabro.

Habitat in cymena herb. Tus.

Caules fruticosi. Rami pallidi. Folia fere bro & orbata, petiolata, alterna, remota, 6-nerviaria, utrinque glabra, subtus pallidiora, nervis armata, junctis argenteis adpressa. Glandulae nulla. Petioli frabri.

globofum C. foliis ovatis obtusis intecynis, pedunculis geminis floribus
dioris; fructibus globosis echinato hispido Sw. prodr. pag. 100
Habitat in Jamaica;

non vidi

Canatum Cortex foliis ovato-lanceolatis integerrimis glabris oppositis. Boves
lanatis, capsulis bivalvibus Lewis fl. Coch. pag. 5 P.

Habitat in Cochinchina

arbor magna. Racemi simplices terminales, masculi ad apicem. Cal.
tubulosus 5-partitus. Petala 5. ovata concava filamenta 15. ♀ Cor.
o. Stylus o. Stigmata 3. bifida. Caps. 3. loculari bivalvi sperma, semini
bus apice tuberculosis

^{non vidi}
Cortex vanez dum generat d'Hervey Lewis fl Coch. pag 575 sub nomine Philan
140 codicum ab Stamina 30. non morad elpha

Divaricatum (foliis oblongis obtusis serratis hirs, basi biglandulosis,
racemis terminalibus solitariis caule fruticoso, ramis dichotomis di-
varicatis Sw. prodr. pag 100.
Habitat in India Occidentali 5

non vidi

Croton

Habitat in St. Domingo Herb. Guaf. 5

Trunx, rami teretes, incani. Folia petiolata, alterna, ovata, basi subcordata, obtusiuscula, serrulata, vix pollicaria, supra glabra, sublaevata, oculo asinae punctata, subtus incano-tomentosa, venosa. Racemi terminaliter, pollicares, tomentosi, incani.

Croton

Habitat in N. Domingo herb. 4 usq. 5

Rami teretes, glabri, superne tomentosi. Folia petiolata, alterna, cordata, supra
glabra, subtus incano tomentosa, obtusiuscula, serrulata, vix pollicaria.

Racemi terminales, tripollicares, incani. Flores paucissimi inflexi.
Capsula magnitudine Piperis, globosa, incana.

Calliandra folium Erdon foliis ovatis acuminatis subtus tomentosis integerrimis

Habitat in Pem herb. Gusf. 7

Rami crassitie penna Cygnea, superne tomentosi. Folia petiolata alterna,
supra striata uscula, arenia, subtus venos-reticulata tomentosa, inianu
quinque pollicaria. Glandula 4 pedicellata capitata ad apicem pe
toli.

Squamulatum Epton foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, racemis axil-
laribus subsessilibus

Habitat in Domingo. herb. Mus. P.

Rami alterni, teretes, glabri, superne angulati squamulosi, folia petiolata,
alterna, tripollicaria vel minor, ovata, utrinque adpersa squamis mi-
nutis argenteis, profertim subtus et in junctibus, obtusiuscula. Racemi
axillares subsessiles, pollicares, plerumque foliolo uno alterove lineo-
ri oblongo ad basin pedicellorum. Flores inferiores foeminei, longius pe-
dicellati, uti masculi squamulosi argentei

Dicoum Proton

Habitat

herb- ha Martii

totum tomentosum, in canum. Folia laniscolata, obtusifolia, basi acuta, costa
geminata, obsolete trinerua, a venia, vix pollicaria glandulosa. Racemis
terminalis elongatis

purpurea Crotch.

Cyton purpurea Jacq. coll. 4. p. 217.

Habitat ad Camiar 5

Spedalis et altior erectus, caule pollicem crasso, cortice cinereo et striato
fusco. Folia petiolata, elongate cordata, acuminata, ^{pubescentia} obsolete
seriata, supra vix vix venosa appera, subtus lacuna pilis hirsuta
separata, ad apicem ternata. Spica semipedalis hirsuta
foemineis floris inferioribus sessilibus. nupuli pedicellati. Calyx
hirsutus: nupuli petaloides foemineis apertali. germen mucro
atum. Capsula hirsuta hirsuta.

glanduliferum Croton

Habitat. hab. Guaf. 5

Caulis fruticosus, erectus, teres. Rami sparsi glabri. Folio petiolata, elliptica ^{glabra},
canaliculata, attenuata, integerrima, tripollicaria, simpliciter venosa ^{venis} pinnis
in punctis transversis villosis stellatis dispersa. Racemi terminales,
bipollicares, pedunculati. Flores foeminei inferne ~~et~~ s. Calyx pedic
phyllus: foliolo lineari, extorsum parvis latioribus, basi glanduli
reprophi mucronatis, glabris. Styli trifidi

avene Croton foliis ovatis integerrimis glabris

Balsamum ^{americanum} copae speciei glabra herb. Vaill.

Habitat herb. Mus. 5

Caulis fruticosus, ramosus, erectus, Rami densi, glabri, teretes. Folia

superne, petiolata, semipollicaria, acutiuscula, avenia, enervia.

Petiolus puberulus, longitudine fere folii. Spicae terminales, erectae,
pollicares. Capsula inferne villosa.

Prope Cr. balsamiferum locandum.

elsagnifolium Prator Vomentop- nicinum, foliis lanceolato-oblongis obtusissimis in
Tegerrimis

Habitat herb. Desfontaini

Totum villoso-nicinum. Ramis teretes. Folia subsessilia, basi in nervis atten-
nuata, sesqui pollicaria, patenter, subtus vix nitida, mucrone brevi termi-
nata. Glandula nulla. Racemi terminales, bipollicares, bractea linea-
res. Calycis laciniis ovatis.

municataum Arcto foliis ovatis attenuatis crenatis, subtus viridi canescentibus
ramis superne municato scabris

Habitat in Madagascaria herb. Fusf.

Rami alterni, teretes, superne ferruginei a punctis numerosissimis elevati
scabri, apice dichotome divisi. Folia pollicaria, supra punctato-sca-
brispicula, avenia, subtus pelis stellatis subcanescentibus, mucronata, ob-
foliate crenata. Spica in dichotomia et apice, erecta. Flores copiosi,
conferti, sordide cinerascens. Glandula utrinque in apice petioli

menispermum Erdon

Habitat in Domingo herb. la Mancha &

Rami inferne teretes, glabri, superne rufescente punctati. Folia petiolata,
sesqui-pollicaria, ovata, obtusa, integerrima, simpliciter venosa, oculo ar-
mato utrinque squamulosa, subtus punctata, glabra, eglandulosa. Racemi
axillares et terminales, simplices, erecti sesqui-pollicares. Pedicelli soli-
tarii, distantes. Calyx et fructus angustos squamulosi

Croton

Habitat in Domingo herb. La Manthii

Rami teretes superne incani. Folia petiolata, semipollicaria, subcordato-ovata, obtusissima, venosa, integerrima, supra ovulo armato elevato punctata, subtus incana: glandulo nullis. Spica terminalis, erecta, tomentosa, pollicaris.

Croton

Habitata Guaya herb. Guaf

Rami teretes, et pediculi inani pulverulenti. Folia ovato-cordata subhombria, acuminata, acuta, remote dentata, basin versus integerrima, subtus pulverulenta canescentia, venosa, supra basin utrinque macula fusca, 5-7 pollicaria. Racemi axillares. Capsula tomentosa.

Erigeron foliis ovato cordatis subrhombicis acuminatis acutis serratis dentatis

multiglandulosa Vedit Aub.

Stip
tus
spha
li
n
spha
ie
s
spha

Specimen foliis interduum pithacensis, orata - Spinae superne, bypolli.
casi sed et Thoun