

Cricianella

capitata *Prænanella* foliis dubdenis, floribus capitatis subpentandris

Habitat in Sibiria? &

Caules plures, tripedales, erecti, tetragoni, inferne laeves purpureascentas,
et corolla et
Prænanellae Superne & cabriuculi. Folia sex - duodecim, pollicaria, sursum pensio-

minora, patentissima, lineari-lanceolata, ^{glabra, ferruginea villosa raris in nervis} utraque & punctis
+ supra, uti & villosa
aliquot ad basin ver
tibus ellorum & superiorum
villosa aliquid in

minutis & cabra, supra subnitida, subtus pallida, subciliata. Pedunculi
superne & terminales, oppositi, longitudine ^{capituli} foliorum, Flores creter duo
decim vel pauciores. Capitula ante florescentiam nitantia, ^{radula} duodecim
flores duodecim vel pauciores, plures in capitulo terminali, Bractea
lineari ad basin germinis, eisdemque longitudinis, raris villosa. Corolla

supra convexa, subtus concava, ^{ad apicem macula purpurea atro-purpurea} ovatae, ~~antheris glandulis~~ anistatae; anista crassa, obtusa, erecta. Antherae qua-
tuor, interdum quinque, in faucibus. Germen oblongum: styli duo, unius pa-
rum longior, stigma capitatum.

~~Fascicularis Cyper. culmo Inguetro, umbella composita fasciculato-capitata
foliata, pediculis lineariibus acutis la Mart. T. Enci. pag. 144~~

~~Tab 30. fig 2.~~

~~B. pediculis omnibus fasciculatis Pluken. V. 416-fig. 6.~~

~~Habitat in Barbana~~

ciliata. Crucianella

Habitat

Herb. La Martini

ramosis, laxis, filiformis. Solia linearia, unguiculata, acuta. Flores axillares, solitarii, subsessile. Solia duo sub flore, spinulosi ciliata. Semina nigra

Scabra Encicranella foliis semis linearibus, bracteisque lanceolatis scabris, floribus capitatis

Habitat in Oriente herb. Vent.

Caulis filiformis, debilis, decumbens, glabris, superne villosuli. Folio semi unguicularia, glauco viridia, mucronata a spinulis minutis scabra. Flores superne in capitulo collecti, margine parum orbiculato: floralia margine dentulato ciliata, margine membranaceo. Flores in capitulo collecti. Corolla tubulosa, unguicularis

Filiculis Crucianella

Habitat in Syria herb Desfont.

Caulis filiformis, ramosi, laxi, lower: rami simplices. Folia parva, mucronata
floralia lanceolata. Flores terminales, subsessile.

Dichotoma Encrasella

Habitat in Syria herb. Desfont

Caulis plures, fruticulosi. Folia quaternaria. Semina mucronata.

habeo

Lupoloides Convolvula

Habitat in Persia herb. de Lesfert

Caulis lavis, glaber. Folia serricellata, sero, semipollicaria, linearia, acuta, marginata revoluta, scabra. Fasciculi foliorum in axillis. Spica ex axillis supremis et apice, opposita, pedunculata. Flores oppositi, distantes. Bractea ovata, acuta, carinata, ope lentis ciliata. Calyx minutus. Corolla filiformis unguiculata. Semen oblongum, leve.

villofa Crucianella

an Rubella critica incana floribus purpurascens Tournef. Bor.

Probat in Oriente herb. Mus.

Radix superne dissepis in Caulis plures

maritima & procumbens suffruticosa, foliis quaternis mucronatis, floribus oppo-
sitis quinquefidis Lin. Spec. pl. p. 1504 L. V. p.
Rubra maritima Dod. pempt. 357. Clus. hist. 2. p. 176. Bauh. pin. 334.

Habitat ad littora maris mediterranei in arenosis &
Caules procumbentes diffusis ramis, rami albidis glabri. Folia
rigida, marginata, ^{marginis albescens} interdum ovata ^{in ramulis integ} ~~in ramulis~~ ^{et ramulorum} quadrifariam imbricata,
inter nodos ~~dimidiata ramulorum ex internodiis axillis~~ ^{et ramulorum} Flores vesperis apertam in
specie conferta. Bractea foliis latiore ovata, margine membrana
ceo ciliata, longitudine fere tubi Corollae ~~et~~ ⁱⁿ ~~ramulorum~~ ^{ramulorum} ambitu
haec

omnibus
articulis
semipollicaribus
internodis dimidiatis
deo ~~ramulorum~~
vrou

Specimen e Synodi an varietur Caulis ramis erectis. Folia et
bractea angustiores sed & densior

rufescens *Onoclea erecta*, foliis puberulis linearibus pubescentibus,
pedu capitulis pedunculatis axillaribus et terminalibus.
Wedd. pro: pl. pag 602.

Rubecula cretica uniana, floribus purpureis
Tournef. Cor. 5.

Habitat in Creta

capitata Crucian. procumbens fruticosa, foliis tenuibus sublineari-bus, floribus capitatis
vis quinquefidis

Millard. ii. pl. rar. dec. 1. p. 12.

Habitat in Libano

incisa Cui: foliis quaternis binove linearibus carinatis; bracteis ciliatis late spica-
tis, fructibus tuberculis undique sectis La Mark. Tab. enc. pag. 269

Habitat in oriente O

Caules diffusi, semipedales

an villosa mea

mihi non nota

patula C. diffusa, foliis tenuis, floribus parvis Lan. Am. ac: 3. p. 4014 Loebl. it.
60. p. v.

Habitat in Hispania C. ^{oppoiti} ~~dichotomi~~ semel dichotomum ^{subulato} ~~semis~~ unguiculatum
Plantae vix palmatae ^{in pedunculis, dichotomis, oppoiti} Rami patulae. ^{et semis quibus ramorum} Solia pabra linearia. Flores axillares ~~in ramulo pro~~
~~prois dichotomis aphylla foliis~~ ^{foliis brevioribus} . Corolla luteo, quinquefida
clausa ha

villoso \varnothing foliis quaternis lineari-bus pubescentibus floribus axillaribus

Habitat in Syria

Caulis foliiformis. Folia copiosa unguiculata articuli multo longiora
subtus utraque linea e marginibus parum revoluti, mucositate angust-
iores crassiores longitudine foliorum

angustifolia P. erecta, foliis senis linearibus, flombus spicatis Hort. Upf. 274 S.V.

Rubia angustifolia spicata Bauh. prod. 145: pin. 334.

Habitat montpelii O tetragonis angulis superne ^{superne ramis paucis alter} ~~non~~ ^{nis simplicibus} ~~puberulis~~

caulis ascendens ^{pubes subsimplex semipedalis. folia copiosa}
^{marginato, et aluboli minimis} ^{fero pollicana inferiora minoru}
caternata margine revoluta. spica ex apice ramulorum et ^{alterno}

intermodia

bra semi vel

ses qui pollicem

caulis erecti, bipollicares imbricati. bractea lanceolata
carnata canna viridi scabra, margine membranacea
albida integerrima

bractea integerrima

Oxyptera C. foliis quaternis sublinearibus, floribus spicatis quinquefidis Lin. Mant. 30

S. V. p. 151

Cnicianella herbacea Tross. Desf.

Habitat in Aegypto ☉

Caulis digitalis vel palmaris erecto-patuli ramis ^{angulis} minutis fere atulca
articuli superiores toscabri. folia revoluta subtus et margine scabra, ^{angulicula} mucronata
pallidior vel sequi infima ovata, inferna later. canaliculata, reliqua linearia, spica
pallidior inferna ^{sermi nalis} erecta, pallidior. Bractea canaliculata, dorso linea
brevior ^{elevata, dorso scabri} marginem membranaceo, subtili spine, serrato-ciliato
Flores bracteis vix longioribus

bracteis serrulatis

Catigolia C. procumbens, foliis quaternis lanceolatis, floribus suicatis Hort. Ups.
274 S.V.p.

Rubia latifolia suicata Bauh. pin. 334.

Habitat in Creta et Montpelii ☉

Caulis diffusus obsolete quadrangulus. Folia patentia lina

monspeliaca & procumbens, foliis acutis: Caulibus quaternis cratis: ramis
subquinatis linearibus, floribus spicatis. Lin. Spec. pl. p. 13. Ps. S. V. p.

Rubia spicata repens Magnol. Monsp. 225.

Habitat Monspeli, inque Paloffina. vel ultra ^{linea decurrentibus}

Caulis plures, ascendentes, ^{semper 4} rami tetragoni anguli ^{subtriangularibus} lobis
inferioribus ^{oblonga} lanceolata longiora mucronata ^{superiora} linearia ^{superiora} linearia

tetragoni
adnatis pollicari
bus sursum versis
quibus rami
ulterni

suprema interdum quaterna, vel opposita plerumque tamen sena
speciosa terminalis, palmatis vel ultra, angusta erecta. Bractea
lanceolata, ciliata margine membranaceo ciliata ^{oculo ar}
mato ciliata

Rubra supra, spica longissima Tournef. F. R. h. 13. 6 herb. Mus.

caulibus adscendentibus foliis - - - - - oblongis