

<sup>V. 190</sup>  
Cucubatus

1. bacciferus C. calycibus campanulatis, petalis distantibus, pericarpio coloratis, ramis divaricatis
2. behen C. calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilobulatis, corollis puberulis
3. fabianus C. foliis obovatis carnosissimis, floribus subverticillatis
4. viscosus C. foliis basi reflexis, floribus racemosis, pedicellis trifloris, bracteis corollis multifloris dato-ovatis, caule indiviso villos-viscoso.
5. aegyptiacus C. floribus erectis, petalis emarginatis reflexis; utraque dentibus notatis
6. stellatus C. foliis quaternis
7. italicus C. petalis semibifidis, calycibus clavatis, panicula dichotoma erecta, unitalibus declinatis, caule erecto
8. fruticulosus C. foliis linearibus integerrimis, pedicellis oppositis subsolitariis unifloris, calycibus tomentosis
9. yatanicus C. floribus racemosis, pedicellis subunifloris, foliis linearibus cuneatis ciliato-fimbriatis, caule glabro simplici
10. sibiricus C. petalis emarginatis, floribus subverticillatis: verticillis umbellatis aphyllis

11. catholicus C. petalis bipartiti, floribus paniculatis, foliis lato-lanceolatis
12. mollispinus C. petalis semibifidis, panicula dichotoma, caule foliisque holosericeis:  
procumbens radicalibus spatulatis
13. ~~stictus~~ C. floribus ~~racemosis~~ <sup>racemosis</sup> divisis racemosis paniculatis, petalis lineantibus indivi-  
sissimis
14. reflectis C. floribus spicati alternis secundis, petalis subbipartiti obsoletis
15. saxifragus C. petalis bifidis calycibus striatis: terminalibus subsessilibus, lateralibus  
pedunculatis.
16. pumilio C. caulibus unifloris flore brevioribus.

in volucribus Cui abalio

Myosotis orientalis Ben albi foliis perfoliatis, flore umbellato Tournef. Cor.  
Habitat in oriente Ledeb. f. u. f.

Caulis plures, diffusi, dichotomi, articulati, squamosi et ultra, uti tota planta gla-  
bri: articuli nodosi, infauli. Folia radicalia plura, spatulata, oblongo subrotunda, in-  
tegerima: caulina <sup>rotundifolia</sup> orbiculata, fere Rupleuri ~~perfoliata~~, unguiculata, perfoliata, inte-  
gerima, omnia crassa, avenia, enervia. Flores in apice, breviter pedunculati, 9-10,  
umbellati, glabri, involucri: involucrium unicolatum, integerimum, <sup>hinc</sup> floris parum  
brevior, crassum. Calyx monophyllus, quinque dentatur; dentibus ovatis. Pappus  
oblongus, longitudine calycis. Semina glabra, ope lentis rugosa.

*Longiflorus Cucubalus*

*Lychnis orientalis*, foliis subrotundis viscosi, flore magno Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Mus.

Villoso-viscosus. Caulis erectus, pedalis, simplex, crassitie penae columbinae. Folia  
radicalia lanceolata, basi attenuata, bipollicaria: caulina sessilia ovata, cras-  
sa, arenaria, semipollicaria, inferiora longitudine fere intermedium. Pedes  
culi superiores, oppositi, breves, solitarii, uniflori. Flores pollicares, erecti.  
Filamenta corollae longiora. Petala bifida

Sax. fragw. Cucubalus.

*Lycium orientale* minima graminifolia, calyce purpureo-flores fructu Tournef. Cor. 24  
Habitat in oriente herb Mus.

Radix superne divisa, apice cespitosa. Caulis plures, palmares, erecti, simpliciter, filiformes, superne viscosi; Veretes, glabri, 3-4 nodis. Stipula filiformis, radice alia cespitosa unguiculata, glabra, acuta, glauco viridia. Pedunculi superne, oppositi et terminalis; terni. Bractea una, ovata, acuta sub calyce. Calyx turbidus, coloratus, substratus. Petala bifida.

*Dichotomus Cucubalus* caule dichotomo pubescente foliis lanceolatis  
floribus sicca micropis secundis nutantibus  
Habitat ex Horto In Bueth

Caulis erectus bipedalis teris dichotome ramosus. Folia  
sessilia utraque acuta sesquipollucaria calycis breviter  
pedunculati oblongi angustulano decem foliati angulis  
virescentibus pilosis, alterni primum approximati deinde remoti  
bracteae duae splanse ad basin pedicelli. Petala bifida

glutinoso V. Calycibus clavatis, petalis bipartitis, genitalibus rectis, pan-  
icula dichotoma.

2 Behea Cucubalus calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilobulatis  
corollis subnatis Lin S. V. pag. 419. Flor. Dan. Lin Spec. p. 891.

Lupinus et Smilax hortenfi Brunfels.

Behea album God.

Lichnis sylvestris Lob. G.

Melanonum Plinii quonundam Clus. h.

Lichnis sylvestris quae Behea album vulgo..

β. Lichnis marina anglica Lob.

Lichnis maritima repens Bauh. Pin. 205

Cucubalus Behea β. Flor. Dan. 897

Habitata Europa praeis ficiis β. in maritimis &

α caulis erectus glaber sesqui-pedalis simplex. Solia remota sessilia

lanceolata, glaberrima <sup>laevigata prostrata</sup> laevia. Pedunculi terminales bifidi

dichotomi. bracteis ovatis fianis. Pedicelli filiformes calyces oblongi

inflati <sup>major</sup> palli albicantia

β. caulis repens folia breviora minor. Calyces globosi

Varietas foeminea in horto Upsalensi frequens. Hae hermaphrodito minor

Calyces exacte ovati, magis obliqui, nec oblongo ovati. Corolla minor

Stamina corollae dimidio breviora, terminata tuberculo absque antheris. Styli  
2. h. s. corolla longior declinata. Planta utraque fetili gen.

Silene, Spec.



fabarius Cucubalus foliis obovatis carnosis floribus pubescentibus  
Behen album sive polemonium saxatile, fabano folio sive siculum Boerh.  
mus. 133. t. 92.

Lycinus montana saxatilis, folio anacampeotis Tournef. Cor. 24. Boerh. Lugdb.  
t. p. 214.

Cucubalus fabarius foliis obovatis carnosis Lin. S. V. p. 419  
Habitat in Sicilia

<sup>perenne in pedunculato</sup>  
<sup>duobus tomis divisi sui</sup>  
Caulis erectus pedalis et ultra simplicissimus folicatus glaber. Folia crassa  
<sup>in p. folium planum et planum residuum</sup>  
<sup>asensu enervi</sup>  
sessilia superne magis remota, pollicaria in tegmina glabra. Pedun-  
culus terminalis solitarius interdum geminis, suprema bifidus, parva  
ter alterni bifidi rami multif <sup>lemi</sup> unguiculares tam pedunculati flori-  
bracteis scariosis minutis. pedicelli breves, calycis oblongo tubuloso  
Lycinus montana saxatilis anacampeotis folio Tournef. Cor.

viscosus Cucubalus floribus racemosis, pedicellis trifloris, bracteis cordato ovatis, caule  
indiviso villos viscoso, foliis basi reflexis

*Lycchnis orientalis maxima*, rugulosi folio undulato Tournef. corol. 24. An. 2.  
p. 361. t. 361.

*Lycchnis montana viscosa* noctifloro hispida latifolia, albo, floribus absque  
appendicibus Tell. p. 105.

*Cucubalus viscosus* floribus lateralibus undique decumbentibus, caule indivi-  
sio, foliis basi reflexis Flor. Suec. 286. \* I. V. pag.

Habitat in Suecia, Italia, Anglia, Ararat &c.

Caulis erectus, pedalis. Spanum ultra, sesqui simplicis primis superne villo-  
so viscosus uti tota planta, subaequali utrinque sulcis notatis  
folia lanceolata, radicalia angustiora basi attenuata caulium  
lateriora amplexicaulia byssellitica undulata, floralia cordato  
ovata. Pedunculi axillares oppositi triflori. Flores undique nutantes  
nec ad unum latus ut in plerisque. Calyces cylindrici, decagoni  
unguiculares. Petala alba bipartita

4 *Oxythraeus* Cui. floribus erectis, petalis emarginatis retroflexis: utroque denticulo notatis  
Lin. Mant. 305. L. V. p. 419.

Habitat in Aegypto

Caulis debilis ramosus, ad terram prostratus. Folia linearia (non glabra): juniora basi  
ciliata. Flores axillares, solitarii, sessiles. Calyx cylindricus; in fructu obtusatus,  
10 gonus, interstitiis membranaceis, denticibus parvis. Petala minuta, vix calycis  
longiora. Antherae saepe quatuor Lin. M. l. c.

6 Stellatus Luc. foliis quaternis Lin. R.V. p. 419

Lychnis caryophyllae virginianus, gentiano foliis glabris quatuor ex singulis geniculis  
caulem amplexantibus, flore amplo fimbriato Raj. hist. 1095.

Drypis foliis quaternis Gold. Nov. 106

Silene foliis quaternis Gron. Voy. 50.

Habitat in Virginia, Canada

Petala absque corona, quadrisida, lobis bipartitis Lin.

italicus Quercubalus petalis semibifidis, calycibus clavatis, panicula dichotoma erecta,  
genitalibus declinatis, caule erecto Lin. Spec. 593. \* V. pag. 419.

Habitat in Italia &

Caulis teres minime sulcatus, caulis subvellosus, prostratus inferne, lobis spiculis  
simplicibus. Folia lanceolata inferiora obtusiuscula floralia angustiora acuta  
pedunculata superne elongata, opposita remot. saepe bifida pedicellis pollicari-  
bus altero medio lobato utroque nudo filiformes. Flores erecti. Calyceo  
linguiculari, decemfido. Petala semibifida, latiuscula alba,  
subtus plumbea. Stamina alba

o fruticulosis Cucubalus foliis lineatis integerrimis, pedicelli oppositi subsolanum  
flori calycibus ventricosos.

Cucubalus fruticulosis Pall. A. V. 2. pag. app. pag. 44 Tab. T

Habitat in rupibus apricis montium altaicorum.

Caulis basi perennans rami teretes erecti pubescenti articulati articulis  
inferioribus minoribus superioribus bis. tripollicionibus superne reflexis  
viscosi. folia sessilia mediante membrana connexa glabra angusta  
inferiora articulati longiora, superiora acutiora et parum breviora  
Flores subsolitaria longitudine pedicellorum. haec sunt terminalis  
Flores remoti pedicelli plerumque solitarii semurquiculares interdum  
videndum plurimum. Calyx tener albidus inflatus pedicello longior obo-  
vatus, circa decem fructus. petala bifida alba.

ebenus Appal.

qtatanius Cucubalus floribus racemosis, pedicellis <sup>pub</sup> unifloris, foliis linear lanceolatis  
filiato serrulatis, caule ramoso glabro simplici.

Lycnis septentrionalium, foliis hyssopi, floribus uno versu oppositis albis

Hall. Gött. 150 \*

alene petalis nudis bipartitis, floribus secundis, pedunculis oppositis solitariis  
erectis, caule simplicissimo Lin Hort. Cliff. upf. pag. 116 \*

Cucubalus tatanicus petalis bipartitis, floribus secundis decumbentibus, pedun-  
culis oppositis solitariis erectis, caule simplicissimo Lin. l. V. pag. 419

Habitat in Tataria, Russia &

caulis erectus <sup>truncus</sup> teres glaber purpurascens articulis apice incrassatis  
pollicibus sive superne rami pauci oppositi <sup>erectis</sup>. folia sessilia  
pollicaria, ovata margine subciliolata ciliato serrulata striata  
rarius frequentia approximatam <sup>caudicibus</sup> rudimenta ramulorum ex articulis  
racemus terminalis <sup>mediocribus</sup> floribus oppositis, solitariis, erectis, galeiformis  
plenumque uniflori rarius triflori. bracteis oppositis ovato lanceo-  
latis. Calycis glabri clavati purpureo strati



10 Sibinicus Cucubalus petalis emarginatis, floribus subverticillatis: verticillis umbella-  
tis aphyllis. Gmel. flor. 4. p. 145 Lin. S. V. pag. 419.

Habitat in desertis Tacorow, inter Woroniz et Belgrod.

Caulis ascendens (decumbens?) obscure angulatus superne ramosis  
minus caule brevioribus. Folia opposita lanceolata sicula, pterygi-  
ma, pollicaria mediante membrana connexa frequentia. Peduncululus  
terminalis, erectus, elongatus. Pedunciuli laterales inferne remotis  
femi superne non approximati oppositi; solitarii, multiflori, bracteis  
vix longiores. Bractea lanceolata patenter. Pedicelli viriduli flores plures  
conferti. Calyx clavatus lavo striatigraevi petala calyce longiora capsu-  
la cylindrica calyce duplo longior.

11 catholica Cucubalus <sup>Cayo-</sup> petalis bipartitis floribus paniculatis, foliis lanceolatis <sup>lin.</sup>  
Hort. Ups. p. 111 \* P. V. p. 419. Jacq. hort. V. tab. 59

Lychnis viscaria altissima, flore muscoso, olynastri facie Rayn. Cath.

190  
p. Lychnis nocturna non viscosa, herbaceo flore Dill. Eth. 425. t. 316. f. 408.

Habitat in Sicilia, & Italia &c.

Ramifurmi  
dichotomi  
Caulis tripedalis, brachyotus, ramifurcus nudus articulatus. sulco utrinque  
exaratus. Folia <sup>superiora sunt ovata</sup> <sup>inferiora sunt</sup> <sup>obovata</sup> <sup>angustiora</sup> <sup>utrinque</sup> <sup>acuta</sup> <sup>vel</sup>  
pilosula. Pedunculi & dichotomia solitarii uniflori pollicares papilla  
rei terminalis plures <sup>seorsim</sup> ex crescentes. Calyces clarati; lobes  
purpurascens magnitudine Cuc. Diti. Corolla alba. Stamina  
petalis fere longiora. Lin.  
a Dill. l. ut. Differt corolla alba non viridi; petalis angustis sed non  
lineantibus; calycis rubro nec viridi Lin.

Lychnis viscaria altissima, flore muscoso olynastri facie Trumph. prol. 50  
Hort. Vindob.

12 mollesissimi Cucubalus petalis semibifidis, panicula dichotoma, caule folisque holo  
Lencis: radice albus spatulatis <sup>3, 85</sup> Lin. Spec. pag 593. \* Mand. <sup>318</sup> P. V. pag  
219

Lycnis maritima pulverulenta, folio carnosio Tournef. Inst. 338 (an notus  
ad nicosensem All.)

Habitat in Italia maritima 4

Caules plures erecti, teretes pedales, rigiduli, subtomentosi mollesissi  
mi. Ramis inferne alternis, brevioribus. Caule his immixti semi  
les dimidio breviores, erecti, apice confertim foliosi. Folia  
inferiora spatulata, <sup>supra mollissima</sup> reliqua lanceolata: omnia subcarnosae molli  
sima, tomentosa, obtusiuscula, apice subreflexa, patentia. Panic  
la <sup>vis. 3a</sup> brachicata: <sup>ramo dichotomo</sup> ramis <sup>318</sup> dichotomis. Calyces obtuse dentati, clavati, ere  
ti mollesissimi. Flores albi. Laminis calycis brevioribus, semibifidis.  
Stamina longitudine calycis. Styli corolla longioris Lu.  
longius corolla  
calycis longioris bracteis lanceolatis subsifloribus

1304 *Her Cucubalus floribus divisis racemosis paniculatis, petalis lineantibus indivisis*  
L. P. V. p. 419. Fl. Dan. 518.

*Muscipula s. Armona altera* Lob. ic.

*Sesamoidei magnum salmantinum* Clus. hist. 1. p. 295.

*Lycchnis viscaria flore muscosa* Bauh. Pin. 206.

*Lycchnis sylvestris sesamoidei minor, flore muscosa* Mentz. pug. 1. 3. f. 2.

Habitat in Silesia, Austria Valleja, Anglia, Gallia, Sibiria &

Paulis erectus herqui pedalis. Vires simplicissimus pubescens ut vixque  
felicis exaratus superne viscosus. Folia plerumque radicalia cuneo  
formia integerrima obtusiuscula, avenia crispiuscula. Panicula  
terminalis, semipedalis. Pedunculi partiales oppositi inferne  
remoti superne approximati filiformes bipollicares tria foliis oppo-  
sitis subulatis ad basin. Pedicelli verticillati plures capillares flores  
parvisistantes. Calyx subimpaniculatus striatus

174 reflexus Cucubalus floribus pinnatis alternis secundis, petalis subbipedatis obsolete  
Len Hort. Up. 112 \* S. V. p. 419

Lycnis meridionalium annua hirsuta, floribus uno vespa diaphotis Monf. hist.  
2. p. 544. Ray. hist. 996.

Lycnis sylvestris alba, spica reflexa Magnol. Monf. p. 171. & 170.

Habitat Monpelii &

Taxici Silene mutabilis cuius forte varietas. Caulis erectus saepe bipedalis  
Deres pelopis scabriusculus panopis. <sup>caulina</sup> folia remota oblonga basi attenuata  
4n, subpubesca bi pollicaria integerrima, obtusa, rariora lanceo  
lata. Flores Rami et caulis in pedunculo terminalitate. Flores <sup>erecti</sup> superne  
Pedunculus terminalis. Floribus subsessilibus pinnatis alternis calyce est ob  
longi ~~erecti~~ Petala brevissima bifida

Silene floribus pinnatis alternis solitariis subsessilibus erectis, corollis  
obsolete nudis Len. Hort. Up. p. 112. \*

*Lasiopogon* Cal. petalis bifidis calycibus striatis: Terminalibus subsessilibus, lateraliibus pedunculatis Mont: 71. \* S. V. p. 420 - Schreb. Dec. 9. t. 5.

*Lynchnis orientalis minima*, caryophylli folio, calyce purpureo *Penta striato* Tournef. Cor. 24.

Habitat in Oriente ?

Caulis palmari, foliis linearibus. Flores terminalis, sessilis. Flores laterales oppositi, pedunculati. Calyx omnis inter duo folia sessilis, e quorum alii saepe non petioli procedunt, ideoque non squamis duo more Dianthi

*pumilio* Luv. Caulibus unifloris flore brevioribus Luv. Mant. 71. L. V. p. 420 Caryoph. flor. Austr.  
vol. 5. app. t. 2. Egid. Collect. 2. p. 126. t. 10

*Caryophyllus pumilio* Tauricus Clus. hist. 1. p. 285.

*Caryophyllus alpinus*, calyce oblongo hirsuto. Bauh. Pin. 209. Hist. pl. 3. p. 337.

Habitat in Alpibus Italiae, Moraviae &

Folia radice alia in caespitem congesta, linearia, obtusa, laevia. Caulis simplicissimus, brevissimus, uniflorus, saepe triarticulatus. Calyx oblongus, campanulatus, patulus, obtusus, pubescens, longitudine caulis Luv. M. l. c.

alper tri Pac.

allion



nyedus Lucub

parviflorus A.

Erh. beytrag. Tom. 1

multiflorus. @

Chart. beytr. Ton-7

procumbens <sup>hetalei</sup> ~~hetalei~~ ~~simulifida~~, panicula dichotoma: floribus singulis pedicellatis  
Gmelin it. 3. p. 309

non vidi

polypetalus *C. floribus polypetalis, foliis ovatis lanceolatis* Walt. p. Car. p. 141  
Habitat in Carolina

non vidi