

*Quercus*

*Pucubalus Proyeri* racemo verticillato, pedunculis oppositi brevissimi multiflo-  
ri, petalis bifidis, foliis ovato-lanceolatis subundulatis Manch. in Schrad. Jour.

f. 2. b. 1. b. pag. 460

*Pucubalus* foliis amplexicaulis, floribus verticillatis, pedunculis erectis Proyer  
<sup>Proyer</sup>  
Hort. Lus. p. 448

Habitat passiva in planitiis humiliorum ♂

1. *Lonicera cucubalus* calycibus campanulatis, petalis distantibus, pericarpis coloratis,  
ramis divaricatis Len. S. V. p. 419.

*Alpine* repens Clus. h. Dod. pempt. 403

*Alpine* scandens *brachysepala* Bauh. Pin. 250.

*Lychanthus volubilis* Gmel. acta Petrop. 1759. vol. 14. p. 525. V. 17. fig. 1.

Habitat in Tataria, Germania, Italia, Gallia nemoribus, sepius <sup>4</sup> <sup>utrinque linea</sup>

<sup>respositio</sup>  
Caulis teres <sup>pubescens</sup> articulatus articulis bi-jollicantibus et ultra, <sup>ramis</sup>  
<sup>divaricatis</sup> oppositi divaricati. Folia opposita oblonga utraque acuta vix petiolo  
ramuli apice <sup>na</sup> <sup>polliciano</sup>, pubescentia, integerrima. Pedunculi laterales et termi-  
<sup>dichotomi</sup> <sup>ligni</sup> nales <sup>sam</sup> <sup>caulorum</sup> breviter Calycis lacinis lanceolatis. Flores autem  
Petala unguis Longitudine calycis

~~Lonicera V. frago~~