

Quiullaria Volkei Alab. Ca. Mart. T. Enc. pag. 32 36

~~Pal. 4 partitus. Petala 4. inaequalia. Superius basi corniculatum  
filamentum membranaceum diadonum~~

2 Quiullaria Pal. minimus <sup>4-</sup> quad. lobis. Petal. 4. Duo maiora concaua, altero basi corni  
culato; duo interiora breviora linearia. Anthera loculis discretis

excelsa 1. Cucullaria foliis lanceolato-oblongis attenuatis utrinque acutis subtus  
aureo-tomentosis

Voehy guianensis Aubl. fl. guian. 10. t. 6.

Habitat in sylvis Guiano Richard 4

Aster ~~long~~ ~~hexaginta~~ ~~pedalis~~ ~~pedalis~~; Rami tomentosi. Folia  
bipollicaria, supra glaberrima, avenia, obsolete nervosa, sub  
tus a tomento lavi aureo nitentia. Petioli brevissimi. Stipulae  
petales, breves. Rademi palmares: <sup>margin</sup>pedicelli brevissimi peduncu  
li pariales brevis simi; pedicelli unguiculares. Calyx margin bra  
vis, quadrilobus, petalo corniculato oppositus, subvillosus. Corolla  
glabra, tetrapetala: Petala duo majora, opposita, linearia, extus  
convexa, intus concava, unicum parum longius, reliqui an  
te explanationem vaginam, basi in cornu longitudine pedicelli  
desinens, alterum filamentum florens; duo lateralia, breviora  
tenuiora, sessilia, subtruncata. Filamentum unicum, lineare  
basin versus sensim angustatum, villosum, concaviusculum  
latere interiore, dorso univervo: Athera nervo divisa. Stylus fili



formis, superne sessus pendim parum latior: Stigma compressiusculum, sube  
marginatum.

Specimen<sup>em</sup> a Richardio meum communicat<sup>um</sup>, eque ac illud in herbario Fussiai  
si<sup>um</sup>, tantum a figura Aubletii recedunt tam quoad folia, quam quoad mag  
nitudinem florum petalorumque figura recedunt, ut vix ejusdem speciei<sup>erit</sup> esse  
sem nisi aberrasset Richardius qui plantam in eodem loco legit ac Aubletius,  
sed eorum figura in opere Aubl. non raro affertur minima cu. haud bene cum  
planta consentit

emarginata ? Quercularia foliis oblongis obtusissimis emarginatis utrinque glabris.

Vochya. Vand. fl. Lusit. et Brasil. Spec. in Röm. script. de pl. hisp.  
Lus. et Bras. 69. t. 6. f. 1.

Habitat in Brasilia. Ex herbario Lusitani &

Rami glabri, ~~inferius teretes, superiores tetragoni.~~ folia bipolli-

caria, basi acuta, subcoriacea, utrinque tenuissime venosa.

Petiol. fusci. Petala interiora Stamine et stylo breviora, ex-

terioribus tenuiora, pallidiora. Filamentum breve: anthera

filamento triplo longior. Stylus adscendens, longitudine fila-

menti

Capsula triangulari, trivalvi. Semina solitaria. Vand. l. c

# Habitus

# Arboreus excelso:

# Rami oppositi, infer-  
nae teretes, superiores  
tetragoni.

# Obs: folia, ~~et~~ rami opposita, petiolata, integerrima.

Racemus terminalis, erectus: pedicelli <sup>univ. portales</sup> parvi, triflori. Flores  
pedicellati.



emarginata. 2. *Pucullaria* foliis oblongis obtusissimis emarginatis utraque glabris.  
~~Voehya. Vand. fl. L. ...~~