

Cucumis

1. colocynthis C. foliis multipicis, pomis globosis glabris
2. prophetanum C. foliis cordatis quinque lobis denticulatis obtusis pomis globosis spinosa-
municatis
3. anguria C. foliis palmato-finuatis, caule angulato
4. africanus C. foliis palmato-finuatis, caule angulato, pomis ovalibus echinatis
5. acutangulus C. foliis rotundato angulatis, pomis angulis decem acutis
6. melo C. foliorum angulis rotundatis, pomis toulis
7. didaim C. foliorum angulis rotundatis, pomis sphaericis umbilico rebus
8. chate C. hirsutus, foliorum angulis integris rotundatis, pomis sphaericis utrinque
attenuatis hertis
9. sativus C. foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris
10. anguinus C. foliis lobatis, pomis cylindricis longis s. mis Coribus contoduplicatis
11. flexuosus C. foliis angulato-sublobatis, pomis cylindricis sulcatis curvatis
12. coronon C. foliis angulato-sublobatis denticatis, pomis sphaericis decem sulcatis
13. maderaspatanus C. foliis cordatis integris denticulatis, pomis globosis glabris

arenarius Cucumis foliis ^{ovatis} cordatis quinque lobis, pomis ovalibus tomentosis

Habitat in arenosis Guines Thunberg

Caulis prostratus, filiformis, angulatus, hirsutus. Folia remota, ovata
cordata, sinuata, subquinqueloba, denticulata, hirsuta, nervoso veno
sa, venella cuspa. Petioli folio dimidio breviores hirti. Pedunculi non
nullis axillares, uniflori. Calycis lacinae subulatae, recurvae, villosae.
Bacca magnitudine Pomi, maculata Thunberg. †

maderapatanus, foliis cordatis integris denticulatis, pomis globosis glabris
Lin.

Cucumis maderapatanus, fructu minimo Pluk. alm. 123.
Tab. 170. fig. 2.

Byronia foliis cordatis oblongis angulatis dentatis glabris Flor. Zeyl.
3564

Habitat in India & ~~India~~ ~~Tuspe~~

Caulis angulatus scaber. Folia petiolo longi, cordata, oblonga
quinguanzula: angulis inferioribus brevioribus, scabra denta
ta. Cerni ex alio. Lin.

planta herb. Vahl. a Tuspe differre videtur ~~Pluk.~~
Basis petioli, tuberculis callosi albidis sive punctulosis scaber
rimi. Pedunculi calycisque hirsuti herb. mus.

Chate. *C. hirsutus*, foliorum angulis integris rotundatis, nervis fusi formi-
bus utrinque attenuatis hirs. Lin. Spec. pl. 1437. * L.V

Chate Alp. Egypt 114. & 116. Vest. Egypt 47.

Cucumis oegyptus rotundifolius Bauh. pin. 310.

Habitat in Oeypto, Arabia O

Caules procumbentes obsolete pentagoni adpressi uti folia et omnia
pilis albis pellucidis confertis molles. Differtigitur a mentolone fructu
medio ventricosus utraque costato obtuso, pilis albis mollebus
nec scaber, pilis rigidis. Lin

anguli foliorum in mea quinque in aliis acutis in aliis rotundatis
intermedia elongata ovato lanceolata. petioli hirsuti folia
pilosa. Germen pollicare ~~tomentosus~~ hirsutus tomentosus in ano

Caulis uti petioli et nervi foliorum subtus pilis subulatis, pellucidis
hirs. Folia petiolata, cordata, inaequaliter remote denticulataque
trinque ope lentis punctata, pilis pellucidis adpressis, tamen non
scabra. Calycis hirsuti herb. Mus.

lanceatus Cucumis folio palmatis acutis, pennis lineis d. u. com. vini
dibus. De Proso. Journ. & Mus. nat. n. 19. pag. 257

tab. 37.

Habitat in Germani

non di

Vernipilequa Bygnonia foliis simplicibus, lanceolatis glabris integerrimis, paniculis ter-
minalibus

Habitat in America meridionali In v. Koch. 5

Caulis scandens. Rami teretes, tenues, flexi, albido punctati, glabri.

Folia petiolata, opposita, bis. tri. pollicaria, pollicem lata, lanceolata,
sape acumine brevi ^{semidinqueculari} terminata, acuta, utroque glabra, ^{obscure venose} supra aversa,

pubes simpliciter pubescentia.

Petoli filiformes, sesqui pollicares, glabri

Panicula terminali ramorum, Paniculi filiformes, teretes, 4-5 pol-
licares; parthales sesquipollicares, infimi interdum ~~3.~~ 3., superiores
oppositi, ~~caeteri~~ semel vel bis dichotomi: pedicelli uniflori.

Calyx glaber, deciduus

Corolla sesquipollicaris, glabra

Legumina sesquipedalia, linearia, vix seminaequem lata, glabra, extus

Anata

Colocynthis C foliis multifidis, pomis globosis glabris Lin. L. V.

Colocynthis Lam. epit. 982.

Colocynthis, fructu rotundo, major Bauh. pin. 313.

Habitat - - - C

Caulis uti pedunculi heri. Folia ovata pennatifido
multilobis lobis oblongis inferioribus subpennatifidis
glabra repando subt dentata, glabra. Circhi bifidi pedun-
culi solitarii uniflori. heri flores

pennatifido multifidis

prophetarum @ foliis cordatis quinquelobis denticulatis obtusis pinnis globosis pinnato-
muriatis Lin. Am. acad 4. p. 295* L.V. Jacq. h. V. pag. 3. tab. 9

Colocynthis pumila seminata arabica, fructus duodecim luteis et viridi-
bus variegata Shaw. afr. 164.

Habitat in Arabia, subloxi

Caulis angulatis. lobi foliorum rotundato denticulato
subtus pilis rigidis in venis scabripicula. Petioli muricati
scabri. Pedunculi gemini hirti uti germen. Germen magni-
tudine seminis corandri

anguria C foliis palmato-lobatis, caule angulato. Lin. I. V.

Cucumis echinatus, colocynthis a folio Herm. parad. p. 134. sed fructus minor

Cucumis sylvestris americanus, anguria folio, fructu ovi figura: primo
est tuberculis momordicae instar mucronato Phil. phys. 170 fig. 3.

Anguria americana, fructu echinato eduli Mill. Dict. t. 33.

Cucumis anguria folio latiore apert, fructu minore candido, spinulis
obtusis mucronato Sloan. jam. 103.

Habitat in Jamaica C

Flores parvi Bryonia. Caules angulati hispidi

Caulis fetis rigidis albis raris hirsutus frequentioris in petiolo

Definit C. propositus nervis venis que adspersis pilis. Pedunculi axillares plures
pollicares filiformes. Germinum magnitudine pisii hirsutum

Defi.

non ordi.

oblongo.
fructu ovato-spinuloso.

caule angulato, ~~scabris~~
africanus C. foliis palmato-lobatis, ~~nomis globosis echinatis~~. Lin. Suppl. pag. 423.

S. V. pag. 86y

Cucurbitis africanus echinatus minor Herm. parad. p. 133. Tab

134

Habitat in C. bono praesi

Caules numerosi subangulati, prostrati. Folia quinquefida
lobato-divisa. Flores parvi. fructus parum oblongus
undique echinatus.

non vid.

acutangulus G. foliis rotundato-angulatis, pinnis angulis decem acutis. (Lp 869+
Gaerth. bot. vol. 3. t. 73. Lin. Spec. pl. pag 1436.

Cucumis longus indicus Gray. Mus. 229. T. 17. fig. 2.

Cucumis indicus striatus operculo donatus: cortex ops pitamine

+ Vegetas Pluk. alm. 123. tab. 172. fig. 1.?

Habitat in Tataria, China ☉

+ Petola Rumph. amb. 5. p. 400. T. 149

Pedunculis multifloris. Poma oblonga, angulis compressis
dentatis. Folia cordata acute angulata, serrato dentata
Caulis acuta pentagonus scandens

Petola he etiam huc refertur et ad Mom. Ciffam ~~_____~~

melo l. foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis Lin. l. V.

melo vulgaris Bauh. Pin. 310.

melo Bauh. hist. 2. p. 242

Habitat 0

Sudaim *C. folium angulirostratis*, pomis sphaericis umbilico et usi
lus. l. v.

Melo pappili odoratus persicus minimus odoratissimus Raj. suppl.

^{333.}
Cucumis orientalis, fructu pomiformi citri-formi Walth. hort. 133.

Tab. 21.
Melo variegatus, aurantii figura, odoratissimus Dill. Elth. 223. v. 177.

Fig. 210.

Habitat in oriente \odot

Pomum magnitudine Pom. vulgare, odoratissimum sed subfatum ha

Sativus C foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris Lin. S. V.

Cucumis vulgaris Dod. pempt. 60.

Cucumis sativus vulgaris Bauh. pin. 316

Habitat ----- 0

Colia

Paulis fetis hirsutus uti pedunculati. anguli foliorum
acuti folia basi cordata. Lobi ovati remote denticulati.
germina magnitudinis faba. Poma oblonga superi formena
tuberculata calyx hirsutus

anguinus & foliis lobatis, pomis cylindricis longissimis loricibus contortuplicatis

lin. t. v. pag.

Petola anguina Rumph. amb. 5. p. 407. t. 14. c.

Habitat in India

flexuosus ^Q foliis angulato-sublobatis, pomis cylindricis sulcatis curvatis

Lin. S. V. pag

Cucumis oblongus Bod. pempt. 662. Bauh. hist. 2. p. 247

Cucumis flexuosus Bauh. pin. 310

Habitat in India? O

Caulis pilis pellucidis inferne ^{at} appropius superne hirtus

Folia ovata lobata cordata inaequaliter remote denticula

ta utrinque pilis parvis raris, venella tomentosa

inhi simpli Pedunculis axillaris, foeminei solitarii, longius pedicella
Cuspmi ti masculi plures pedicelli brevioribus. Germen cylindri
cum ^{inferne attenuatis} sequi pollicem uti calyces masculinorum hirsuto lana

ti incani. Bracteis sesquipedalis coarctatis pennis colum
bino tomentosis

Folia cordato subangulatis, quibus hinc hinc longis pomis
tomentosis

an mea planta potius anguina
sive nota flexuosa Thunb. diversa est plant

Comomon C foliis angulato-sublobatis dentatis, pinnis pinniformibus decem plicatis
his glabris Thunb fl. jap. pag. 324 S. V. p. 86y

Vrwa Krompf. Am. Et. pag. 211.

Habitat in Japonia culta

Caulis decumbens striatus, pilis raris hispidus uti petioli. Folia
petiolato cordata angulato-sublobata, nervosa, subtus
pallida, et nigra in primis nervis subtus piloso-striata. Flores
pedunculati axillares. Pedunculi brevissimi hispidi. Eruetus
magnitudine capiti humani. Thunb

glaber C. foliis cordato-angulatis, caule teri Walt. fl. car. pag. 240
Habitat in Carolina

non vidi

Tuna ~~H.~~ foliis tripartito palmatis basi subtus biglandulosis laciniis
glandulosis dentatis sublobatis

Cacum. Habitat in Asia India orientali Arabia felice

Caulis glaber. Folia bipollicaria basi cordata laciniis tribus
ovatis obtusissimis remote dentatis basi angustatis

lateralibus parvis brevioribus at latioribus extrorsum laci-
nia ovata dentato angulata intermedia productiore
interdum integra saepe lacinia utrinque opposita stue-
tura reliquorum. Pedunculi axillares foeminei plerumque
masculi plures breves. Flores majores quam in reliquis

Cuschi simplicis ^{et patris plethici} ~~Tunica~~ German sub cylindricum

Tuna ~~Guss.~~ ~~Borkh.~~ Desf.

Tuna n. 35 Borkh. Desf.

an *Tuna* Borkh.

glandulosus C. foliis palmatis laciniis dentato angulatis ferevatis
subtus basi glandulosis

Habitat in India orientali Dr. Roemer

Caulis filiformis angulatus glabris. Folia petiolata remotissima
basi subcordata lobis divaricatis quinqueloba. ^{optusa} s. fida
laciniis lanceolatis ~~f. su~~ ex trofian dente uno alterove
majore ~~sub~~ angulata. Dentesque paucissimis minoribus quibus
glandula flavesciente utrinque punctis copiosissimis clavatis
striatis ^{striatis} s. que nervia. subtus glandulae duo utrinque
ad costam junctim inter pagula nervo laterali. Pedunculi
axillares uniflori folio dimidio brevior. Calycis laciniis
subulatis, reflexis. Corolla flava nervis et venis coloratioribus
Corticis papilioformis