

# Cucurbita

1. Cagenaria C. foliis subangulatis vane utopi basi subtus biglandulosis, pomis lignosis
2. hispida C. foliis angulatis, caule petiolisque hispida
3. ovifera C. foliis lobatis pomis obovatis, cirrhis septem digitatis
4. Pepo C. foliis lobatis pomis levibus
5. verrucosa C. foliis lobatis, pomis medio verrucosis
6. melopepo C. foliis lobatis, caule erecto, pomis depressis nodosis
7. Citrullus C. foliis multipartitis.

Cagenaria C foliis subangulatis tomentosis basi subtus bi glandulosis, pomis lignosis  
Lin. l. v.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli Bauh. Pin 513.

Cucurbita Cagenaria, flore albo Moench hist. 2. p. 23. f. 1. v. 5. f. 3.

Rumph. Amb. 5. p. 39. v. 144

Habitat in Americae regionibus

*Lupinus* C foliis angulatis, caule petiolisque hispida Theob. fl. jap. pag. <sup>322</sup> p. v.  
pag 860

no par. homoph. Am. acid. Exot. p. 211.

Habitat in Japonia.

Caulis sulcatus, scandens, pilis cinereis undequaque tectus. Folia  
petiolata quadrangulata vel sublobata angulis rectis, nervis  
vix, utrinque villosa. Petioli teretes, hispidi, digitales.

Flores axillares densissime pilis ferrugineis, inferiores  
longiores, digitales; superiores breves. Corolla simplicis, bifida,  
trifida. Calyx uti pedunculatus densissime ferrugineo-hispidus  
Theob.

ovifera <sup>Q</sup> foliis lobatis, pinnis obovatis, circhis septem digitatis Mant-12 6x  
L. V. pag 860

Cucurbita, apertis foliis, amara tubinata flava candu antibus  
lineis insignita parva Bauh. hist. 2. p. 299?

Habitat ad Affricam. <sup>est 4 usque</sup>

Herba et flores simillimi C. Peponi, sed minus scabra. Folio  
neque multifida, neque fructus amari. Circhi recti  
apice terminati circhulis minoribus spuralibus, saporis  
septenis. Fructus obovati cores magnitudine et figura ori  
gallinacii, cortice duro, ore cultro confindendo, pectus  
lineis longitudo in albus 10 lacteis, ac si filia hybrida Bryonia  
lacunosus her

Circhi 4 fidi 220

Pepo <sup>Q</sup> foliis lobatis, pomis laevibus Lin. I. V.

Cucurbita indica rotunda Dalech. hist. 616.

Cucurbita major rotunda, flore luteo, folio aspero Bauh. Pin. 213.

13. Pepo oblongus Bauh. pin. 311.

Habitat

<sup>O</sup>  
Caulis sulcatus. Petioli nudi rigidis sparsi sic Bru. folia magna

Pedunculi axillares solitarii, hist. Germen globosum arctum

magnitudine nucis Conyli lacrima Calycis subulata unguiculata

Corolla sesquipedicant

verrucosa C foliis lobatis, pomis nodoso-verrucosis Lin. spec. p. 1435 + L.V.p.

Quercus bita verrucosa Bauh. hist. 2. p. 222.

Melopepa verrucosa Tournefort G.R. 9. 106

Habitat ——— C

Planta, foli, semina etc. Peronis. Tructus minor cortex durior  
sive lignosus. Lin

melopepo  $\odot$  foliis lobatis caule erecto, pomis depressis nodosis Lin. l. v.

melopepo clypeiformis ~~f. siciliana~~ Bauh. pin. 312.

Cucurbita clypeiformis: siciliana Bauh. hist. 2. p. 224

Habitat

$\odot$   
Cisti sunt in caule, quamvis non scandit nec procumbit

pyriformis G.

Pepo fructu parvo pyriformi. Tournef. 9. v. h. 105.

Cucurbita aspera pyriformi ~~altissima~~ parva alba Bauh. hist. 2 p. 223.  
223.

Habitat herb. mus.

Caulis villosus, interspersis fatis nonnullis roribus, uti et in petiolo.  
Folia basi cordata, sive lobata: lobi ovati acuti, denticulati, utraque  
villosi, supra scabri, subtus canescentes.



Lorigata ~~foliis ovatis petiolatis utraque lobis fissis ramosis cy-~~  
~~mopis benignis La Mart. p. 416~~  
Habitat in Guadeloupe 5

mammose *C. folii multipartiti*, *ponis sphaeroidis mammellantis* Molina.  
Hist. Nat. Chil. p. pag. 111.  
Habitat Chili

non vidi

compressa Q.

melopepo compressus P. Bauh. 312. Tab. ic. 476

Cucurbita genus. f. melopepo compressus alter Lob. P. Bauh. 2. 226

Habitat

herb. Mus. dedit Hussien

Tolia utraque scabra, petioli strigosi. Caulis pilosus.

bromoides Pan. - Species alternis hepatis sessilibus, calycibus anfractis involuicelli  
petalis, foliis brevibus La Mart. T. Enc. pag 170  
~~Habitata in Insula Francia~~

~~de~~ Burmanni

~~in h. v. notum~~

*Siderana* C. foliis angulato sublobatis tomentosis pomis lignosis globosis.  
Molina hist. nat. Chili p. 110  
- Habitat Chili

Non vidi

~~B. Bayley~~

Citrullus C foliis multipartitis Lin. l. V.

Anguria Citrullus dicta Bauh. pin. 312.

Citrullus folio colocynthis scito, semine negro. Bauh. hist. 2. p.

235.  
Anguria indica Rumph. Amp. 5. p. 400. t. 146.

Habitat in Apulia, Calabria, Sicilia C

Cauli sulcatus angulatus, tuberculi albi, si abes aqua se  
folia subpinnatifida laciniis <sup>venis</sup> inferiorem laciniatis  
obtusis alternis. folia supra glabra margine elevato scabro  
punctis numerosis albis scabra. Pedunculus at illius brevis  
hirsutus ~~foliatus~~

Cauli velis albidis hirsutus. folia pinnatifida, basi non cordata: lacini  
oblongo, obtuso, subseriatis, punctis callopi utrinque adpresso  
sape demum pinnatifida herb. Mus  
an hujus varietates

Anguria maxima indica H. Lugd. et

Anguria carne flavescente semine negro Tournef. Cor.