

Punica . Cor. ringens : labio superiore erecto, plano. Filamenta castrata  
duo. Sem. 4, nuda

52  
~~57~~  
Punica . Cal. cylindricus, 5-dentatus. Cor. ringens : labio superiore erecto,  
plano, emarginato; inferiore trifido. Stam. 4: 2. castrata sterilia

# Cunila

1. manana C. foliis ovatis serratis subsulcatis, corymbis axillaribus terminalibusque dichotomis
2. pulegioides C. foliis petiolatis oblongis subserratis, floribus verticillatis
3. thymoides C. foliis ovalibus integerrimis, floribus verticillatis
4. capitata C. foliis ovatis petiolatis integerrimis, floribus terminalibus umbellatis

mariana f. Cunila foliis ovatis serratis sessilibus, corymbis axillaribus terminalibusque dichotomis.

Calamintha erecta virginiana, mucronato folio glabro Morr. hist. 3.  
p. 413. 8. 11. t. 19. f. 7.

Calamintha mariana, mucronatis rigidioribus atterentis foliis, fls  
scilicet calyculis villis argenteis Plukn. mant. 347. 344. f. 1.

Hedysmos Michel. Ep. N. C. 174 d. app. 211.

Satureja origanoides; foliis ovatis serratis, corymbis terminalibus  
dichotomis Lin. Spec. pl. ed. 1. p. 568.

Cunila mariana; foliis ovatis serratis, corymbis terminalibus Lin.  
Syst. veg. 68.

Habitatio Virginia 4.

Caeculis erectis, ramosis, purpurascens, pili nonnulli ad genicula, costa  
rum glabres. Folia sessilia, pollicaria, extorsum remotiuscula serrata,

4 subtus obscure utrinque punctata. Pedunculibus bifidis; pedicellis unifloris in dichoto  
nervosa. mis, laterales biflori. Calyx striatus, non villosus.



capitata <sup>?</sup> *Cunila* foliis ovatis, <sup>verticillis axillaribus</sup> floribus terminalibus, umbellatis, <sup>per</sup>  
<sup>Stipulis unifloris</sup>  
*Cunila capitata* foliis ovatis, floribus terminalibus, umbella  
subrotunda Lin. Suppl. 87.

*Ziziphora clinopodioides*; foliis ovatis, verticillis axillaribus  
et terminalibus, calycibus pilosis subincanis La Martini <sup>morit</sup> illustr.  
1. p. 63

Habitatio Sibiriä

Paulis palmaris et ultra. Folia viri semipollicaria, integerrima  
inferiora obtusiuscula, superiora acutiora, glabra subtus obscu  
re venosa nervosa. Flores interdum tantum in umbella termi  
nali, interdum verticillis cum verticillo approximato in penultimis  
foliorum tam in spontanea quam in culta, plures, pedunculati  
breves. Calyx pilosus. Corolla purpurea. Anthera nigra.

<sup>#</sup> discrepat,  
<sup>ill.</sup> *Ziziph. clinopodioides* <sup>mei</sup> La Martini nullo modo specimen enim  
ab ipso <sup>viro</sup> Cel. viro comunicatum uti et ex herbo parisiensi in  
omnibus conveniunt Cel. specimen et Sibiriä a Cel. Rudolphi  
Missem.

1 maniana *Quinila* foliis ovatis serratis corymbis terminalibus dichotomis S.V. p. 67. l. ~~Spec.~~  
II pag. 30. 1.

*Calamintha erecta virginiana*, mucronato folio glabro Moench. h. 3. p. 413. f. 11. t. 19.  
f. 7.

*Calamintha maniana*, mucronatis rigidioribus & serratis foliis, & calyculorum  
calyculis videlicet argenteis Rich. man. 34. t. 344. fig. 1.

~~*Thymus* foliis ovatis acuminatis serratis, corymbis lateralibus terminalibus pe-  
dunculatis Gronov. Syn. 64.~~

*Hedyosmos* Mitchel. Eph. N. C. 174 p. app. 211

*Satureja origanoides* Spec. Pl. 1. p. 56. 568.

Habitat in Virginia 4

~~Caulis erectus purpurascens & tergo ramis oppositis. <sup>glabri</sup> <sup>ad gemmula</sup> <sup>velut</sup> <sup>folia</sup>  
Lespedea polliciana <sup>ex herbis remotis</sup> glabra utraque punctata. Corymbi <sup>axillares</sup>  
terminalis <sup>by</sup> oppositi <sup>by</sup> dichotomi fastigiatu pedicellus dichotomus  
uniflorus laterales biflori Calyces serrati ore tomentosi~~

Lespedeis corymbis axillaribus terminalibusque dichotomis

glabella 3 Parila foliis inferioribus oblongis superioribus lanceolatis estrossum  
remote serratis, pedunculis terminalibus ternis.

# Habitat in America septentrionali. <sup>in perennis</sup> ~~Herb. Richardi~~ 4

Tota glabra. Caulis erectus, six pedalis, simplex. Folia petiolata, ses-  
qui-pollitica, folia superiora pauci serrata, ~~obovata~~ <sup>obovata</sup> p. suprema  
integerrima. Pedunculi brevis semi, calycis ~~obovatis~~ <sup>obovatis</sup> ~~obovatis~~ <sup>obovatis</sup>

# Parila glabella; perennis, erecta, glabra: caule tetragono fistuloso: foliis in-  
ferne angustatis, ovali-lanceolatis: floribus paucioribus pedicellatis: calycis  
oblongi dentibus brevibus, aristatis. Michaux fl. bor. Am. t. p. 13.

4 acinoides *Ziziphora floribus* lateralibus, foliis ovatis S. V. p. 68. 4. Sp. pl. p. 31. 4. 4  
*Clipropodium supinum* ineanum Linn. nith. 66.

Habitat in Sibiria O

Habitus *Thymi* acinosi, sed omnia quintuplo majora. Folia *Zizi-*  
*phora* capitata. Flores copiosiores quam in tenuiore. Calycis  
hispidi. Stamina extra tubum

character haud sufficiens

non vid

pulegioides 4 Punila foliis oblongis subserratis, pedunculis axillaribus multifloris  
melisa floribus verticillatis glomeratis secundum longitudinem caulis,  
foliis tomentosis. Gron. Virg. 167.

~~Melissa pulegioides~~ 1. ed. p.  
Melissa pulegioides Lin. Spec. plant. ~~1. ed.~~ 593.

Punila pulegioides foliis oblongis bidentatis, floribus verticillatis.  
Lin. Spec. pl. 12. p. 30.

Habitat in Virginia, Canada siccis ☉

Caulis perithamiosus, erectus, inferne ramosus, pubescens: rami simplic-  
es. Folia petiolata, semipollicaria, lanceolato-oblonga, <sup>acuta</sup> utrinque  
in medio serratura una altera, supra integra, versus  
marginem vix villosa, subtus pallidiora. Pedunculi secundum  
totam longitudinem planta, gemini et singulis axillis, apice  
diphylli, tri vel quinq. flori. Calyx curvatus: labium superius  
4. lobis calinis que ascendens inferius dentibus duobus setaceis. Corolla alba, fau-  
niloso ciliatis. se villosa violacea. filamenta quatuor, duo castrata.

perfoliata Calceolaria

Habitat in Peru herb. Jusf.

Caulis villosus: rami oppositi. Folia perfoliata, pollicaria vel minor, latitudine  
et longitudine aequalia, cordata, dentato-incisa, dentibus ovatis, inaequaliter  
serratis, supra villosis pilula, subtus pubescentia, venosa. Petiolus e basi folii  
decurrente membranaceus, basi dilatatus cum opposito connatus, dentatus.  
Calycis laciniis ovatis.

Thymoides 5 Cunila foliis ovalibus integerrimis, floribus & verticillatis, cau-

le tetragono Lin. Spec. pl. 31. <sup>ed. 2.</sup> +

Acinus thymifolus et facie floribus in expansis mons. hist. 3. p. 404  
p. 11. t. 19. f. 6.

Thymus pulegioides Lin. Spec. pl. ed. 1. p. 59 2

Habitat mons. pelii. O

Caulis epithamios erectus: ramis pauis, brevibus, simpliibus  
foliis obtusis verticilli secundum totam longitudinem plantae.

Sub nomine C. Thymoides plantam habui in omnibus simi-  
lis Thymo piparella, nisi quod omnibus partibus triplo minor,  
nam vero eadem ac Lin. Thymoides est, asseverare non  
audeo ut potest planta genuina Linnei michi non nota.

Habitus Th. Caulis tetragonus: rami oppositi, simplices. Folia petiolata  
+ herbaceus opposita, indivisa, utrinque punctata. Calyx <sup>degen</sup> strigatus, fruce illo  
sa

*pulegioides* Cunila foliis oblongis bidentatis, floribus verticillatis L.V. p. 67. 2.

Spec. pl. pag. 30. 2 \*

Melissa floribus verticillatis glomeratis secundum longitudinem  
caulis, foliis tomentosis Gron. Virg. 167. Vahlm. d. 2. p. 314.

Melissa pulegioides Spec. pl. 1. p. 593.

Habitat in Virginia, Canada & sicca ☉

Planta fruticosa baccata ~~per~~ caule pubescenti. Folia petiolata  
~~opposita~~ lanceolato-ovata superiora angustiora, unguiculata deat.  
ferrata una alterave vel integerrima <sup>in pulgosa de Virginia</sup> glabra subtus pallidiora  
punctata. Verticilli secundum totam longitudinem plantae. Calyx decem  
lobus <sup>pulegi</sup> ~~lobus~~ <sup>superioribus</sup> ~~superioribus~~ <sup>inferioribus</sup> ~~inferioribus~~ inflexo aluminato: inferiores setulosi. Seta  
mentata 4. duo caespata Calyx curvatus ascendens

8 tris et lacinis  
ultra calicem

petiolatis  
subferenti