

Cupressus

1. disticha C. foliis distichis patentibus
2. sempervirens C. foliis imbricatis, frondibus quadrangulis
3. pedunculata C. foliis imbricatis glandulosis, frondibus quadrangulis glaucis, ramis dependens
Cupressus Libani.
4. thyoides C. foliis imbricatis, frondibus arborescentibus
5. japonica C. foliis quadrifariis falcatis compressis sulcatis decurrentibus
6. ^{penicillata} dichotoma C. foliis ovatis, ramulis dichotomis pendulis
7. columnaris C. foliis imbricatis subulatis sulcatis, strobilis cylindricis elongatis
8. juniperoides C. foliis oppositis decussatis subulatis patulis
9. pallidus C. frondibus terribus foliis ovatis

Disticha & foliis distichis patentibus Linn. S. V.

Cupressus virginiana, foliis acatis deciduis Com. bot. t. p. 113.
Tab. 57.

Cupressus virginiana, foliis acatis conigeris pambis et deciduis
Pluk alm. 125. Tab. 85. fig. 6.

Cupressus maritima Cat. Arb. Carol. 1. p. 11. t. 11.

Habitat in Virginia, Carolina. &

patent a foliis approximatis fructe distichis
mutans p. foliis remotioribus subparvis

Rami glabri purpurascetes; supremi compressi. Ramuli aeterni foliosi.
Folii lineari sessili alterni glabra unguiculata, acuta

Sempervirens & foliis imbricatis, frondibus quadrangulis Lin. S. V.

13 fructa: Ramis erectis fructibus

Cupressus Cameracensis 52. Bauh. pin. 480.

horizontalibus. Cupressus ^{ramis horizontalibus} ramos extra se spargens s: mas Tournef. A. R. H. 507.

Habitat in Creta 5

Rami obscure tetragoni imbricati foliis ovatis mucronatis dentatis
folia frondum parva sulcis parvo dorso emant.

^{Custancia}
~~pendula~~ & foliis imbricatis glandulosis, frondibus quadrangulis glaucis,
ramis dependentibus Hort. kew. 3. p. 373. & Heret. stup. nov. p. 15. tab. 8.
Cedrosex yoa Ray Letters p. 171.
Habitat. 5

Thyoides @ foliis imbricatis, frondibus angustibus Lin. Spec. pl. pag. 1422 +
S. V. pag. 861

Cupressus nana maxima, fructu conules parvo Pluk. mant. 61.

Tab. 343. fig. 1.

Habitat in Canada subhumidis

Rami teretes glabri ramuli & foliis perispermatis dentatis. Frondes
compressi folia decussata adpressa medio depressiusculi. Strobili
magnitudine baccae juniperi conulescentes

japonica C foliis quadrifariis falcatis compressis sulcatis decurrentibus Thunb.
fl. jap. 265. S.V. pag 807.

Cupressus japonica foliis trif. quadrifariis acensis falcatis quadrifurcatis
compressis canna decurrentibus confluentibus L. et suppl. p. 421

San triumph. am. exot. 5. pag. 803.

Habitat in Japonia

Arbor celsissima crassitie femoris. Totia tri vel quadrifaria, decurrentia,
canna subulata apice incurvato-falcata, compressa, quadrifur-
cata, peltata, unguiculata, glabra. Spica mascula terminalis,
plurima, ovata, obtusa, glabra. Strobili foeminei globosi, rari
solutarii inferioribus in ramulis. Squama peltata: pelta dorso recta
squama lanceolata, margine interiori sexdentato; dentibus subulatis
Thunb.

Dichotoma
pendulaf. @

Folii oppositis ovatis, ramulis dichotomis pendulis Thunb. ^{92.} jap. pag.
266. LV. p. 86/

Si mos Kompp. Am. ex. foli. 5. pag. 883.

Habitat in Japonia }

Arbor oxyalis, exsita. Ramuli alterni, laci, aphylli, valde ramulofi.
ramuli dichotomi, filiformes, foliis recti, longi, patuli, lusi, omnino
penduli. Folia decidua, ciliolata, ovata, acuta, apice paucum
patula brevissima. Thunb

columnari Cup. foliis imbricatis subulatis sulcatis prohilis & glandosis elongatis

Dorr. prod. pag. 67.

Habitat in nova caledonia et Norfolkis insula.

non vidi

juniperoides & foliis oppositis decussatis subulatis parulis Cn. L. V.

Cupressus foliis linearibus simplicibus conicatum prostrata Mill.

Det. n. 6.

Habitatio Cap. 6. p. 17

pallidus Cupressus frondibus teretibus foliis ovatis.

Habitat in Cap. b. p. i.

Rami et frondes teretes umbriati foliis ovatis dorso sulcatis pallide
viridibus. Amenta masculina terminalia.