

Cuscuta

1. Europa l. floribus ^{sub}sertis, calyces et corollae obtusis quadrifidis
2. epithymum l. floribus sessilibus quinquefidis bracteis obsoletis
3. americana l. floribus pedunculatis digynis
2. monogyna l. floribus pedunculatis monogynis

Graminea Lourina species hujus generis sic: Hispan

corymbosa P. floribus pedunculatis corymbosis, corollis ovatis, necatis nullis
flor. Peruv. t. pag. 69. tab. 105. fig. 6.

Habitat Peruvia cultis, parasitica super frutices et Medicagoem sativam.
Caulis volubilis, aphyllus, succosus, hyalinus, tenerissimus, laevissimus
hinc inde rugosus, luteo, croceus, lavis. Squamae ovatae, concavae, solita
ria ad ramorum divisiones. Pedunculi ex ramorum divisionibus. Pedicelli
bracteae ovatae, concavae, solitariae fulcratae. Calyx 4-fidus, albus: laciniis
oblongis obtusis. Corolla alba, ovata, calycis duplo longior, ora parva, qua
diffida. Stamina 4. Semina solitaria, aut bina fl. Peruv.

odorata. C. floribus congestis sessilibus; corollis campanulatis patentibus pentandris
necitani squamis fimbriatis fl. Peruv. 1. pag. 69. Tab. 105. fig. a.

Habitat in Lima segetibus et versum ^{transitum} in mediagene sativa et fruticibus.

Caules ramosissimi, volubiles, filiformes, teretes, repens, pallidus; linculis
nonnullis purpureo-oculis maculatus, aphyllus, succosus, hyalinus, hinc
inde punctis est operatus. Squamae minime, ovatae, solitane ad ramorum
divisiones. Flores ex ramorum divisionibus, in capitulis congesti, fragrantibus,
stipitati squamis ovatis, cernicis. Calyx albus, purpureo punctatus
cyathiformis, basi carnosus, squae floris: laciniis subrotundis, obtusis
Corolla alba, campanulata, semiquinque fida, calycis duplo longior.
laciniis ovatis, acutis, patentibus reflectis. Stamina corolla breviora, infra
fissuras inserta. Germe subrotundum. Styl. 2. Stigmata capitata. Capsu-
la subrotunda, biculata, in calyce et corolla carnosae involuta
fl. Peruv.

1
aphylla grammica Lour-fl. Cochinch. pag. 171.

Habitat in Cochinchina.

Caulis linearis teres, albus, internodiis - volubilis ramis herbis
obtusis simplicibus. Folia nulla. Prodest compressa nulla. Flores laterales
nervi congesti albi. Cal. inferius ~~unicolatus~~ unicolatus 5fidus laciniis
acutis carnosis, coloratis. Corolla limbi laciniis 5que rotundatis
germen subrotundum. Stylis 2. Stigmatibus compressis subrotundis.
Bacca membranacea subrotunda 4loba.

Cuscuta speciei

non videt

afriana Cuscuta pedunculis unifloris, floribus quinquefidis Wild-
spei: pl. pag. 703.

Cuscuta americana floribus pedunculatis Thunb. prodr. fl.
Cap. pag. 32.

Habitata Cap-b-spei adfontibus. ✓

non vidi.

cherespe Cupifera flombus paniculati quinquefido: calycis anguloso longis.
Dine Conlla La math. T. En: p 353.
Habitatio China
Pedunculis ramis.

non vidi

Epithymum 2 floribus sessilibus quinque fideis bracteis obvallatis Loef. II.

Fl. Dan. Tab. 427

Epithymum f. *cuscuta* minor

Habitat in Europa plaris

glomeruli florum globosi magnitudine *Pip.* albid. minores quam in
Europa Petala ac uti fila purpurascens capillaria

• europea C. Clombus seplebus Lin. sp. pl. p. 180* 8^o. Icon. tab. 199

Cuscuta Cam. epid. 104.

Cuscuta major Bauh. pin. 219.

Habitat in plantis Europae, parasitica annua C.

Cloni sepe pedicellati Calycis et corollae obtusa. Flos purpureus aut roseus

4 americana & floribus pedunculatis Loef. Fl. 216.

Cuscuta inter majorem et minorem media, filamentis longis et floribus
late super arbores et campos se extendens Sloan hist. 1. p. 201. tab. 128. fig. 4.

Habitat in Virginia et Insulis Americanis

Stola purpurea. Flores glomerati pedunculi breves Calyx et Corolla
pilis minutis simis aeneis nitida majores quam in Europa

Cuscuta

monogyna

Cuscuta floribus pedunculatis monogynis

Cuscuta orientalis, viticulis crassispinis, convolvuli fructu Four

ref. Corol. pag. 45

Habitat in oriente

Lacini Cusc. americano ad omnia duplo majora.

Lacino Calycis ovato, mitido ^{supreme}

Corolla calycis duplo longior, collo angustata; ^{persistens} lacino dentibus curvis

lati ~~persistens~~

Stylus longitudine corollae, crassus et brevior quam in reliquis

persistens; ~~extra capsula~~ stigma crassum, subglobosum

Capsula magnitudine Piperis, mucronatum ^{Stylo et stigma per}

Semina quatuor, compressa, subreniformia

(procipe differt a reliquis ^{in p. p. m. s.} stylo unico.