

Cussonia

1. Thyrsiflora C. foliis digitatis: foliolis pappilibus cuneiformibus truncatis tri-
dentatis, floribus racemosis
3. speciosa C. foliis digitatis: foliolis petiolatis spatulatis: ligulatis
palmatis ^{parvis} serratis, floribus speciosis

tomentosa Cussonia?

Habitat in Brasilia herb. Gu.

Rami teretes, crassitie pennae cygneae, glabri. Folca petiolata, patentissima, digitata. Foliole petiolata, 6-7. bipollicaria, lateralia minora, cuneata, emarginata, cum mucro-
ne brevissimo, supra avenia, nitida, subtus obscure venosa, incana e Tomento venosifi-
mo. Petioli 3-4 pollicares, teretes, basi dilatati. Pedunculi terminalis, 3-4 pollicares,
e caelo pedunculatum tuberculati: partiales uti calyces ferrugines tomentosi, sparsi. Brac-
tea minuto, ovata, rigida. Calyx parvus, quinque dentatus.

Thysiflora Cussonia

Habitat in Cap. b. spec. herb. Guss.

Stem quatuor-digitata. Siliola obcordata, sessilis, pollicaria vel parum ultra,
glaberrima, vix venosa, supra nitida, mucrone brevi terminata. Petioli teretes,
sternati. Pedunculus quinque pollicaria vis, teres, glaber. Flores conferti in racemo
bipollicari

Incisa Rufonia

Habitat in Cap. b. sp. herb. fus.

Folia digitata, pinnata: lobata petiolata, pithamoa, lobata minima, utrinque acuta, basi attenuata, integra vel 3-5-loba in medio: lobi triangulari; Terminalis lanceolatus, alia folia pinnata, pinnae decurrentes, triangulari; extremis lato-lanceolata. Petiolus teres, semipedalis

^{spicata}
Cusponia foliis digitatis: foliolis petiolellatis spatulatis: cymula tris. quinque
palmata acuta serrata. Floribus spicatis. Lin. Suppl. p. 102. t. v. 292.
Cusponia spicata Thunb. Act. Upp. vol. 3. p. 13
Habitat in Cap. bono spei

thyrsiflora
thyrsiflora

Cuscuta foliorum digitatis: foliis sessilibus cuneiformibus truncatis tridentatis,
floribus racemosis. Lin. Suppl. p. 102* S. V. p. 292.

Cuscuta thyrsiflora Thunb. Act. Ups. vol. 3. p. 112.

Habitat in Cap. b. p. 5.

Caulis induratus inferne scaber, inaequalis simplex, crassitie digiti; superne simplex
et flexuosus. Folia in summitate caulis, approximata, alterna, petiolata, digi-
tata, quinata. Foliolela inaequalia, vix emarginata, apice basi raro qui-
quedentata: dentibus remotis, obtusis, parvis; consistencia Menyanthis.

Petioluli longi. Stipulae interspersae. Racemi terminales, umbellati. Radice
quatuor simplicissimi, infra nudi; apice e floribus racemosis: racemo cyl-
indrico.

Varietas hucusque est foliolis articulatis, articulo infimo apice in lobos
minores dilatato, unde foliolela quasi prolesera.

nono.
an *Banalis* species