

Cyanella

*Cutea Cyanella* foliis ensiformibus ramis erectis Lin. Suppl. p. 201. #. Vray

329.°

Habitat in Cap. b. p. ei.

Filamenta <sup>basit</sup> in urticolis nates ut in reliquis. Differt a *C. capensi* foliis radi-  
calibus lanceolatis, nec linearibus. Pedunculis minus discariatis. Petalis  
majoribus luteis Lin.

2 Capensis Cyanella foliis linearis lanceolatis undulatis ramis patentissimis lina.  
Suppl. pag. 201. S. V. pag. 329. Meerb. u. 41.

Habitat in Cap. bono spec.

Radix ut in alba. Caulis superne dichotome ramosis Versus loris folia  
paucis lanceolata attenuata nervosa inferna tripolliaria  
Racemus terminalis. Pedicelli patentissimi filiformes, unguis  
Cares Bractea <sup>capitata</sup> ad basin pedicellorum foliolum setaceum in medio  
pedicelli



2 alba *Cyanella foliis linearifoliis linearifoliformibus* Lin. Suppl. p. 201. S. V.  
pag. 329.

Habitat in C. Sono p. 24

Radix fusiformis spithamea. Folia radicalia, plura canaliculata palmata.  
Scapus simplicissimus foliis uno alterove adpressis, vase femi-  
nalis unifloris. Petala oblonga tria extenora acuta, interna obtusa.  
Anthera inaequales lineares petalis breviores.

onchidiformis C. folius lanceolatis cartilagineo denticulatis

Cyanella onchidiformis Saliqu. coll. 4. p. 211.

Habitat ad Promontorium b. p. c. 2.

Tota glabra. Folia elongate lanceolata vel oblonga, acuminata, margini  
cartilagineo minutissime denticulata nitida, duobus inferius inferne attenuata  
caulis alterna vaginantis 4-6 pollicaria. Caulis erectus, ramis axillaribus,  
ramis flexuosis, subargulatis sesquipedalis. Flores racemosi.  
Bractea linearilanceolata, pollicares. Corolla violaceo-purpurea  
plana. tria petala interiora in unguem angustata.



Pileoloma My