

Cynara

1. polynus C. foliis sub pinnatis pinnatis indivisive, squamis calycinis ovatis
2. Cardunculus C. foliis spinosis: omnibus pinnatifidis, squamis calycinis ovatis
3. horrida C. foliis pinnatifidis subtus tomentosis spinosis: spinis bases foliorum
pinnarumque basi connatis
4. humilis C. foliis spinosis ^{bi} pinnatifidis subtus tomentosis, squamis calycinis sub
latis ^{ovatis}
5. integrifolia C. foliis lanceolatis dentieulatis, squamis calycinis lanceolatis
acuminatis
6. acaulis C. acaulis foliis pinnatis inermibus supra glabris, squamis calyci-
nis lanceolatis, squamula laeva.

Scolymus C. foliis subsimplicibus pennatis indivisisque, calycinis squamis ovatis Len. f. v.
p. 720

Cinara sylvestris latifolia Bauh. pin. 304.

β. *Scolymus droseroides* Clus. hist. 2. p. 153.

Cinara hortenii aculeata Bauh. pin. 303.

γ. *Cinara hortenii*, foliis non aculeatis Bauh. pin. 303.

Habitat in G. Napolitani, Italia, Sicilia agris &
cultis. Caulis 3 pedalis glaber, simplicissimus.

Cardunculus Cynara foliis spinosis: omnibus pennatifidis, calycinis squamis ovatis L. Sp. pl.
p. 1159. S. V. p. 728.

Carduus aculeatus Matth.

Scolymus aculeatus Takem. h. 10 75.

Cynara spinosa cuius pediculi esitantes Bauh. Pin. 383.

Habitat in Creta. 4

Hybridam f. natam ex *C. Scolymo* femine asserunt. F. Bauh. flos saturata corollae
corollae et pistilli, at stamina cinerea L. Sp. l. c. subnervolata

descript.

Scolymus
humilis

Caulis striatus canescens subtomentosus. Folia angusta ^{valde} recurve pinnata
pinna linear-lanceolata dentibus nonnullis spinosis ad marginem
subopposita, f. Petiolus spinosis. Tolia ^{et} Calycis glabra in pinnam
vulidam exeuntia nigra

in herbano non dicit

horrida Ⓞ foliis pinnatis fedis subtus tomentosis spinosis: spinis bascos foliorum pennarum
que basi connatis Hort. kew. 3. p. 140

Habitat in porto Sancto prope Maderam 4

non vid.

1716

humilis Cynara foliis pinnatifidis subtus tomentosis, calycinis squamis subulatis
Len. Spec. pt. 1159* S.V. p. 720.

Cynara sylvestris botica Clus. cur. post. 35.

Carduus humilis Tingitanus: conleus magno strobilo tenuis laciniatus Mont. 3.
p. 150.

Carduus Tingitanus, flore magno conleus, folia atractylidis divisura subtus incano,
spinis durioribus horrido Pluk. Alm. 05:7. 01. fig. 2.

Habitat in Agro Tingitano, in Botica 4

Semina in hac specie minore, reliquis longe majora et singularia - Caulis longi-
tudine vix foliorum - Calyx ovato-oblongus: squamis patentibus

1-2. entognifolia ^{~~Pyræna~~} Pyræna foliis lanceolatis denticulatis, ^{Squamis} ~~foliis~~ calycinis lanceolatis
acuminatis.

~~Habitat~~ In montibus versis Tole tum Castilio novo ^{invenit} Dr. Barnades med.
madritensi, Botanici diligentis pinis. qui ~~florant~~ ^{affert} Hispaniam

Planta humilis glabra, caule simplicij, strato.

Folia petiolata, lato lanceolata, spinulis ~~remota~~ ^{remota} ~~et~~ ^{et} ~~remota~~
denticulata, mucronata, sesqui pollicaria

Flos terminalis, pedunculatus, solitarius, scoliimi duplo minor.

Squamis ² Calycibus lanceolato-acuminatis: inferiores spina supina
gente terminata.

Corollo ~~corolla~~ conleca

4-5: auriculofolio *Stachis scapo* ^{sub simplicij} ~~capitata~~ ^{ramis teretibus}, ^{spicis lateralibus terminalibusque secundis,} ^{patentibus, spatulatis} ~~floribus confertis~~, ^{foliis} ~~obovatis~~
mucronatis.

Limonium lusitanicum, aunculo usq[ue] folio Tournef. F. R. H. p. 342.

Habitat in Hispania. 4 Broussonet

Radix superne divisus ut in affines

Folia omnia radice alia, plura, spatulata vel obovata, crassa, enormi
mucrone rigido terminata, semi pollicaria.

Scapus erectus, teres, lavis, fistulosus, rami nulli nisi pedunculij simplices
teretes patentibus, laterales et terminales.

Floris sup[er]

Spicis ^{oblongo} solitariis interdum binis. Flores conferti semi, secundi duplici serie
4 intra bractea quatuor, inaequales inclusi. Bractea inaequales exten-
siores breviores ovato, ^{interiores} ^{maiores} ^{marginatae} ^{albatae} ^{omnes}
^{marginatae} ^{membranaceae} ^{albatae} ^{omnes}
duo alio ad angulum florum alium.

Alia huiusmodi foliis lateribus brevioribus

acaulis C. acaulis, foliis pennatis inermibus supra glabris ^{Squamis calycinis lanceolatis} Lin. - J. V. p. 72. 84
Squamula flacca.
Cynara acaulis Tunetana Tagga dita, magno flore saavis et oleata
Till. ref. 41. 7. 20.

Habitat in ^{hircisimis d'ad vai} Barbana ^{in orbem cernafa}
Folia radicalia ^{petiolata} alia ^{indurata} elliptica obtuse dentata, alia ^{dentata}
in cifa ^{basi bipennatifida pinnis, integris} alia ^{trifido pennatifida} latius ^{terminali maxima} elliptica
lateralibus ^{dentato incis} lanceolatis: alia ^{pennatifida} latius

^{terminalium} pennulis ^{lanceolatis} bipennatifidis omnia supra rugosa viridia inermia, subtus tomentosa
alternis obtusis ^{nycea}. Flores in ^{intra} radice ^{basili}, squamo ferruginea imbricata
interdum ^{intempe} ^{apice} parum dilatato membrana ^{panosa} lacera. Tubus corollarum
pennatifidis albius ^{limbi} obtusius. Filamenta alba. Anthera violacea. Pappus
longitudine fere ^{flosculorum} basi alba, superne purpurea

herb { Cynara armena moschata acaulis foliis jacobaeo Tenemus incis
Tournes { Squamis calycis sursum spectantibus Tournes.
Cynara cappadoecia moschata acaulis foliis jacobaeo, Squamis
calycinis deorsum inflectis Tournes