

Cynofur^{us}

Sphaerocephala
~~Capitata~~ *Sestena* *Cynofunus* *bracteis* *integri* *specis* *globosis* *Farqu.* *Musi.* 2. pag. 71.

Sestena *Sphaerocephala* *culmo* *simplicis*, *enodi*, *specie* *subrotunda*

habitat *in* *Italia* *et* *desertis* *arduini*

culmi *plures* *digitales* *filiformes* *basi* *folesci* *glabri* *inferne* *vagina*

lati *perispicantibus* *glabri* *stratis* *seti*. *Folia* *filiformia* *vel*

linearia *glabra*. *florae* *speculo* *terminales* *semples* *capitatae*

Calycis *valvula* *membranacea*. *corolla* *biflora* *corolla* *lineari* *cornu*

valvula *oculo* *armato* *ciliata* *in* *exterior* *ante* *unicos*.

antheris *2*. *brevioribus* *bracteis* *1* *five* *3* *subrotundis* *membranaceis*

sub *capitulo*

capitulum
magnitudine
nisi
unius
antheris
anterior *bidentata*
binervis

haec unum procedente a *Cynofuni* videtur

brevisfolius Cynoporus spica composita spiculis aggregatis calycibus oblongis

multis

Habitat in Lima Thonin

Tacis Cynof

Culmus tamofus glaber, vaginis foliorum setibus

Folia lanceolata, sesqui polliciana, glabra. vaginis culmo 3 pda

latioris internodis longioris longitudine foliorum

Spica terminalis fist. tri polliciana a spicis pternimis linearibus
unguicularibus tres vel quatuor ad singulum dentem ra
cheos. 8 lase Flores parvi ad latus interius racheos

Tacis spiculis reflexo differt foliis lato lanceolatis, spiculis brevioribus
valvulis calycinis obtusis, flombus minoribus habetibus

Poppali

#

ex nodis Paspalum calycis uniflor

est

polybaccatus *Cynosuavis*

Habitat herb. La Martini.

affinis *Cynosuavis* *crustato* - *Spica* *villosa*

paniculatus Cynopuri fruticosa composita ovata, calycis multifloro, glume
altera mucronata, corollis basi pilosis Thunb prod. pag 23
Habitat in Cap. b. pra.

non vidi

70

Enfistatus & *bracteatis pennatifidis* P. V. — fl. Dan. V. 230. Schreb. gram.
69. t. 8. fig. 2.

Gramen proterae *Enfistatum* f. *spica Enfistata* Cori. Bauh. prodr. 8.
Jun. 2. Scheuchz. gram. 79.

Gramen *Enfistatum* Bauh. hist. 2. p. 460.

Habitat in Europa partu 2

Palmis erectis sesquipedalis vel ultra simplex foliosus. Solis plani
linearia et angusta glabra ~~perispermia~~ *spica* bipollinari pennis
bracteanis subulato marginibus utroque albedo medio viridi. varicis
calycibus canaliculato attenuato ~~in arietem~~ longitudine pinnula, 3 floris
valvula corollina canaliculato ~~in~~ subannulato

multibracteatus P. bractei specia secunda subnervosa, bractea pectinata
ad speculam plantae. Pers. d. p. p. 97.
Habitat in Barbaria ~~multibracteatus~~

nihil ignot.

~~Salviafolia~~ Lant B. foliis lanceolato-ovatis cordatis rugosis Hort. Kew. 1.

~~p. 150~~

~~Lantana salviafolia~~

7-8 monostachyos Cynopous Spica terminalis, calycibus subulatis bifloris ^{mutis} subtrifloris, flosculis
angustatis

Habitat in India Orientali Roenig

Pulvis erectus; sesquipedalis, glaber, folia ¹

folia subulata, angusta.

Spica terminalis, solitaria, spithamea. Rachis extrosum convexa carina
to af latere interiori,

l coris alterni, pa umbriati, glabr.

Calycis valvula subulata, semunquiculata; exterior coris major longi
tudine gem flosculorum; interior brevior.

Corolla valvata
flosculi basi se barbati, compressi, hermaphroditus se se plis, major minor
textus sterilis; valvula exterior omnium carinata, sub apice an
frata; arista patente, calycis longioris.

Radix Scorpoides-herb. La Martk.

70 Filiformis Gymnosunis Spica solitana disticha, calycibus subulatis trifloris
aristatis, flosculo sterili mutico

Habitat in India

Palmi repentes, ramosi, filiformes, inferne compressi et internodiis
pollicaribus. Rami floriferi ex apice, simpliciter serpenti, aristati,
foliolo unico subulato serpenti medium et latera

Solia ad nodos utrinque plura, sesqui pollicaria, conduplicata,
equitantes, Vagina compressa, equitantes, longitudine fol-
internodionum, foliis laterales.

Spica terminalis, solitana, pollicaris, linearis. Flores parvi,
compressi, glabri. Alterni,

Calycis valvula patentes, pauc subaeuales, longitudine flosculorum,

Corolla valvula exterior sub apice aristata.
^{mut. aut. o}

Flosculi plerumque tres altis sessili hermaphroditi, alter pedicel-
latus masculus, tertius sterilis.

Corolla valvula exterior sub apice aristata in masculo et herma-
phrodito, sterilis mutico. Arista calycis paucum longior

Ramosus Bromus culmo ramosissimo, spiculis sessilibus ~~aristatis~~, foliis involuto setaceis
Gramen spica Brizo minus Plukh. phyt. tab. 33. fig. 1.

Bromus ramosus culmo ramosissimo, spiculis sessilibus, foliis involuto-subu-
latis Lin. Mant. p. 34. l. v. pag. 120. cum synonym. Schumbr.

Bromus Plukenetii foliis convolutis pungentibus, locustis binis terminata
Libos. All. fol. Pedem. n. 2233.

Habitat in aridis, saxosis Europae australis, Barbariae, et orientis

Rad. Culmi ascendentes, basi ramosissimi. Rami compositi, fasciculati,
tandem in spicis pedales, periclytrinodes, ^{foliis for missis} simplicibus, exer-
scentes. Folia

Folia in spico superiora plerumque duo, infera approximata patentia
sumo culmo triplo angustiora, glauco, vix infra sesquipolliciana

spico plerumque gemino, interdum & solitario, plerumque gemino
inferior sessilis, ^{etiam in 2 striatis sub compressis} septes ^{pollicares} et ultra, angusta, glaberrima

11 — 21 flo

Calycis valvula lanceolata,

valvula exterior aristata brevi, margine denticulato-ciliata

2-penicillatus Broom Cynosu spicis polyatis, calycibus quadriflori dorso anfractis,
petalis exterioribus anfractis hermaphroditi penicillis barbatis
+
Habitat in India Orientali

[Ltr. P. pag. 21.]

Culmus: Teres, erectus, subtilissime striatus, superne pubescens.

Spicis Terminalales, ternis, interdum solitariis, brevibus ^{icellato} ^{dunculato} basi barbato, quadris vel quinque pollicares, erectis, ^{icellato} ^{dunculato} versus rarius parum recurvo. Rachis extorsim convexiusculus, intus canaliculatus

Flores e lateribus tantum interiori, sessiles, alteri, conferti, subulati, subcompressi, patentes.

Calycis quadriflori: valvula interior ^{inferior} ovata, acuminata, subdiaphana: exterior superior, lanceolata, attenuata, ^{in sextam} interiori triplo longior, compressa, carinata, dorso sulco exarata, linea utrinque ad sulcum elevata, ciliata; anista in medio valvula erecta, flore insequente incumbente, longitudine ipsius valvula.

Flores quatuor, basi barbati, duo hermaphroditi petalo exteriori

Petala anista ^{interior} petalo exteriori superne ^{interior} ciliata penicillis duobus et ciliatis pulvis albi longis mollibus ^{interior} medio anfractis: anista unguiculari recta. Flores duo minoris mutici, an masculi

uncolo Q. cbracteatus, spica secunda, spiculis bifariis alternantibus
adpressis ovatis carinatis obliquis Lin. Suppl. p. 110. & L. V. p. 117
Habitat ad Cap. S. spici

Culmi sesquipedales erecti basi vaginati et foliosi. Folia duo in
culmo remotissima, simplicia. Folia longa primum con-
duplicata deinde plana basi rigidiuscula culmi. vix polli-
ciana. Spica terminalis bipolliciana pedunculata imbricata
secunda per culmum sub spica tomentosa. Tubula calycina
lineari glabra nervis angusta, gl. lupis rufis. corollae ex-
terior lata obcordata conduplicata emarginat margine dorsoque
velloso ^{membranacea} interior angusta lineari brevior

phleoides C

Cynodon phleoides foliis villosis; floribus dense spicatis; spiculis trifloris aristatis pubescentibus Desfont. fl. Atl. pag. 82.
tab. 10.

Habitat in arena ad littora maris Barbant C

Leysani C. panicula ovata laxa, floribus fasciculatis, calycis valvula altera
anastata bracteis setiformibus. Defend. fl. Att. pag 82. tab. 117
Habitat Algeris C

non vid.

ciliolatus & bracteis pennato-paleaceis anfractis Lin. l. V. p. 1164

Gramen alopecuroides, fructu a fructu trauk. pin. 4. Schenckia gram
80

Gramen alopecuroides, fructu a fructu trauk. var. 7. 123.

Habitat in Europa australi, Arabiana oriente

Culmi pedales simpliciter glabri inferne cernati. Folia plana
siabra. panicula fructu ^{rigidius} secundata ovata. Bracteae oppositae
distantes in setam longam attenuato siabra.

virgatus 2

panicula ramis simplicibus, floribus sessilibus postfloris,
ultimo sterili; in femis puberulis Lin. Am. aind. 5. pag. 3934

Grassaeen doctylon panicula longa e spicis plurimis gracilio-
ribus mollibus compta Sloan hist. p. 113. t. 20 fig. 2.

Habitat in Tamauc.

grammae altum. Folia plana unquam late retrosum scabra.

panicula terminali e spicis longis elongatis filiformibus
pithamiois spicula ^{composita} equidistantibus & linearibus valvula calycina lanicula
ta spicula brevior ^{acuta} flexibili interdum tantum tres obtusiusculo
inter se quo tenent interdum abesse videtur in spicula infimo parva
spicula

Folia retrosum scabra

Domingensis \odot panicula ramis simplicibus spiculis subsessilibus sex-floris,
floribus omnibus anfractis Jacq. misc. 2. 4 p 363.

Habitat.

Sanctae C. regiae In obs. poz

ternatus. C. speculi ternatus quaternove patentissimi Canicolati muti
in affloni Forst
Habitat

michi haud nota

egyptius & specis dentatis quaternis obtusi patentis, pennis mucronatis,
caule repente foliis oppositis lin. l. v. p. 1174

gramen dactylon aegyptiacum Baud. pin. 7. theatr. 110. Monf.
herb. 3. p. 104. f. 3. 3. fig. 7. Scheuchz. gram. 109.

gramen iphomium malabaricum speciosum, longioribus mucrona-
tis foliis Planch. alm. 175. 18300. fig. 8.

Habitat in Africa, Asia americana.

Culmi repens ^{remotus} foliis vaginis textis. Solia ad gemmula radiantia oppos.
religua altera plana glauca - vincta vaginis 4-5 plo ^{basi ciliat} longiora
vagina compressa spica linearis ut pollicaris ~~voluta~~
^{tristis} ~~callosa~~ oblonga vincta aristata arista basi curvata corollas
ovato mucronata canna vincta.

Varietas ex americana specis geminis brevioribus foliis villosis

americana forte Eklundis specis Richard

uniflorus Q. pinnis digitatis quaternis, utulo secundis, calycibus acutis albis
nis simplicibus unifloris, culmo repeti. Lam. Wall. p. 82. Fl. Car. p. 82.
Habitatio Carolina

non vidi.

emiformis P. panicula secundaria lineari, calycibus bifloris

Gramen patens, Coccus in emiformibus Barr. rar. ii. 115 R. 2.

Stachyliis spicis numerosis alternis culmo adpressis longitudine inter
nodorum, calycibus bifloris Royen huydb. 57 Gmel. flor. 1. p. 130

t. 29.

emiformis Cynofus spica composita, spiculis fractis, fructiferis erectis,
calycibus uni-biflorisque: glumis obtusis navicularibus: Corona
obtusis, corollis acuminatis Hort. kew. 1. p. 105

Habitat in Europa australi, Siberia, ^{ad} fretum Hudsonis O

Culmi et glabris folia plana spica aeterna secundaria
naviculari glumis mucronata

Cynofunus

4-5
1848

retro flexus

Cynofunus ^{longis} spica composita, spiculis aggregatis, calycibus subula
vis bi floris, filipuli mutis.

Habitat in India orientali De la Mark.

Culmi teretes, glabri.

folia subulata, spithamea, glabra. Ligula membranacea.

Spica composita, spithamea, erecta. Rachis communis fulcatus,
angulatus. Spicula tertia ad singulum dentem rachidis,
laterales sespiles, intermedii breve pedicellato, lineares, polli
cares, interstitiis parum longiores, patentes, rarius spicula
quarta parum supra reliquos sespilis

Flores ab altero latere rachidis, compressi, glabri. Rachis par
tialis flexuosus.

Calycis valvula lanceolata, valde attenuata in setam, hinc
quasi aristata.

Corolla geminis, mutis, altero pedicellato

Clasific. pedunculata spicis lineari-subpedunculatis alternis in racemum
erectis, spiculis trifloris calyce mucronato brevioribus La Mark. Enc.
pag. 203

aureus L. panicula pediculis sterilibus pendulis ternatis, floribus anispa
tis Spreng. p. 107

Gramen panicula pendula aurea Bauh. pin. 3. Theatr. 33. Schemk
gram. 149

Gramen siculum salopisimum minus, heteromalla panicula
Barr. c. 4.

Gramen barcinense, panicula densa aurea Tournef. 4. p.
4. 523. Shaw agri. 232. p. 232.

Habitat in Europa australi, Barbani inter saxa et ri

pes O.

Culmi plures ascendentes simplices, spithamei. Ea vaginati
Folia plana graminea paniculata terminali contracta secundum
pedicellis subitanti. vel si vultu brevitate unilata

secundo

Danis ① Speculi secundis alternis festibus rigidis obtusi adpressi hinc
rei: pl. p. 1677. t. V. p. 117. Lin. Sp. 1054

Gramen pratense polypodii, panicula crassiore Barr. ii 50

Habitat in Europa australi

Simplex

Culmi plures saepe ut digitale ^{va} ganati: folia vaginis longiora vel
mo saepe altiora plana globosa - Spica pollicari rigida major
Et latior quam in Linn.iculo unguiculari. 27-flora gluma

Floruli breviori uti valvula corollina connata nervo obtusa. floruli distan
altero parum
longior.

Lema Q. Specia secunda, calycis gluma inferiori speculis subjeta Loepl.

d. 41. Spec. pl. pag. 105.

Habitat in Hispania Q

Culmi plures erecti simpliciflori digitales vel parum ultra filiformes
glabri binodes. folia pollicaria 1. 2 in culmo angustissima Specia
semipollicaria ^{longitudo de pediculis} ~~ca~~ ^{ca} ~~fructa~~ altero latere speculis umbriata. valvula
6-7. ⁶⁻⁷ glabra carinata valvula subspica lineari angustior. flosculi

speculis secundis alternis sessilibus rigidis acutis adpressis

Carpodoides C. *sp. conici*: pedunculi solitarii villosi, utrimo foliolo

non vid.