

Cyrtandra

Boott. Charact. gen. p. 5

Cal. 5 ^{fidus} dentatus, subbilabiatus. Cor. 5 fidus, irregulari. Stam. 4. Duo
sterilia. Bacca bilocularis.

Cyrtandra.

40. Cal. 5- fidus, subbilabiatus. Cor. 5- fida, irregulari. Stam. 4. ⁵⁻³ 2- sterilia.
Bacca 2- locularis.

biflora, Cyrtandra pedunculis subramosis, foliis ellipticis subintegerrimis glabris.

Symb. bot. - 2. p. 1.

Cyrtandra biflora; involucri biflori Dorst. gen. p. 6

Besleria biflora; pedunculis bifloris, involucri caduco inflato, foliis
ovatis integerrimis Dorst. prodr. p. 42. n. 236

Habitat in insula Tahiti }

Rami glabri, superne tetragoni, apice pubescento ferrugineo to-
mentati. Folia tripolliciana, ^{opposita} glaberrima, utrinque acuta, versus
apicem obscure crenata. Pedunculi petiolo parum longiores, sub
triflori; lobus cellus intermedius interdum triflorus, laterales unisflori.

Involucrum triphyllum, inflatum: foliola lanceolata, integerrima,
perolla calyce duplo longior: tubo curvato

minima *Polemonis* foliis oblongis integris oppositis, floribus axillaribus oppositis.

Calycium 5 dentibus intus hispidis *Retz obs. 5. p. 104*

Habitatio *India orientali*

Panta pusilla *terrena* *fasci* *alpensi* *Alpin* *cladone* *alpensis* *Hydropus*
Altitudine *digit* *minimi* *ramosus* *geniculis* *inferioribus* *radicantibus*
foliis *oppositis* *sespiter* *internodiis* *breviora* *obtusis*. *flores* *axillares* *solita*
ni. *calycis* *apice* *pediculi*

foliis *lineari* *oblongis* *integerrimis* *flores* *axillaribus* *sespiter*
solitarius

ut hujus generis

Cymosa 2. Cyrtandra pedunculis subcymosis, ^{elliptico-}foliis ovatis crenatis basi obli-
quis subtus pubescentibus Symb. bot. 2. p. 2.

Cyrtandra cymosa, pedunculis nudis Const. gen. p. 6.

Besleria cymosa, pedunculis cymosis, pedicellis bracteolatis, foliis
ovatis crenatis Const. prod. 44. n. 237.

Habitat in insula Tanna f.

ut in antecedente
apice pubescente
ferrugineo-tomentosi.

^{versus apicem, opposita}
Rami crassitie penna cygneae, folia saepe epithamiae, altero
latere ~~angustiora~~ et basi breviora, subaeuminata, denta-
to-crenata, ^{sub}glabra. Pedunculi sesqui pollicares, pubescentes,
multiflori; pedicelli simplices vel ramosi, unguiculares, pube-
scentes.

~~Conr. spec. Ramis apice pubescenti, ferrugineo-tomentosi; foliis
breviter petiolatis, oppositis, nervoso-venosis subtus pallidis
nibus; pedunculis axillaribus, calycis lacinis calycine lacinis
tatis.~~

~~globifera umbrosa~~

~~Habitat~~

~~Herb. Tusc.~~

~~Corolla 4 partita, irregulari: laciniâ infima major, duo laterales patentes, superiores
minores~~

Staminea 3. Cyrtandra pedunculata aggregata, foliis ellipticis denticulatis basi equalibus, genitalibus exsertis, caula radice ante.
Fusticia parasitica; cymis fasciculatis sessilibus, staminibus exsertis, lobis corollae brevissimis; foliis oblongis acuminatis lamantibus illud v. 1. p. 42.
Habitat in Java. Commerçon, Thouin.

Cauli lignosus, radiceo, teres, cortice cinereo succedente. Folia petiolata, spithamoa, ^{et tertia} elliptica, remote denticulata, attenuata, ^{attinge basi aequalia,} ~~acuta,~~ margine pilosa, ceterum ^{supra} glabra, obolata nervosa, axillaria, oculo armato punctata, Petioli

H Nervi subtus villosi
vi.
longitudine fere foliorum, hirti. Pedunculi axillares, aggregati, unijlori, vix semi pollicares, hirti. Calyx quinque partitus: laciniis Bracteis linearilanceolatis, pedicello longioribus, ^{aequalibus,} coloratis extus pilosiscula. Calyx quinque partitus, laciniis coloratis: laciniis longitudine pedunculi, linearilanceolatis, extus pilosiscula. Corolla sesqui pollicaris, ringens: labium superius bifidum, inferius trifidum; laciniis oblongo, obtusa: tubus intus basi maculis quinque pilosis. Nectarium margo germinans. Stamina duo, parum infra medium tubi inserta, filiformia, tubi corollae duplo longiora. Stylus longitudine staminum aequus quadruplo crassior. Stigma bilobum mellatum: lamellis oblongis, obtusis, patentissimis. Bracteam non vidi.

An planta paludosa? an caulis potius radix? Cum *Cyrtandra petitioides*
venit et habitus pistilli, et filamenta tantum duo nec quatuor, ~~Cortex quoque~~
habitu differre videtur

Quamvis staminum filamenta duo sterilia indagare potui, ^{non} forte in floribus
et siccatis, huius tamen retuli propter habitum similem prosetum cum *Cyrt.*
cymosa, Cortex enim eisdem indolis est ac in illa, calyx similis.

Filamenta sterilia non spiralia forte etate rectiora, nec sterilia observare potui
in floribus et siccatis, at tamen huius tamen generis esse erada cum calyce, corolla
nectarium et pistillum omnino ut in reliquis, praeterea cortex et folia omnino
ut in *Cyrt. cymosa* modo quod ultima basi non obliqua sunt.

Habitus. Folia petiolata, nervoso-subvenosa, subtus pallidiora, Pedunculi axillares