

Cytisus

1. Labronum C. racemis multifloris pendulis, folioli ovato-oblongis
2. nigricans C. racemis multifloris terminalibus erectis, folioli obovatis
3. foliosus C. racemis terminalibus erectis, calycibus villosis: laciniis foliatis, folioli obovato-oblongis
4. sessilifolius C. racemis erectis paucifloris, calycibus bractea triplici, foliis floralibus sessilibus
5. wolganicus C. canis, racemis ~~erectis~~ erectis, floribus secundis, foliis pennatis: folioli subrotundis, stipulis subulatis
6. Cajan C. racemis axillaribus terminalibusque, folioli sublanceolatis tomentosis: intermediis longius pedicelato.
7. argenteus C. floribus subbinatis subsessilibus, foliis tomentosis, caulibus decumbentibus, stipulis minutis
8. caputatus C. floribus umbellatis terminalibus, ramis erectis, folioli ovatis
9. austriacus C. floribus umbellatis terminalibus, caulibus erectis, folioli lanceolatis
10. prolifer C. umbellis axillaribus sessilibus proliferis, folioli lanceolatis glandosis, bracteis filiformibus
11. hirsutus C. nodunculis simplicibus lateralibus, calycibus hirsutis trifidis obtusis, ventricoso-oblongis

12. *supinus* C. floribus pedunculatis subbinatis, foliis villosis, caulibus decumbentibus frutescentibus.
13. *biflorus* C. pedunculis subbinatis lateralibus, calycibus oblongis villosis bilabatis: labio superiore bifido, foliis oblongo-ellipticis
14. *glaber* C. floribus solitariis lateralibus subsessilibus pendulis,
15. *purpureus* C. floribus pedunculatis subsolitariis, foliis glabris, caulibus decumbentibus frutescentibus, leguminibus superne falcatis
16. *groenii* C. foliis simplicibus lanceolato-linearibus, ramis angulatis

*Cytisus ponticus humifusus flore e lacteo purpureo-centa Vahl herb an
geneta*

grandiflorus Cytisus hirsutus, umbellis terminalibus; folioli linear-lanceolatis, ramis angula-
tis

Cytisus ~~orientalis~~ hirsutus, folio longo acuto, floribus luteis umbellatis amplissimis, sili-
qua glabra

confer Plukh. 31. fig. 3

Habitat in Oriente herb. ~~Scop~~ Vall.

ramuli floriferi ad basin umbella⁴

4 fructifera semipollicaria, utrinque acuta. Flores magni, plures; in umbella sessili:
plures; erecti Petala glabra. Legumen compressum, oblongum, glabrum, semipollicare
affinis Cyt. prolesero

^{grandiflorus}
Cynifolus *Cytisus* *hispidus*, folioli lineares; umbello terminalibus; ramis angulatis

Habitat in oriente Herb. Guss. 5

Paucis pedalis, ramosus. Rami sparsi uti folia et calyces hispidi, sulcato angulati, erecti, simpliciter. Folia breviter petiolata, ternata: foliola lineari lanceolata, angusta, utrinque acuta, subsessilia, & amipollicana. Flores magni terminali, cincti s. breviter pedunculati; bracteae lineares, unguiculatae ad basin calycis. Calyx bitubatus laciniis subaequalibus linearibus. Legumen vix pollicare, glabrum, 4 spermum
an *Appalathus* orientalis?

an

medicagineus ^{foliis nicholatis} foliolis obovatis subtus villosis, racemi terminalibus, ramis
angulatis
Cytisus orientalis medica foliis inanis et villosis, flore flavescente
Tand. ov. 44

Habitat in Oriente herb. Guss.

Rami bulcato-angulati et lineis a petioli basi decurrente, remoti,
tuberculato-cicatricati, inferne glabri, superne villosi subtomentosi.
Folia ternata: foliola parva, facie genista cananensis, & esbilica,
interdum emarginata, supra glabra. Flores ad apices ramorum 5: 6
in racemo, foliis genistae. Calyx villosus tomentosus.

microphyllus Cytisus

Cytisus orientalis minimus humifusus Tourm. Cor.

Habitat in oriente. Herb. juv.

Fruticulus ramis vane tortis validis rigidis uno alterove ex senescentibus
spinescente, glabri, juniores incani. Folia minuta incano tomentosa
ternata, oblonga, utrinque acuta. Flores non ad erant.

Cyrtus

Cyrtus orientalis, minimus humifusus Tournef. Cor. pag. 44

Habitat ad Pontum Euxinum herb. Tournef.

Caulis plures pedales, tenues, caesi, glabri. Rami villosi, ut in foliolo subter-

et altera videtur diversa

Cyrtus?

Cyrtus orientalis, *humifusus*; facie *Trifolii pratensis* Tournef. Cor pag. 104

Habitat in Galatia herb. Tournef. 3

Caules plures, simpliciter, vel ramosi, diffusus, palmatis. Siliola oblonga. Stora
terminales 2-3. Legumina villosa. Sarcis *Cyrtus argenteus*.

Cytisus

Cytisus orientalis, medio folio incanis et villosi, flora favescente Tournef. Cor
pag 44.

Habitat ad pondum Luxanum herb. Tournef
an a genista caducante

an eadem cum genista caducante

an eadem cum Cytiso Lusitano speciosus circa Monopelium in
Rami sulcati. Folia villosa, Flores 3-4. Terminalis, umbellati
habes.

Cytisus

Cytisus orientalis, humifusus, flore magno ex luteo purpurascente Tournef. Cor.
paez. 44.

Habitat ad Pontum Euxinum Herb. Tournef.

Eruticulus ramifus, decumbens: rami villosi. Foliola obovata, supra glabra, subtus villosa. Flores axillares 2-3 brevissime pedicellati.

Cotorder Cytisus

~~fulvatus~~. Herb. ~~Ternat~~ ~~Just.~~

Cytisus orientalis humifusus, facie Trifolii pratensis Tourm. Cor.

Caulis decumbens, pedales, villosi, teretes. Folia ternata, petiolata
Foliola obovata, semipollicaria, margine et costa subtus pilosa. Stipula
la lanceolata, acuta. Calyx bilabiatus. Flores in apice 6-7. Brac-
tea parva, lanceolata. Calyx bilabiatus: labiis aequalibus. Labi-
um superius bipartitum: laciniis lanceolatis, margine hirsutis pilo-
sis; inferius trifidum: laciniis lateralibus lanceolatis, intermedio
pubulato.

Taxus Cytisi argentei.

Senecio Cytisus

Habitat in interior parte agrorum Vaillant herb. La Mart.

Rami teretes, uti reliquis partes tomentosae-argenteae: ramuli ex eodem tuberculo ac petioli. Folia petiolata, plura ex eodem tuberculo puncto, ternata:

foliola semipollicaria, sessilia, linearia, basi attenuata, acuta, obtusa.

Petioli pollicares tuberculo infidenter. Racemi ex apice, cernitae 7 flori.

Calyx senecioideus, nec glaber ut in *Cyt. capensis*. Corolla flava, glabra, frugantissima.

Cyrtifus

an Cyrtifus Luftanicus ad radices montis Armenici nascens Tournef. herb

Habitat in Luftania herb Tournef.

Ellia ternata, Flores in racemo elongato.

habe

Spinescens Cybipus

Habitat in Cap. b. spec. herb. Royenii 5

Totus glaber. Ramis teretes, laevibus, flexuosis: ramuli alterni, distantes, patentis formae, nigri, 2-3 pollicares, nitidi, spinescentes foliis florisque. Eodem petiolato, distantho, foliola ternata, petiolata, obovata, longiora, avenia, unguiculata. Flores in medio ramulorum indipientes, racemosi, frequentes, penduli, flavi, parvi. Calyx oblique truncatus, dentibus sive setaceis

2
Verticillatus Cytisus

Habitat in Persia herb. de Lesp. 3
Tertium ramosus. Ramis flexuosis, incanis, teretibus. Folia sessilibus, 6-7. puberulis
tricellata, incana, pinnis, linearibus cuneatis, vix semipollinari. Stipulae
nullae. Flores axillares, sessiles, gemini. Calyx herpeticus, tubulosus, semipolli-
cari, quinquefidus. Lacinae lunicolatae. Corolla flava
an lobis?

Venuifolius Cytisus.

Habitat in Cap. b. p. herb. Royen. 5

Stem ex glaber, erectus, ramosus. Stipulae petiolatae, ternatae. Foliole pinnipollicinae, bipinnatae, lineariae, acutae, glabrae, apice pedicula. Racemi terminales multiflori. Flores parvi, nutantes. Calyx campanulatus, obliquus, quinque-dentatus. 8 lobes lutei.

microphyllus Cytisus

Habitat in Cap. b. pui herb. Proyni 7

Stem rigidus, serotinus, glaber, cortice serotino. Rami fraxi, subpubescentes, angulati.
Folia tuberculo parvo insidentia, breviter petiolata, ternata. Foliola minutus,
lineari-cuneata, basi acuta, glaucescentia. Flores in apice ramorum, racemosi
penduli, parvi. Calyx dentibus quinque, ovatis, alutis. Legumen breve, pedi-
cellatum, glabrum.

habes

unguiculatus Cytisus

Habitat in Cap. b. p. herb. Royani 3

Erigitur laxis virgatus. Rami superiores canescentes, elongati, glabri. Folia petiolata
4a, obcordata, lamina unguiculata, glabra. Racemi terminalis, laxis. Flores
nudantes. Linguae petalorum calyce triplo longiores, filiformes. Vexillum
spatulatum.

habes

Populatus Cytisus

Habitat in Cap. b. p. herb. Royenii 7

Truncus pedalis, parum ramosus: rami villosi, subanascantur. Folia petiolata, ternata
4: foliolo, unguiculata, lateralibus parum minoribus, sessilibus, cuneato, emarginato
cum mucrone, glabra, glauco viridia. Stipula semiovata, acuta. Racemi termi-
nales, sesquipedales. Flores erecti, imbricati. Bractea 2 ad basin calycis, lineares
& unicum ovatum longitudine calycis ad basin pedicelli. Calyx glutinosus

compar. cum Florul. herb. nost.

monosperma Cylifer

Wiborgia Thunbergii

Habitat in Cap. b. spec. herb. Royenii 4

habes

humilis Cytisus

Habitat in Cap. b. spaci herb. Royeni 5

Tenax ut semipedalis. Rami teretes, subserici. Flores petiolata, ternati: foliola unguiculata, subquadrata, linearia, acuta, villosa-subsericea. Stipulae, quantum videtur, nullae. Racemus terminalis, bipollicaris. Flores nutantes, distantes, Cytis. nigricanti. Calyx campanulatus, villosus, subinereus. Dentes subulati, infima reliquis angustioribus. Bractea lineari, pedicello brevior, ad apicem basi.

Monospermus Cylindrus

Habitat in Cap. 6 p. Herb. Brymanni Leyduni. bot

Ramiffructescentes

6 *wolgandus* Canus, racemis simplicibus erectis, floribus secundis, foliis pennatis;
folioli subrotundis stipulis subulatis An-Suppl. p. 327. L.V. pag 666.
Cytisus nigricans Pall. d. 3. p. 754. T. G. g. fig. 3.

Cytisus sp. in natura fl. 105. p. 105.

Habitat in collibus siccis & solo arido circa Wolgam in desertis &
frutem pulcherrimum. foliola 6-7 juga cum impari, fere orbiculata,
argentea. flores intensius flavi

vellosus, canescens. folia pennata cum impari 19 juga - foliola ob-
longa, supra venosa, pinnam minus villosa quam subtus, unguiculata.
Stipulae ferrugineae lanceolatae, attenuatae, semipollicares. Pedunculi
villosi et pilis glandulosis, stellatis, longitudinae folii. Flores supra
in pedunculo, circiter 7. Distantes herb. Desfont

in herb. Rus. in folio sub nomine *Genista wolganica* occurrat racemus
elongatus

non videtur

17 græcu P foliis simplicibus lanceolato-linearibus, ramis angulatis Lin. S. V
Barbajovis, lanana folio, flore luteo parvo Tournef. Cor. 44?
Habitat in Antipelagi insulis?

Dubito valde num in rarum natura existat. in herb. Tournef. et Vaill.
talis non in semi et Lyon. Tournef. ad Anth. hermanni postulat

124 biflorus \varnothing pedunculis subbinatis lateralibus; calycibus oblongis vel longis bilabiatis: labio superiore bifido, foliis oblongo-ellipticis Hort. kew. 3.

n. 52.

Cytisus biflorus

L'Herit. sup. n. t. 92.

Habitat:

et anse in attulit

in quendis

Cortice cinereo-purpurascens petiolus et folia latiora breviora latiora quam in *supino*. Flores copiosissimi Calyx simili si modo mea eadem cum Hort. kew.

petiolus latior quam in *supino* et glabro foliola obtusiuscula versus angustiora. flores 2-3. calycis praece flarescentes labrum superius interdum bifidum et inferius integrum interdum vice versa

nota melior probet petiolus

13 Lupinus Q. floribus pedunculatis subbinatis, foliis villosi, caulis decumben-
tibus pubescentibus. Len. S.V. ^{Galop. fl. austr. p. 1. 4. 20}

Cytisus lupinus, foliis incana lanugine inferne pubescentibus. Bauh
pin 396.

Cytisus VIII. Pluf. her. 1. p. 97.

Cytisus lupinus B. Len. Spec. pl. p. 1042

Habitat in Austria

Rami teretes cinerei. ^{et nudi minutis adpressis longi decumbentes} folia petiolata, foliola angusta oblonga
basi acuta angustata, apice obtusa, mucronata ^{supra glabra} subtus sub
cinerea. ^{et quatuor} Calycis gemini breviter pedicellati tubulosi, flavescentis

Petioluli supra
plani subtus
convexi

et nudi adpressi subsericeis ^{me} labio superiore perfido ^{teries} integro. ^{gynatum} vexillum emar-
varietatem (Gent.) mi. J. Don. meyer floribus pendulis
corina vespi carvatum lupinum durs

quomodo haec lupin. biflori et glaber inter se differunt et differentia haec
haud patet

48
L. argenteus C floribus subbinatis subsessilibus, foliis tomentosis, caulebus decum-
bentibus, stipulis minutis Lin. S. V. p. 667. Spic. pl. p. 1043. 4

Lotus asperior fruticosa narbonensis incana Lobel. ic. 2. p. 41.

Lotus fruticosus incanus filiquosus Bauh. pin. 332.

Trifolium argenteum, floribus luteis Bauh. hist. 2. p. 389.

Habitat in G. Narbonensi.

Planta palmaris, basi ramosa: rami simplices infera fruticantes, superiora herba
eius villis eulis adpressis subsensicis apice floriferis. folia petiolata, folioli
oblongis ~~nunc vix~~ interdum angustioribus, micronatis, supra glabra, margine
et subtus e pilis adpressis subsensicis, aequalia. ^{petiolo breviter} Stipula lanceolata brevis.
Petalum folioli duplo longior, floris terminales 2-4. breviter pedicellat.
bractea parva lanceolata ad basin calycis. Labii infera profunde fessis
labium inferius angustius lanceolatum laciniis tribus pinnatis, inferius
profunde fessum laciniis duabus lanceolatis latioribus attenuatis
sexillum extus pilis adpressis. Legumina hirsuta
Flores laterales meminit Ceanothus quos tamen nunquam vidi

an melius sequenti modo distinguitur

Q — floribus subbinatis terminalibus subsessilibus, foliis oblongis subtus
subsensicis, caulebus decumbentibus

¹⁰
Austriacus C. floribus umbellatis, pediculis erectis, caulibus erectis, foliis lanceo-
latis. her. S. V. p. Jacq. austr. tab. 21.

Cyrtisus v. Clus. hist. 1. p. 195.

Cyrtisus nicotianus, folio oblongo austriacus Bauh. pin. 390.

Cyrtisus floribus capitatis, foliis ovato-oblongis, caule fruticoso
Müll. Diet. t. 17. fig. 2.

Habitat in Austria, Italia, Sibiria &

~~Austriacus~~ Ramis tenues canescentes foliola subtus villosa pubescentia
calycis villosi

descript. in Linn. bot. fl. Bot. habitus nota differentias tamen difficile invenire

9 capitatus C. floribus umbellatis terminalibus, ramis erectis, folioli ovatis
Foen. austr. v. 33. N. V. pag. 666x

~~Cytisus supinus. Syst. Veget. ed. 13. p. 595.~~

Cytisus v. ~~4~~ species altera Clus. bot. 1. p. 96.

Cytisus supinus, foliis infra et piliquis molli lanugine pube
terminalibus

Cytisus supinus floribus umbellatis ramis decumbentibus,
folioli ovatis len. spec. pl. pag. 1042.

Habitat in Italia, Galloprovincia, Sicilia, Siberia,

capitatus C. floribus capitatis, ramis erectis striatis verticibus villosis, folioli
ovato-ellipticis villosis, bractea lineari subcylindrica Hort.
Kew. 3. p. 51.

Differentiam inter hanc et ~~capitatum~~ hanc
sufficitur
Ripula nulla?
Synon. Clus. v. 1. hanc
culto

inter. Veg. Rami fusco purpurei, pilosi prope tim supeme. Folia petiolato
solleola ~~foliis~~, sic ~~bi~~ uncinata mucronata unguiculata
lateralia parum minoria subtus villosa mucronat. Capitula
terminalia ~~strigata~~ foliis pluribus, cum cunctis o flora. floribus
breve pedicellata. Calyx tubulosus hirsutus. Legumina sesquiped
liciana hirsuta hirsutis majori ab austr. dignoscitur

patens Q.

"
prolifer & umbellis axillaribus sessilibus proliferis, foliis ternatis petiolatis
folioli lanceolatis pinnatis bracteis filiformibus Lin. Suppl. p. 320. 4
Habitat in sylvis montosis Teneriffa

non vidi

5 Sespili foliis P. micemis erectis, ^{racemifloris} calycibus bractea triplici, foliis floralibus
sespilibus Lin. t. v. p. 666 x

Cytisus glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis Bauh. pin.
290

Cytisus glaber, siliqua lata Bauh. hist. t. p. 373.

+ Habitat in Italia, Galloprovincia &

+ Cytisus foliis soppinis sespilibus; calycibus squamula triplici aucta
Hort. Cliff 355 x

Rami filiformes, sparsi ^{in ramulis} florales glabri, uti omnia. Folia inferiora ^{in femina quicula} petiolata
na avenia ^{minorata} foliolois oblongis sespilibus: ^{in ramulis} superiora sespilia lateraria minora sub
cordata, terminalia majus ovatum. Flores 2-3 alterni in racemo.
Calyx campanulatus bractea tero ovata ad basim prope. Legu
mina nigricantia

culta

3 foliosus ⁶⁰ P. racemis Terminalibus erectis, calycibus villosis: Caernis
foliatis, folioli obovato-oblongis Hort. Kew. 3. p. 49.
Habitat in Canariis &

2 nigricans @ racemis ^{multifloris terminalibus ob} simplicibus erectis, folioli ovato-oblongi h. v.
mel. dict. t. 107 fig. 1.
Calqu. fl. austr. 4 & 307.

Cytisus W. Clus. hist. 1. p. 95

Cyt. pur glaber nigricans Brand. per. 390.

Habitatio Austria, Pannonia, Bohemia, & Italia &

Rami teretes villosi subsericeis. Folia omnia petiolata. foliola cuneata
vix mucronata intermedium fere unguiculare, supra glabra subtus
pelosi in sculo. stipulae vix ulla. petiolus longitudine foliorum. racemis
terminalis multiflorus apice nutans ante florescentiam. Pedicelli
parvi. Calycis ~~lobi~~ ^{denticuli minuti,} lobis campanulatis lobis divaricatis senescentibus bractea
lineari ad basin fraguli

Cytisus nigricans: racemis terminalibus erectis, calycibus pelosis: denticulis
minutis, folioli ellipticis subtus pelosis H. New. 3. p. 49

an mea foliosus H. New. mea exacte respond. ad fig. Clus.

lani folius. Proceris terminalibus erectis, calycibus leguminibusque
municatis, foliis lanceolatis pinnatis

Habitat in Hispania &

Ram. teretes villosi pinnatis tota planta. Folia pedicelata

frequentia, cum rudimentis ramulorum in omnibus axillis.

Petiolus unguicularis. Folia ternaria fissilia lanceolata inter
medium semipollicaria lateralibus parum minoribus, junioribus
involuta utroque acuta. Calycis villosi et tuberculati legu-
mina pollicaria disperma a ramentis rigidis ^{inqualibus} copiose
appressis

microphyllus C foliolis racemis terminalibus erectis calycibus pedunculisque

tomentosis folioli compta cuneatis complicatis

Cyprius alter Clus. hist. pag

Habitat in Hispania S

Rami teretes superne canescentes folia ternata brevissimi
reticulata parva ac complicata apice recurva acuta
sexillum extra vellosum
facies divaricata

16 purpureus C. floribus pedunculatis ^{sub} solitariis; foliis glabris; caulibus decumben-
tibus frutescentibus; leguminibus superne falcatis Jacq. fl. austr. 5.
t. 48. p. V. pag. 667.

Habitat.

Caulis plures bipedales, tenues, glaberrimi simpliciter. Folia copiosi plerumque
3 ex eadem gemma petiolata: foliola lanceolata, utrinque acuta, par-
va, aequalia persilia glaberrima. Petiolus longitudine foliolorum, planus
Stipula membranacea, parva, apice callo obtuso, erecta. Flores laterales
breviter pedunculati, solitarii vel quae interdum gemini. Bractea 2-3.
minutissima. 2-3. minutissimo membranacea. Calyx oblongus glaber, bilabi-
atus; margine villosus, labiis vid. exsertis. Corolla purpurea. Ungues petalorum
superne ciliatis. ~~Salam~~ Anthera 5 globosa, reliqua oblonga germin
glabrum

hab
onus { Pycnos perianthi flore purpurea Pat. Georg. Terra
Cystisus prostratus perianthi, rubello flore, caule rubro Moroccan mus
2. 31. tab. 19

Culta

12 hirsutus C. pedunculis simplicibus lateralibus; calycibus hirsutis trifidis ob
tusis ventricosis-oblongis. Hort. Ups. 2117

Cytisus Clus. hist. 1. p. 94.

Cytisus incanus si lingua longiore Bauh. pin. 390

Cytisus foliis subnuda lanugine hirsutis Bauh. pin. 390.

Et abitat in Hispania, Sibiria, Austria, Italia &

Rami tenelli, petioli, ^{calyces} folia pedunculi et legumina hirsuta. foliola
lanceolata elliptica a utraque acuta versus basin parum angustiora
Flores gemini terni solitarii. ^{valde}

virgatus

C. floribus geminis terminalibus pedunculatis, foliis oblongis
ramulis calycibusque hirsutis

Habitat ad in montibus Terni 5.

Socius C. hirsuti an modo sanctus rami parsi sequentes
ramulose foliis minoribus, utraqueque pilis longis adpressa prostratis
subtus obtusa mucronata basi ciliata. Calyx infidus

Spinesiens P. floribus subternis pedunculatis foliis subsplibus
cuneiformibus canescentibus ramis spinescentibus
Habitat in Barbana Schousboe 5

Facies omnis Spatii spinosi rami teretes ramuli
alterni patentis uti rami incani rigidi in spicam
dependenti. Petalo brevis ~~parvus~~ foliola terna & vellis
adpressis canescentia obtusa ~~crispifolia~~ avena erecta
vri ~~una~~ unguiculata vel parum minorum Pedun
culi axillaris 2. 3. 4. incani petalo parum ^{longiore}
Calyx incanus tubulosus bilabatus labio altero ^{superiore} int.
infero ^{infero} rotundato ^{superiore} bifido. laciniis subulatis

Dwaricatus C racemis terminalibus erectis calycibus legumini
busque ramentaceo viridis foliis oblongis H. Kew
3. p. 50
Cytisus minoribus floribus; ramulis tenellis x 11. L. Brauk
per. 390. tab. mus.

Spartium complicatum

Cytisus Dwaricatus L.

L. Herbaris Prop. nov. Tab. 91

L. monstrosi utilla folio repens

1 Laburnum Q. racemis ^{multifloris} simplicibus pendulis, foliolo ovato-oblongis Lin. l. v.
Gaegn. 4. v. 306.

Anagyris non foetida major alpina Bauh. pin. 391.

Anagyris non foetida minor Bauh. pin. 391.

Laburnum ad hoc trifolia anagyridi similis Bauh. hist. 2. p. 361.

Habitat in Helvetia, Sabaudia &

Rami veteres glabri juniores cinerascens. Solia petiolata. Soliola
sesquipollicaria acuta mucronata, lateralia minoru supra glabra
subtus pallida ora peli rarioribus adpress brevissime petiolata.
Petioli univesuli foliolo interdum longior. Stipula setacea subargue
culares. Racemi longi spithamei. Calyx campanulatus lobis
indivisi. bractea nulla. Legumina

a foliis subtus inanis leguminibus piceis

b. foliis leguminibus glabris

herb
maest.

3. *Alpinum*

Pyrenaeis alpinis latifolius flore racemoso pendulo Tournef. instr. h.

4. *Pyrenaeis alpinis* flore racemoso breviori Tournef. 4. v. h.

Sulsta

Soliosa minor, racemi breves tri-pollicares erectiusculi. Flores penduli