

Dactylis

Spigelia
Cynosuroides D. Spica terminalibus subgeminis, floribus remotis adpres-
sis, culmi foliisque striatis Hort. Kew. 1. p. 104
partum essexense, spica gemina Rai angl. 3. pag. 393.

Dactylis Cynosuroides Loefl. N. 1184

Habitat in Anglia Luptania &

Culmi erecti, solitarii pedales, superne foliosi inferne nudi, folia
orbata et quasi spongiosi a vaginis persistentibus imbricatis
frequenter et minute geniculati. Tota involuta, glabra
erecta supra tenuissime striata. Vaginae longe totum culmum
ubique vestientes glabrae. Ligula brevissima membranacea
Spica terne rarius 2-4. alternis terminalibus linearibus uniuersum
spicam mentientibus ^{unifloris} spiculis. Calycis glumae lineares acutae
complicatae carinatae altera paulo brevior multo angustior
Corol. glumae lanceolatae calycis paulo longioris et latioris
Loefl.

Cynosuroides D. specis prope secundis numerosi, floribus ante umbra
tis, culmo erecto

Dactylis specis alterni secundis incisi erecti approximatis, ca
lychibus in nullo subulatis Gron. Verz. 134

Dactylis specis prope secundis, scabris numerosi Lin Spec.
pl. pag. 104. S. C.

Habitat in America septentr. 2

Culmus bipedalis antrinacibus. Folia in culmo 6. lata
culmo longiora, compressa, margine scabra ^{crata} pagina
superiore glauciora vagina glabra ore barbata.
Specis prope 10 alterni pedunculato bipollicares et
ultra secundo. Pedunculus communis triquetris angulis
scabris. Speculo ^{compressa} approximato lanceolato secundo valvula
calycis ^{longitudina} attenuato ^{longiora} corollae alter angustior dorso scabra
alter latior dorso ^{longiora} ciliata floris glabri acuti valvula exterior
Dorso ciliata

Gramen huius simillimum ad officia floris legum prope monte
videtur in arenosis a do Commerçon lectum communicavit
D. Thouin, quod differre videtur specis ~~trichide~~ communis
ad prope; cuius canis valvularum calycis longioribus molles
ribus nec subpinnatis ut in Cynosuroides vix Gramen
differre credo cum in reliquis convenit.

unicam speciem
mentientes

vellosa Desb. panicula fricata, glumis vellosis Thunb. prodr. p. 22.
Habitat in Cap. b. pei

non vidi

ferrata Dactyle panicula coarctata, glumis canna ferrulatis Thunb.

prodr. p. 22.

Habitat in Cap. b. p. ei

non vidi

Lappula Dactylis fructu lineantibus erectis Lappulati subdignitatis
nbus di fructu rachi adpressi La Mart. T. Enc. pag 100
Habita et in America calidior

Brevifolia *Dactylis* spica globosa secunda, involvis pilosis sculis
pedunculo pubescente, foliis involutis rigidis, culmo
decumbente ramoso. Willden. in ^{nov} act. Soc. amic. L. N.
vol. 2 p. 115.

Culmus pedalis bipedalisque decumbens ramis brevibus instructus
rami steriles uncialis vel sesquiunciales valde foliosi, fructi-
ficantes vero seminunciales.

Folia trilinearia lanceolata rigida sulcata subpubescentia
margine involuta et disticha.

Vagina longitudine foliorum ventricosa sulcata apice
brevisime ciliata.

Pedunculus teres pubescens.

Spica in ramis terminalis globosa secunda.

Calyx bivalvis subquadristriatus; glumis oblongis nervis
+ 50-striatis subpubescentibus mucronatis.

Corolla bivalvis gluma exterior oblonga acuta
convoluta nervoso sulcata pilis obsita; gluma
interior oblusa membranacea.

Dactyl. brevifolius Sp. pl. ed. W. 1. p. 410.

Spirata Dactyli panicula spicata cylindracea basi inserta
corollis apice aristatis. Willd. loc. c.

Gramen alopecuroides maderappalarum, spica quasi densi-
culata molli. Flux. phytog. t. 190. f. 8.

Et habit. Tangore.

Palmus semipedalis erectus basi ramosus. Solia linearia
graminea radicalia brevia, culmea spica longiora
spica in apice culmi et ramorum semipedalis, in ramis
brevior, cylindracea e spicis tri- vel quadrilincaribus dense
aggregatis, inferne remotioribus, composita. Spicula com-
posita multiflora corollis apice-aristatis.

retroflexa Dactylis

Habitat in collinis illiconibus. Mch. Herb. Mus.

Culmi erecti, glabri. Folia angusta, plana, glabra, margine remote dactylata
to oculo armata. Spica terminalis, spithamea, simplex. Spicularum glumina
subulata

geniculata Dactyli specis Terminalibus Ternis clavatis Willd. spec. pag 410
Dactylis geniculata culmo geniculato, specis diffinis Ternis
foliis linearibus plicatis mucronatis Burman. ind. 28. t. 12.
fig. 3.
Habitat in Java

non vidi

Hesperia D. ad. panicula fructuata ovata nuda, calyce hesperio, genuculis
barbati Thunb. prodr. pag. 409
Habitat in C. b. p. r.

non vidi.

nungens Dact

Scheber, Defont.

Dufrenoyi Dactylis

genuculatus D. culmo specio disticho Vernei, foliis linearibus plicatis.
mucronatis, Culmo genuculato Burm. ind. p. 20 tab. 12. fig. 3.
Habitat in India orient.
Culmi ramosi vaginati.

non vidi

Cynosuroides D. spicis parvis secundis numerosis, floribus ante imbricatis, culmo
erecto Hort. Kew. t. p. 103.

Gramen mantemen, spicis alternis secundis incisis erectis ap-
proximatis, calycibus unifloris subulatis Gron. Voy. 134

Dactylis Cynosuroides spicis parvis secundis numerosis den. spic. pl.
pag. 104*

Habitat in Virginia, Canada &

Ciliani D species capitata secunda, calycibus trifloris caule repente

Lin. Mand. 185. P.V. p. 116

Habitat ad Cap. b. frei

Caules filiformes articulati repenti radiculis longis. Culmi palmarum
ascendentes simplicissimi laevi articulis univ. folia radiata
involuta, filiformia longiora longitudine culmi. Chalium unicum
longe longitudine capituli vagina subventricosa. Capitulum termi-
nale ovatum sicum floribus pluribus sessilibus. Calyci gluma basal-
is triflora compressa mucronata, longitudine corollae dorso sub apice
pilis sparsi. Corolla gluma exterior ovata, striata, inferne barbata
pilis albi lin

haud mihi nota

Cepitosa Dactyli panicula ovata coarctata, spiculis ² in ¹indique imbricata Torr: in Com.

Gott. 1789. p. 22. *

Habitat ad fretum magell. 7

Culmi compressi spiculi laxes erecti bipedales, foliis vaginatis. Folia linearibus
lanceolata, canaliculata, serrata, loricata erecta longitudine culmi. Ligula mem-
branacea lacero-dentata, semipollicaris. Panicula tripollicaris. Paleae
glumae subulatae subaeuales multae, interdum biflorae cum rudimento
frequentius 3. 4 flora. Corolla valvula altera minori emarginata, altera
majori setula terminata

patens D. fructu parvis secundis paucis, floribus ante imbricatis, caule decum-
bente, foliis patentissimis Hort. Kew. 1. p. 104.
Habitat in America septentrionali &

non vid.

glomerata ^B panicula secunda glomerata L. Schreb. gram. 60. T. 10
fig. 1. fl. Dan. t. 743

Gramen spicatum, folio appere Mauh. prodr. 9. pin. 3. Monphod.
3. J. D. T. 6. fig. 30. Schenck. gram. 299.

Habitat in Europa cultis ruderali &

Culmus sesquipedalis et ultra raris glaber. Folia angusta
glabra. Ligula membranacea lanceolata. panicula
n. f. tripollicari pedicelli brevissimi fune spicula villosi
scila ^{et minus spicula} calycis in dorso et ex margine subtrileata
flospuli 3. Antheris ciliatis acuminatis

capitata 2 speciei capitatis locubus, culmo prostrato ramoso Lin suppl.

p. 116. + L. p. 116

Habitat in Cap. 6 speciei 7

Culmi crassitie penno gallinacea, sesqui pedalis locis. Panicula
specie formis, quasi conglomerata superne angustior, palmarum
paleacei coloris. Folia graminea locis in culmo tria
floris ubique gemini depressi. Calyx bivalvis, subquaque floris
longitudine fere floris. Valvula externa multum attenuata
Colla oblonga mutica Lin.

non vid.

calycibus fere nullis. vel lobis glumis obtusis
Canescens ^{foliis ovatis} ^{calycibus} ^{lobis} ^{glumis} ^{obtusis}
speciebus suis subtundis ^{lobis} ^{glumis} ^{obtusis}
Habitat ad littora maris in locis humidis hinc

Tota planta caudice procumbenti stoloniferi teretes fidiiformes glabri
conescenti glabrescenti articulis bipollicentibus ad quinculos ramorum ramis
speciebus exceptis pollicentibus vaginis foliorum tereti folia primum corda
plicata deinde plana ovata acuta vaginis longitudine
vaginae cum vaginae femurque longa uti vaginae oculo
armato vallo ² serrato. Capitula ³ magnitudine pappi floris
sepals obtusi ² adpressi. Oculi ³ armato valvula serrato
nuncti que multi peliferi, mucronato.