

Dahlbergia

1. *lanicolana* D. foliis pennatis: foliolis ovalibus subtus caniscentibus, fructibus lanceo-
latis
2. *montana* D. foliis ternatis: folioli glabri ovati, fructibus ovalibus aerenis

Dahlbergia

Dahlbergia macrophylla, foliis pinatis: foliis trijugis ellipticis, racemis axilla-
ritur simplicibus.

Habitat in America meridionali non Rorh

Rami teretes, glabri, crassitie fere penna cyneo.

Folia petiolata, alterna, pedalia, pinnata cum impari: foliola
trijuga, opposita, acuminata ^{acumine obtuso}, glabra, subtus glauca
scentia oculo armata vix villosa, venosa; interiora ovato oblonga
tri vel quadri pollicaria; intermedia elliptica sex pollicaria,
terminale octopollicare, basi parum attenuatum.

Petioles teretes, partialiter vix unguiculares.

Racemi axillares, folio quintuplo breviores.

Calyx parvus, campanulatus.

Legumina lanceolata, utriusque acuta, sesquipollicaria, gla-
bra, plerumque monosperma, rarissime dispersa.

~~flowers equidem non vidi, cum vero fructus quam maxime convenit
cum Dahlbergia lanceolata differt foliis multo magis multo
non sunt pinnatis compositis non dubito quin eundem generi
sit. Dahlbergia lanceolata foliis paucioribus, multo
tius majoribus, racem.~~

++

Grandiflora Triumfetta foliis ovatis subcordato-ovatis integris serratis pilosis ⁱⁿ petioli
floralibus lanceolatis, rami hirti, floribus compactis

Habitat in Montserrat in Pyren.

Caulis lignosus teres, rami inferne glabri superne hirti, apice bifidi.

Folia petiolata, alterna, bi. s. tri. pollicaria basi finis parvo ad petiolum
floralis lanceolata; omnia parum attenuata, trinervia ⁱⁿ petiolo
pilis rari confusculatis vel simplicibus adpressis, subtus minus pilosa,
serrata: serraturis alternis majoribus obtusis, in finibus quatuor
glandula orbiculata, cava terminatis

Petiolum bi. pollicaris, odore foliorum crassior, superius e pilis bellatis
cinereis. Stipula lanceolata, acuminata ^{inferioris}

Pedunculi axillares ~~et~~ terminalis axillares vel
oppositi folii multiflori, ^{terminalibus umbellatis} terminalis racema pedunculis parvis
racemosis: pedicellis umbellatis, bi. s. triflori uti pedunculi com-

munis hirti tomentosi. Bractea lanceolata. Corolla duplo vel

triplo major quam in compensibus.
Calyx glaber: lobula lanceolata, acuminata

Stigma oblongo unguiculato calycis parum brevior

Stylus flore longior

2
monetaria

Dahlbergia

1
Dahlbergia foliis ternatis pinnatisque: foliolis ovatis acuminatis gla-
bris, fructibus ovalibus

Dahlbergia monetaria: foliis ternatis: foliolis glabris ovatis, fructibus
ovalibus avenus L. S. V

Habitat in Guayana incolis la liane banque & von Rohr

Rami teretes, flexuosi, cortice fusco, glabri: ramuli patentissimi.

Folia petiolata, alterna, pinnata pinnata, plerumque bipinna, foliolum
unicum terminale, interdum quinato-pinnata: Foliola petiolata, alterna
per paria approximata, tri-pellicana, interiora minora, ovata vel
ovata ovato-oblonga, acuminata, acumine obtusiusculo cum mucrona,
integerrima, utrinque glabra, venis sine venosa, supra nitida subtus
costa purpurasciente

* Filamenta et
reliqua et in
Linno

Petoli pedicelli semiunguiculares.

Pediculi axillares, plerumque quatuor, unguiculati; pedicelli vix
mossi

Calyx parvus, campanulatus, obsolete sive dentatus.

Petala unguiculata: unguis calycis longiores. Vexillum obovatum
lateribus reflexis. Ala oblonga: Carina basi bifida, uti ala
longitudine vexilli

++
Filamentum laterale ad flagellum latus peristylis quadrifidum, festuca
sub gemine indivisum.

99 101

no 149 & von Rohr

lineata Dahlbergia? folio lanceolato-linearibus subtus imbricatis

Habitat in St. Domingo herb. Gusf.

Arbor. Ramis teretibus, difforis. Folia 4-juga: foliola petiolata, pollicaria,
supra glabra, oblique lineata, subtus venosa, angusta. Racemi axillares,
multiflori. Legumina linearia, compressa, bivalvia vix apertur
freci: Dahlbergia.

flexuosa Dahlbergia foliis pennatis; foliolis ovatis attenuatis, obtusis, leguminibus
racemosis oblongis.

Habitat in India occidentali ex herbario Fusconi;

Rami flexuosi, glabri, cortice purpureo punctato. Edia pennata cum
pauca, quadrijuga. Foliola opposita, 2-3 pollicaria, glabra, venosa, atte-
nuata, obtusa. Pedunculul longitudine folii, Flores racemosi, distantes.
Legumina basi acuminata in petiolum compressum, tripollicaria, pol-
licem lata.

Lanicolana. 2. foliis pinnatis, pinnis oblongis obovatis que fructibus
lanicolatis
Arabicis mediarum potana buxifolia, siliquis compressis Pet. n. 932

Sabbergia lanceolata. foliis pinnatis subtus pilosis
pinnis ellipticis fructibus lanceolatis in suppl. pag
pag. 316.

Habitat in India orientali &
Pami. seseter superne canescentia. Fo. lola semipolliciana
venosa petiolata alterna c. 11. Legumina pedicella
ta bi f. 3 polliciana utraque attenuata interdum
appena glabra

macrophylla D

in Robinia solanaceae. Fructu. fructus 1-4 spermas

inter Robnan

~~Corymbosa Tumana foliis pennatis, foliolis flabelliformibus lobatis inaequalibus
nibus pinnato-corymbosis, filiculis tuberculosis monopharmis, pedicellis
D e Desfont in Act. Soc. par. 1. pag. 26. Tab. 6.
At abbat in superis ripium montis Atlas 2,
Covilla per. Tum. officinales~~

Tumana africana La Mark

2 monetana D. foliis ternatis: foliolo glabris ovatis, fructibus ovalibus
arsenicis L. Suppl. p. 317. t. V. p. 641.

Habitat Sannami in Coriumentibus 5

4 5

Frutex. foliola petiolata, ^{retusa} integerrima, venosa alterna. Pedun-
culi axillares, plures ^{sup. emphy.} fructi, secundis; inferne e capsulis foliorum
dentati. Flores minutissimi albi. Fructus ligula ovalis,
severa nummi, magnitudine extremi pollicis compressa
interne cartilaginea, uniloculari non dehiscens. her.

~~in h. ignota~~

reliqua vide inter americanam