

Dalechampia

1. scandens D. foliis <sup>trifidis</sup> ~~tri~~ <sup>oblongis</sup> ~~oblongis~~ laciniis <sup>oblongis</sup> ~~oblongis~~ denticulatis acutis involucri <sup>cordatis</sup> ~~oblongis~~  
2. canescens D. foliis <sup>trifidis</sup> ~~tri~~ <sup>oblongis</sup> ~~oblongis~~ lobis <sup>oblongis</sup> ~~oblongis~~ subdenticulatis lobis <sup>oblongis</sup> ~~oblongis~~ obtusis, involucri <sup>oblongis</sup> ~~oblongis~~ coloratis  
3. colorata D. foliis <sup>trifidis</sup> ~~tri~~ <sup>oblongis</sup> ~~oblongis~~ lobis <sup>oblongis</sup> ~~oblongis~~ subdenticulatis lobis <sup>oblongis</sup> ~~oblongis~~ obtusis

*Scandens* 8 foliis trifidis serratis Lin. Suppl. p. 421. Mart. 496. L. V. pag

062. Jacq. Amer. Tab. 160

*Dalechampia scandens* lupuli foliis, fructu hispido Nicot. Plum

gen. 17. *Lupulus* folio trifido, fructu tricocto hispido Plum Am. 89. Tab. 101.

*Convolvulus thymalis* Boerh. Lugdb. 2. p. 260+

Habita in America meridionali

brasiliensis Dalechampia foliis trifidis subtus tomentosi nudi, lobis serrulatis, basi  
† involucri coloratis trifidis

Dalech. brasiliensis La March

Habitat in Brasilia Ausf. herb.

Caulis striatus, subanescens teres. Folia bipollicaria, obscure serrata, sub-  
tus reticulata, supra glabriuscula: lobi acuti; laterales ovati, in terme-  
diis lanceolato-oblongis. Pedunculi breves. Bractea ad basin, et 4 sub involu-  
cro setaceo. Involucrum foliolo semipollicaria.

convolvuloides Dalechampia foliis cordato-ovatis subintegerrimis, bracteis cordatis  
indivisi

Daléchamp: convolvuloides Lamour

Habitat in Brasilia herb. fusc

Caulis crassitie filigerosus, villosus, teres. Folia petiolata, remota, vix  
serrata, venosa, utrinque pubescentia, 5 nervia, acuta, bipolliciana  
vel parum ultra. Stipula ovata, minuta. Pedunculi axillares, longitudi-  
ne petioli, filiformes, semi pollicares, pilosi, utrinque bractea parva, ovata  
versus basin. Bractea superiores, longitudine pedunculi, acuti, colora-  
ti, 5-7. nervio.

latifolia Dalechampia foliis trifidis subdentulatis tubo intermedio oblongo acumi-  
nato

Dalechampia latifolia Lamour. cum synonymo

Habitat in America herb. Guaf.

maxima affinitas cum Dalech. scandente. Caulis, uti petioli et bracteae  
nervi. <sup>et</sup> Bracteae ~~supra~~ glabrae. involucria <sup>involucra</sup> oblonga majora supra glabriuscula, supra villosa  
fulva

religiosa vide in Encycl.

penurana *Daléchampia* foliis trifidis lobis ovato-lanceolatis subintegerrimis,  
involucris ovatis trifidis.

*Daléchampia penurana* Lamour.

Habitat in Peru herb. Tuss.

Caulis teres teres striatus, subvillosus. Folia profunde pinnata, oblique  
centriculata, supra glabrescens, subtus villosa, reticulata. Pedun-  
culi incani, pollicares. Bractea quatuor, fetacea sub involucri.  
Involucrum ovale vel ovatum, 7nervis, tomentosum, Capsula hirsuta  
similitudinem maximam habet cum *Daléchampia* a Ryano.

*parrifolia* Dalechampia foliis trifidis lobis oblongis, involucri ovaliter trifidis

Dalechampia parriflora Lamour

Habitat herb. Guaf.

Caulis teres, superne canescens, striatus. Folia pollicaria, basi cordata, utrinque tenuiter villosa, mollia, subcanescentia, obtusa, remote subserrata.

Pedunculus axillaris, folio longior. Bractea sub involucri subulata. Involucrum semipollicaria villosa, obsolete venosa.

tilio folio Dalechampia folio cordatis integerrimis subtus villosis-subtomentosis,  
in involucri cordatis tridentati

Dalech. Yliofolia Lamour.

Habitat herb. mar. Guaf.

Caulis striatus, teres, pubescens. Folia tripollicaria, attenuata, supra glabra  
et venosa subreticulata. Stipulae setaceae. Bractea sub involucri 4 ma-  
setacea. Involucrium pollicare, venos-reticulatum, quinque nervis, tomento  
sum.

Hae familiae aut species altera a Ryano folio indiviso



*tamnifolia* Dalechampia foliis cordatis glabris, bracteis ovatis denticulatis

Dalech: *Tamnifolia* Le March

Habitat in India orientale herb. 4us

Caulis Vercis, glaber, superne villosus. Folia petiolata 3-4 pollicaria, acuta remote denticulata, dentibus mucronatis, oculo armato pilis raris adspersa. Stipula lanceolata. Peduncilli petiolo crassiores et longiores, versus medium bractea duo, lanceolata et 4 sub involucri. Involucrum pollicare striatum, acutum, coloratum.

*Dalichampia*

Habitat in Deylona König herb Royeni 5 in nemorosis pale

Stem ex subdichotoma ramifus. Rami teretes, glabri. Folia petiolata, opposita, 2-3  
pollicaria, lanceolata-oblonga, integerrima, utrinque obtusa, venis glabra. Pedun-  
culi <sup>in pollicari</sup> terminaliter bifidi, capillares: pedicelli <sup>sempollicares</sup>, quinque, umbellati. Flores  
plures, minutissimi intra involucrium.

Flores masculini in umbella inversi. Cal. 6phyllus: foliolo ovata, acuta. Subaquea  
eae, Stamina 12. nectaris lenita. Flores foemineus in umbella <sup>eadem</sup>, pedunculo breviori  
fraxioni, Cal. ut in ♂. Germen vultuatum Inquetum, angulis canatis. Styli 3.  
bipartiti. Capsula vultuata, Inquetra, In locularis. Semina tria, oblonga, laevia,  
cinereo-fusca König  
an reversa hejus generis?

pentaphylla Dalechampia foliis quinato-digitatis

Dalech. pentaphylla La Martk

Habitat in Brasilia herb. Guss

Caulis teres, superne angulatus, pubescens. Petioli bipollicares, striati. Folio-  
la petiolata bi-tripollicaria, lateralia minora, oblonga, acuminata, remota  
serulata, venosa, supra glabra, nitida, subtus pilis raris adpressa. Stipula  
ovata vel lanceolata acuta, inter lanceolata inter foliola. Pedunculi  
flescentes tomentosi. Bracteae ovatae, obtusae, villosae, aevae. Involucrum  
foliola profunda squesida, laciniis lanceolatis tomentosis striatis.

*Triphylla Dalechampia foliis Vernati glabri*

Dalechampia *Triphylla* La Martk.

Habitat in Brasilia herb. Tusf.

Caulis striatus, glaber. Folia, uti foliola petiolata: foliola bipolliciana, <sup>et ultra</sup> ovato-lanceolata, acuta, remote subserrata, utrinque glabra, subtus vena  
sa: lateralia intus basi breviora et angustiora. Stipulae lineares. Pediculi  
axillares, semipollicares. Bractea sub involucri lanceolata. Foliola  
involucri semipolliciana, profunde trifida, glabra: lacinia intermedia  
lanceolata: lateralia ovata, denticulata.

*Triplaris Dalechampia* foliis trifidis supra nitidis subtus tomentosis integerrimis

*Dalechia trifolia* La Martk

Habitat in Brasilia herb Guaf.

Caulis crassitie penna arsenae, villosus subtomentosus. Petioli tripolliciares, flavo-tomentosi. Folia palmata, supra nervi quinque flavo-tomentosi, subtus reticulata: lobi laterales ovati, intermedius oblongus, exorsum versus interdum remote denticulati; denticuli pauci, obscuri. Pedunculi saepe gemini, longitudine et crassitie petioli, flavo-tomentosi. Bractea sub involucri oblonga, uti et duo in medio pedunculi aureo-tomentosi. Involucrum foliola profunde trifida: laciniis ovatis, acutis serrulatis, coloratis venosis, pollicariis, basi autem nec cordata.

villosa Dal.

*Scirpalia Dal.*

Grasflecken Dal.



*parvifolia* D.

*Catipolia Dal.*

penurara S.

*Heterophylla* Dal.

*Filicifolia Dale*

*Samnifolia* Dal.

Convolvuloides Dal.

*pentaphylla* Dale



*Triphylla* Dal.

Prandeni Dalee

~~Triloba Anyma foliis trilobis Lin. S. V. Jacq. lat.~~

colorata <sup>2</sup> foliis integerrimis Lin. Suppl. 421. x L. V. 862

Habitat in nova Granada

semilis scandenti, sed folia quidem triloba, verum integerrima, minusque  
profunde divisa nec serrata. involucri magis oblonga, petalodes  
f. coloratum nec basi cordatum aut vix de Lin.