

# Daphne

## x Floribus lateralibus

1. mezereum. D. floribus sessilibus ternis, foliis lanceolatis deciduis
2. Thymelaea D. floribus sessilibus axillaribus, foliis lanceolatis, caulibus simpli-  
subterrenis, dioecis, glabris  
costatis & rabris
3. pubescens D. floribus sessilibus aggregatis pube seratis, foliis lanceolatis linearibus caule pubescente
4. vermiculata D. floribus solitariis glabris, foliis lanceolatis linearibus carnosissimis
5. villosa. D. floribus sessilibus, foliis oblongis planis pilosis ciliatis confertis
6. nitida. D. floribus sessilibus aggregatis basi nudis, foliis oblongis sericeis
7. tartaronarum D. floribus sessilibus aggregatis basi imbricatis, foliis cuneatis nervosis sericeis
8. alpina D. floribus sessilibus aggregatis, foliis lanceolatis obtusiusculis subtus tomentosis

9. Laureola D. racemis axillaribus quinquefloris, foliis lanceolatis glabris  
 10. ~~portulaca~~ D. pedunculi biflori, foliis lanceolato-obovatis  
 11. Dierca D. floribus geminis, foliisque lineari lanceolatis caule ramoso  
 12. ~~obcordati~~ D. umbellae <sup>axillari</sup> axillaribus, floribus divisis, foliis lanceolatis  
 glabris

2 x floribus terminalibus

2079. Indica D. capitulo terminali pedunculato, foliis oppositis oblongo-ovatis  
 glabris  
 2273. Lagetta D. fructu paniculato, foliis ovatis acutis  
 1944. Concom D. floribus fasciculatis sesquipedibus, foliis lanceolatis mucronatis nudis  
 21. Vinifolia D. racemis compositis erectis, floribus confertis, foliis oblongis  
 23. quiduum D. floribus paniculatis, foliis lineari lanceolatis acuminatis  
 16. squarrosa D. floribus pedunculatis, foliis frangis linearibus patentibus  
 mucronatis  
 12. oleoides D. floribus geminis sesquipedibus, foliis elliptico lanceolatis glabris  
 13. Seneca D. floribus aggregatis sesquipedibus: foliis laciniis corollae obtusis, foliis  
 lanceolatis <sup>subtus villosis</sup> ~~subtus villosis~~  
 14. bustifolia D. floribus aggregatis sesquipedibus, foliis oblongis obtusis <sup>subtus villosis</sup> ~~subtus villosis~~

polygalifolia D

- 17 +6 folida D. glabra, floribus congestis sessilibus, foliis oppositis petiolatis ovatis oblongis acutis
- 18 +7 rotundifolia D. hirsuta, floribus congestis sessilibus, foliis oppositis ellipticis subreticulatis glabris.
- 19 Dodona D. Capitula terminali subsessili multiflora, foliis parvis oblongo-canaliculatis glabris.

Vinifolia Daphne pedunculis dichotomis terminalibus, floribus aggregatis sessilibus, foliis  
Lanceolato-ellipticis

Daphne vinifolia ramis compositis aëreis, floribus terminalibus confertis, foliis  
oblongis Paed. prodor: pag. 63.

9 innotuit Guadeloupe legit de V. Rohr in insula In Ryan 5.

Rami teretes, cortice fusco-cinereascenti, punctati, apice cinerei.

Folia petiolata, alterna, 4-5 polliciana, lanceolato-elliptica, attenuata,  
utroque acuta, integerrima, membranacea, glabra, venosa.

Petioles subtus convexi, supra planiusculi, semiunguiculares.

Pedunculi terminalis, ter dichotomi, ramosi, incani.

Flores terminales. sessiles, aggregati 15-10. parvi, extus tomentosi  
intani.

Stamina quatuor in faucibus tubi, quatuor in ipso tubo.

Stylus magnitudinè rufi, glabro, mucronata.

Caucasica Daphne umbellata terminalibus, foliis oblongo-lanceolatis mucro-  
natis Pall. fl. Ross. 1. p.  
Habitat ad Caucasum 5

foetida Daphne

Dorsten

Habitat herb. musci

Rami glabri, teretes, superne compressiufculi. Flores breviter petiolati, lanceolati, bipolliciana, membranacei, citraque acuta, venosi, integerrima. Pedunculi terminalis, 4 flori. Flores umbellati, parvi, breviter pedicellati

*Andica Daphne* capitulo terminali pedunculato, foliis oppositis oblongo-ovatis gla  
bris Oefsch. d. 246 Lin. Spec. pl. p. 511 + L.V. p. 371

Habitat in China

Fructus parvus. folia integerrima glabra. Pedunculus terminalis,  
brevissimus, apice gerens flores 6-8. sepales 4

1415 fericea Daphne floribus aggregatis terminalibus sessilibus; foliis ellipticis - lanceolatis  
20 subtus villosis, laciniis corollae obtusis

Thymelaea cretica des foliis subtus villosis Tournef. Cor. 41.

Habitat in Creta Broussonet Ichthyologus seminis. ~~Nepesini legit G. Cluist. Siciliam~~

basia

Crataegus ramis fissis. Ramis teretes, fusci, superne villosi.

Folia versus apicem ramulorum, conferta, <sup>sessilia</sup> lanceolata elliptica, <sup>arantia,</sup> sessilis in te-  
gerrima, acuta, supra glabra, subtus villosa

Corollae purpureae, terminales, sessiles, quinque. <sup>Corollae</sup> Tubus villosus, ferrugineus, basi

Corollae tubus villosus ferrugineus, basi amplatus. Limbi laciniis oblongis, obtusis, in-  
tus glabris, tubo dimidio brevioribus.

Truncus subovatus.

(a Daphne oleoides differt foliis subtus villosis, numero florum, laciniis  
limbi oblongis)

[Litr. H. pag. 29.]



Jepico Daphne floribus aggregatis subsistibus quibus

14-15  
21

buxifolia

Daphne floribus aggregatis, sessilibus, terminalibus, foliis oblongis  
utranque ~~villoso~~ <sup>villoso</sup> obtusis, subtus villosis

Thymelaea orientalis buxifolia subtus villosa, flore albo. Tournef.

Corol. 41.

Habitat in Oriente Brou forest.

Trunk ramis teretibus, villosis, nudis.

Folia versus apicem ramulorum, <sup>sessilia,</sup> approximata, oblonga, basi parum  
angustiora, apice rotundata, juniora utrinque villosa, reliqua  
tantum subtus, arena, unguiculata.

Flores terminales, sessiles, 6. Interdum 3

Tubus Corollae extus villosus, basi gibbus; laciniis oblon-  
go, obtusis.

(A procedente differit figura foliorum et Corolla alba

terminalis semipetali, ramosus: rami purpurei ceteris superne villosi

25. *Salida* Daphne glabra, floribus terminalibus congestis sessilibus, foliis oppositis  
petiolatis ovato-oblongis acutis Lin. Suppl. pag 223. L.V. p. 372.  
Habitat in Tachet, societatis in fult,  
an distincta a *D. indica*.

collina D. floribus fasciculatis terminalibus sespilibus, foliis cuneiformibus  
subtus villosi lacini corollae obtusi

Thymelaea saxatilis oleo folio Tournef. cap. 594.

Daphne collina: floribus fasciculatis terminalibus sespilibus, foliis  
obovatis obtusi supra glaberrimis subtus villosi Smith.

Spicilegium botan: fasci: 2. pag 18. tab. 10

Neapoli legit de Schlarzabusch.

Fruticulus ramis sparsis <sup>caerens</sup> caeruleo fascis inferne glabri superne  
caerulis tomentosi incani. Solea sparsa sesquipedaliana basi  
attenuata subseptica sesquipedaliana obtusissima supra nitida  
vix venosa margine parum reflexa subtus villosa <sup>tomentosa</sup> incana  
Flores terminales plures villosae tomentosa lacini corollae  
oblonga obtusa.

Rami sparsi saepe subverticillati Herb. Tournef. de d. fasci.

reliqua Synonyma a de Smith huius allata ad alpinam pertinent

11 Elevatum Vallinum racemis foliosis, antheris corolla longioribus, foliis ellipticis  
integerrimis subtus villosis glaucis  
Habitat in America Septentrionali  
Ramuli pubescentes, folia venis villosa similibus *fluminea*

a *fluminea* non diversum



glomerata Daphn.

La Mark

Habitat herb. Desfont.

Caulis prostratus, cicatricatus, glaber. Folia versus apicem, conferta, oblonga, aerea glabra  
pubes serosa nervosa, basi versus partem angustata, pollicaria. Flores in apice congesti.

Lapine

Habitat in Syria Herb. Desfont.

Endex ramosi: ramifraci, ramulosi tuberculati a capite foliorum, superne villosi.



juniperina Daphne

*Thymelaea cantabrica juniperifolia supina* Tournef. Graft. p. herb.

Habitat in Hispania herb. Guss. 4

Trunculus ramosus: rami teretes, cortice griseo, superne cicatricati, apice villosi.

Folia lineana, vix unguiculata, acuta, villosa, frequentissima, imbricata

Diversa ab alpina

*Somentopu Daphne*

Habitat in Oriente heb. La Manhi 5

Rami teretes, villosi-tomentosi. Folia canaliculata-oblonga, obtusissima vix pollicari  
cana

Daphne

*Thymelea orientalis*, minima, laevigata foliis, floribus glomeratis albis

Tournef. Cor. pag.

Habitat. in Oriente herb. Mus.

Caulis basi interdum ramis fruticosis vel semipedalis

habes

*Thymelaea hispanica* annua simplicia

Habitat in Hispania herb. Tournef.

Emittit ramosus: rami virgati: pubescentes, superne calani.

habeo

*Thymelaea folus Myrti iacani*

Habitat herb. Tournef.

Caulis rami sparsi, incurvi

habes

*Thymelaea* folis canducantibus, panicis infra mollebus angustioribus ea  
Insulis maris Algeri herb. Tournef.  
Habitat in Insulis maris Algeri herb. Tournef.  
Caulis semipedalis, dic hotome ramosissimus.

habes

rotundifolia Daphne

Habitat herb. Musci

Rami glabri, apice tomentosi, remote tuberculato & catenati. Folia opposita,  
brevissime petio~~la~~ lata, oblonga, subrotunda, glaberrima, pollicaria, subemar-  
ginata, supra venosa, subtus venis obsoletis

Torsten

Lapine

*Thymelæa seu Vatica rosea laniifolia argentea* Tournef. Cor.

Habitat herb. mus.

Caulis ramosissimus

Lapine



*Thymaloea hesperica*, folus myrti incanis Tournes. Inf. v. h.  
• Habitat in Hispania herb. mus.

*Thymelea lanata folio hispanica hermaphrodita Tournef. Gasp. v. h.*  
*Habitat in hispania herb. Musci*

*hates*

*Daphne*

*Sanamunda* / *Olusii* *hisp.*

Habitat in *Hisp.* *herb. Mus.*

Frutex fere pedalis, ramosis. rami ramulosis, oppositi, tuberculati. Folis frequentia, opposita. Flores axillares

habes. Descriptam, à me ipso in *Hisp.* lectam, sub eodem syn: in *herb. Mus. Berol.*

*Thymelaea cantabrica*, peni-penifolia, ramulis prostratis - Tournef.

Griff. v. li

Habitat in Cantabria herb. mus.

Rami prostrati

herbes

*Salicifolia Daphne*

*Thymelaea orientalis salicifolia*, flore albo odoratissimo Tournef. Cor. 41.

*Thymelaea benita salicifolia* odoratissimo flore albo odorato Tournef. Cor.

~~Herbarium~~ in herb. Guss.

Sic ut *Daphne mezerei*. glaber folia lanceolata, sesqui pollicaria, sparsa.  
eodem videtur ac *Daphne* ex herbo Hofn. floribus albis.

Daphne

*Phymeloa hespanica* foliis myrti nitens Tournef. G. r. herb. pag.

Habitat in hispania herb. Desfont. 4.

ramosus

habes

1.  
Calycina Daphne Pourret

Habitat herb. Guss.

Stemulus semipedalis, erectus, alterne ramosus, glaber, apice villosulus. Folia  
sespita unguiculata, frequentia, lineari-lanceolata, patula, acuta, venia, ~~ca-~~  
erectis: rudimenta foliacea in axillis. Flores axillares, geminati, seiples,  
glabri

glomerata Daphne

*Thymelaea cappadocica minima* Laureola folio flore glomerato Tournef.  
Cor.

Habitat in oriente. herb. Guss. 5.

Caulis erectus, squamatus, ciliatus, crassitie pennae columbinae. Folia  
superne, approximata, sessilia, vix pollicaria, lanceolata, acutiuscula, ba-  
sin versus parum attenuata, glabra, arena, enervia, supra nitidiuscula,  
Flores terminaliter, plures, brevissime pedunculati, unguiculati, glabri.  
Bractea linear-lanceolata, Corolla duplo brevior.



nupella Daphne

Habitat herb. Insul.

Frustricus non palmari. Caulis brevis spinosus, totus divinus in ramis brevibus: ramuli plures, digitaliter, erecti, simpliciter spinosi, confertim punctato-tuberculati, filiformes. Inferne glaberrimi, superne villosi, subaercentes. Folia linearia, angustissima, acutiuscula, sessilia, glabra. Flores axillares, gemini, sessiles, longitudine foliorum, villosi, subaercentes.

In flora Daphne floribus sessilibus axillaribus congestis, Calycibus 7  
3 floris, foliis lanceolatis prope Louv. fl. Portench. pag. 236  
Habita in Cantone Sinanum  
Arbutula in pedalis. folia integerrima, glabra, brevis  
petiolata. flores flavescens. Calyx communis triphyllus  
Corolla 4-5 fida.

non vidi

*Cannabina* Daphne umbellis Verminalibus foliis <sup>ovato-</sup>cani coloratis  
oppositis Lour. fl. Cochinch. pag. 236.

Habitata in Cochinchina  
arbor 10 pedalis. Folia integerrima, glabra. Flores lutei.  
Limbus Corolla 4 fidus. Baccia rubra

altaica *Daphne floribus fasciculatis* Terminalibus *proplebis*, foliis oblongo-ovatis  
glabris Pall. fl. Ross. 1. p. Tab. 35.  
Habitat in alpebus altaicis 5  
Omitter elegantissimus

Vermiculata Daphne foliis linearibus ~~superioribus~~ floribus sessilibus lateralibus solitariis, <sup>glabris</sup> foliis linearilanceolatis villosis.

Sanamunda vermiculata Barral. Geon. 231.

Legi in Regno Aragonis.

Stem humilis, rigidus, ramis finis. Rami purpureo-flores, verrucosi, <sup>superne villosi.</sup>

Folia sessilia, conferta, linear-lanceolata, crassa, obtusa, villosa.

Flora axillares, solitarii, oppositi, sessiles, glabri, foliis breviores. Squamae <sup>binae, oppositae, minutae & ad basin calycis.</sup>

Corolla calice ovato.

Thymelaea Daphne floribus sessilibus axillaribus solitariis, foliis lanceolatis, <sup>ramis</sup> ~~caulis~~  
simplicissimis.

Daphne Thymelaea L. S. Veg. pag. 371.

Conspiciuntur inveni ad fines Castiliae nova versus Navarram.

Ericaceae humilis, basi tantum ramifera. Rami erecti, simplicissimi,  
laevissimi.

Folia lanceolata, glaberrima, caetera, glauca viridia, unguiculata.

6 Flores axillares, solitarii, sessiles, <sup>inter umbrae vel tunc,</sup> foliis brevioribus, dioici, tetrandri

~~Differ~~ <sup>Saepe ramifera, ramis clausis</sup>  
(Daphne dioica differ ~~haec la ramifera ramis clausis~~, foliis congestis  
brevioribus, versus apicem latioribus nec utrinque angustatis, floribus geminis

pendula *Daphne capitulis lateralibus pedunculatis involucratis nubaribus*  
*foliis lanceolato ellipticis alternis glabris Smith-plant. med. 2. pag*  
34. Tab. 34

*Scopolia composita* Lin. Suppl. pag. 409

Habitat in Tarsis

Radix alterna <sup>4. m. et</sup> apice foliosi, glabri. Folia altera breviter pe-  
tiolata, acuta subinaequilatera integerrima venosa, supra  
glabra, subtus laevi pallidiora. Dunciuli pellicia <sup>4. m. et</sup> teres sursum  
vesperis <sup>4. m. et</sup> incrassati basi bractei lineari pilosi, <sup>4. m. et</sup> axillares  
astellis <sup>4. m. et</sup> proteris anni. Involucrum diphyllum foliolis obovatis obtusis  
conicis integerrimis floribus parum longioribus extra pube-  
scentibus. Calyx <sup>4. m. et</sup> extra hirsutus

polygala  
folia  
22  
Daphne an varietas Paspuno hirsuta ex Hispania  
et folia ramorum ramulorum utraque aequalia villosa cana, longiora, ramulorum tantum imbricata extus glabra est  
Thymelaea polygala villosis foliis Tournet Inf. R. II. p. 594

Differentia est si distincta

Folia oblonga utraque villosa canis floribus ---

desunt in specimen

Pericarpium ramorum rami tomentosi nigra. semina plera parva  
conferta oblonga lanicolata forte eadem ac Paspuno hirsuta  
folia autem in ramulis simillima





old

14 *Cneorum* *Daphne glabra fasciculata* terminalibus laxis sessilibus, foliis lanceolatis lanice  
latis mucronatis glabris nudis Lin. L. V. p. 371. Aequ. fl. Auct. vol. 5: t. 426.

*Cneorum* Matth. h. 46. Clus. h. 39

*Thymelaea affinis* facie externa Bauh. Pin. 403.

*Daphne humifusa*, foliis oblongis flores sessiles terminales subsurgentibus  
Laur. monsp. 57. Duham. arb. r. p. 326 t. 94

Habitat in Helvetia, Hungaria, Pyrenaeis, Baldo &

Frutex glaber tenuis caule basi decumbente ramis sparsi. Folia sessilia  
sparsi, lanceolata basi angustiora acutius mucronata terminata.  
Flores plures purpurascens tubo velloso

Stylis

13 Lagetto *Daphne* fruticosa paniculata terminalibus foliis ovatis acutis Schw.  
prodr. p. 83 Brown Jam. 371. t. 31. fig. 5  
Launfolia arbor Sloan h. 2. 22. t. 160. f. 2. 3. 169. 1. Bois dentelle  
Bois dentelle Nibby Donny. 172. t. 1. f. 1. 2. 3. 4. 5.  
Habitat in Jamaica Hispaniola &

15 *trinifolia* Daphne saemmis compositis erectis, floribus terminalibus confertis foliis  
oblongis. Schum. prodr. p. 63.  
*Launus americana* Mill.  
Habitat in Jamaica

~~non vid.~~ Descript. vide inter americanas *Phytocoris paniculata* Pursh

arborescens folia Daphne hispida, floribus terminalibus congestis sessilibus, foliis oppositis ellipticis subpetiolatis obtusis glabris. In Suppl. p. 223. L.V. p. 322.

Habitat in Norraströ  
Rami tomentosi cap. canis.

non vidi

25 Dora Daphne capitulo terminali subsupli multifloro, foliis parvis oblongo can-  
colatis glabris Hort. kew. 2. p. 26.

Sij Siko, vulgo Runtjo et: Rantjoze et Gamma Runtjo Tromph. Am.  
exot. Japon. v. p. 144 t. 16.

Daphne odora. floribus aggregatis sessilibus terminalibus, foliis ovatis  
alternis glabris Thunb. fl. Jap. 1797 & Hort. Jap. nov. Tom. 2. t. 7.

Habitat in China et Japonia;

Caules dichotomi, <sup>subpilesi</sup> f. glabrescentes. Rami divaricati. Folia  
ad apicem ramulorum <sup>conferta</sup>, et sequipollicana utrinque  
acuta patentia. <sup>sub</sup> f. glabra inaequalia crassa, subtus pallidiora.  
Flores cincti. Bracteae inter folia et florum imbricatae lanceolatae  
concaevae, calyce duplo breviores. Corolla glabra tubus perspu-  
reus: laciniis intus imbricatis

Caucasica 8

Pall. fl. 101f.







altheoides  $\beta$  / Convolvulus Linn. Sp. pl. pag. 22.

Convolvulus sericeus, caule volubili, stigmatibus simplicibus; foliis palmatis pedatis pedunculis unifloris Forst. Descript. pag. 204

no 11.

Altheoides

varietas hoc Convolvulo ~~altheoides~~ <sup>est</sup> tenax. Corolla minor, caliculae duo  
exteriora calycis non pilosa, sed fere nuda. Villosoitas in foliis  
densior quam in ~~altheoides~~ <sup>vero</sup> ~~tenax~~ differentia minus sufficit pro  
specie distinguenda, praesertim cum in speciminibus variis  
in Europa australi et Tunisi visis, diu ~~varietas~~ <sup>varietas</sup> ~~et~~ foliis plus  
vel minus disiectis varie ludat faciantem locum. folia super  
non Alth: omnis etiam sunt, ac in serie ex Forst. ~~tenax~~ de qua  
est varietas consideranda.

10 Squarrosa Daphne floribus terminalibus pedunculatis, foliis oppositis lanceatis  
patentibus mucronatis Lin. S. V. p. 372.  
Thymelaea capitata Lamour. f., foliis creberrimis minimis adulceatis  
Burm. afr. 134. t. 49. fig. 1.  
Habitat in Aethiopia

non vidi

r

16 occidentalis *Daphne pedunculata* acillaribus, floribus terminalibus umbellatis  
bis deciduis, foliis alternis lanceolatis glabris. Schw. prodr. p. 63.  
Habitat in Jamaica;

non vidi

10 pontica Daphne pedunculis lateralibus bifloris, foliis lanceolato-obovatis  
Linn. l. v. p. 371

Thymelaea pontica, citri foliis Tournef. d. 2. p. 179. t. 100.

Habitat in ponto. ♀

glaberrima, Ramis perpendicularibus. Folia venosa acuta, bipollicaria  
basi angustata, superne pollicem lata. Pedunculi compressi unguem  
longos. Flores gemini sespites pedunculo longiores. laciniis subulato longi  
tudine tubi <sup>parum acuminata</sup>

4 *Caureola* *Daphne* racemis axillaribus quinque floris, foliis lanceolatis glabri lin. 1.  
V. pag. 371 \* *Loesq. fl. Austr. vol. 2. t. 183*  
*Caureola* *God. pempt. 365.*  
*Caureola* *sempervirens*, flore viridi, quibusdam *Caureola* *mar* *Bauh. Pin. 462.*

Habitat in Anglia, Helvetia, Gallia, Babelot,

Inter tripedalis ramifera. Rami exsti cortice cinereo lori ciliati ad  
aquem foliiferi <sup>mutis ramos anferens</sup> *colia* *psilia* *conferta* *in* *qualia* *tripollucaria* *vel*  
*minora*, *basi* *angustiora* *acuta* *avenia* *loria* *integerrima*. *Racemi*  
*axillares*, *laterales*, *breves*, *bracteis* *conicis*, *alternis* *absque* *floribus*  
*in* *frut* *aliis*. *Flores* *terminales*, *racemi* *in* *umbellulam* *congesti*. *Flores*  
*triflori* *colore*, *odore*, *tempore* *lin.*

*Dioica* Daphne floribus axillaribus geminis foliis linearibus lanicolatis glabris  
Lyn. Suppl. nos 223 \* p. 5. nos 371  
Tanamunda prima Clus. hist. 88.

*Thymelaea* foliis chameleae minoribus subhirsutis

*Daphne Dioica* floribus axillaribus geminatis, foliis linearibus lanicola-  
tis Gouan illustr. p. 27 t. 17. fig. 1. \*

Habitat in Pyrenaeis.

Fructus pedalis nuda ramorum cortice puberula cori. Rami ad apices  
ramorum conferti <sup>rami ad apices</sup> et operati a caulis foliorum. Folia conferta  
in axilla ramorum <sup>ramorum</sup> ~~parva, octofida~~ <sup>glabri</sup> linearibus. Flores longitudine foliorum  
albido flavescentes. Tubus ventricosus <sup>uneno glabro</sup>

an flores sessiles vel pedunculati





calycina 8-

Enciclopedia de plantas medicinales que se cultivan en el Perú  
de la familia de las Solanaceas

Enciclopedia de plantas medicinales que se cultivan en el Perú

Enciclopedia de plantas medicinales que se cultivan en el Perú

Habitada en las montañas, Huancabamba, Huancayo, y  
de la familia de las Solanaceas

~~Pinus sicifala.~~

~~Ann. d. ind. 2. p. 230 t. 129.~~

~~Euphonia Quoy. gen. pag. 248.~~

~~Sapindus litchi~~

α alpina Daphne floribus sessilibus aggregatis lateralibus; foliis lanceolatis obtusis  
sinuatis, subtus tomentosis Lin. S. V. p. 371.

Chamaea alpina incana Lobel. Ic. 370

Chamaea alpina, foliis inferne incanis Bauh. Pin. 462.

Daphnoides foliis pinnis bipartitis Gagn. fasc. 6. t. 3. fig. 7.

Chamaea pumila saxatilis, flore pallido Banel. Ic. 234.

β. Thymelaea incana mersei foliis et facie pinnatis admodum fragilibus  
Pluch. alm. 366. t. 229. fig. 3.

Habitat in alpebus Helvetiae, Geneva, Italia, Austria

in ramis diffusi crispis perno columbino, superne pilosis  
foliis inferne aphyllis. Bala approximata pollicaria basi attenuata,  
juncura hispida, adulta calva. Flores 2 vel 3 campanulati  
tubo piloso



*pubescens* Daphne

pubescens Daphne floribus sessilibus lateralibus <sup>pubescentes</sup> aggregatis, foliis lanceolatis  
lineariibus, caule pubescente Lin. Mant. 66 + P.V. pag. 371.

Habitat in Hispania & (non Austria)

Caules basi indecipientes, simpliciter pubescentes. Folia alterna, remota,  
lineari lanceolata, nudiuscula, annua, submucronata. Flores axilla  
res solitarii sessiles, angusti, quinque vel pauciores, tubo filiformi  
pubescente, foliis brevioribus. Diversa vid. a Thymelae Lin. l. c.

1. *Mezasecum Daphne* floribus trifloris ternis, foliis lanceolatis deciduis Lin 8. veg. pag.  
371. Flor. Sant. 260.

*Daphnoides* Camer. epit. 937.

*Lauroda* foliis deciduis, flore purpureo, officini *Lauroda* femina Bauh. Pin  
462.

4

Habitat in Europa boreali, sibiria 3

Orbit ex h. f. tripudialis cretus fmet nigraus remefus. Tolia



4 var miculata Daphne floribus lateralibus solitariis glabris foliis <sup>conjugatis</sup> lanceolatis  
lineamentis carnosis subulosis  
Habitat in Amazonia  
Indiculus <sup>de Botus</sup> pedalis ramiflorus, rigens. Rami <sup>caule</sup> exasperati <sup>inverati</sup>  
ramuli <sup>caulis</sup> pubescentes. <sup>sup. purpurascens</sup> Solia vix unguiculata conferta obtusa  
fanofo, <sup>pubescentes</sup> subtus convexa <sup>sup. purpurascens</sup> supra vix canaliculata  
Flores axillares. tubo glabro ventricos ~~foliis~~



verticillata 9 floribus verticillatis caule simplicissimo Lin. Spei. pag 333  
Centaurium minus ad alas florum Plum. Spei 3. c. 31. fig. 2.

Habitat in America

Caulei erectus pedalis vel ultra uti tota planta glaber tetragonus  
a basi usque ad apicem floriferis folia sessilia lanceola  
attenuata bipollicaria basi acuta trinervis bracteae lanceo-  
lata laciniis calycis longitudine seu corollae attenuato apice  
reflexo capsula oblonga longitudine calycis laciniis corollae  
mucronata linearis. Stylus unicus. Anthera cuspidata apice  
basi bifida laciniis non divariatis pyramidalibus

retulis capsula longioribus calycibus subulatis

gent.

~~Septem. videri. lll. pertinet ad sed. 4. ad ora~~

nitida Daphne floribus lateralibus aggregatis sessilibus, basi nudis, foliis lineari-oblongis  
sericeis enerviis.

5-6.

Thymelaea, seu Tadonraira Lini foliis argenteis Tournefort corol. pag. 41. ?

Legi in montibus calcareis Tuneti ?

# Species D. tadonraira, at folia sexuplo minor, enervia, squama nulla  
ad basin calycis, rami exasperati non vero squarrosi a squamis floralibus  
persistentibus, tubus corollae ventricosus longitudine foliorum

# Fruticulus interdum vix palmari interdum gutharnowii, ramosis simus  
ramuli flores foliis et flores sericeo nitidi. Squamae polygami.  
Floris polygami, etus sericeis, longitudine foliorum. Corolla tubus ventricosus

~~Mystus maculatus Loureiro fl. Cochini. t. pag 311~~

*quibus alio modo ordinantur*