

Latura

x penicarpus junopi

1. ferax D. penicarpus erecti ovati. spenis summis maximis convergentibus.

2. stramonii D. penicarpus ovatis erectis, foliis ovatis glabris

3. tabula D. penicarpus erecti ovati. foliis cordati glabris dentatis

4. mel. D. penicarpus nutantibus globosis, foliis cordati subintegris
pubescentibus

5. castrofa D. penicarpus tuberculati nutantibus globosis, foliis ovatis angulatis

x penicarpus lauribus

6. Corsi D. penicarpus ovati glabris erecti, caule festu toso herbaceo

7. aborea D. penicarpus glabris nutantibus, caule aborea.

Arborca Datura Penicarpis glabris inermibus nitantibus. caule arboreo Lin. I. V. p. 220
7 Aramonioides arboreum, oblongo et integro folio, fructu lavi Deval. penes. 2. p. 7 61. 746.

Habitat in Peru

Datura arborea penicarpis glabris inermibus oblongis pendulis, foliis
ovato lanceolatis oblongisque geminis, caule fruticoso DC. Penes. 2. pag
15. Tab 12 p.

Solia utriusque villosa fl. Per.

~~non~~

Ceratocaulon Satura foliis lanceolatis dentato-pinnatis, floribus axillaribus,

capsulis glabris lobis inermibus

Datum Ceratocaulon: pericarpis obovatis inermibus pendulis, foliis ovato-lanceolatis undulatis, subtus tomentosis, caule corniformi Ortega Dec. t. p. 11.

Habitat in Insula Cuba O

Caules herbacei, erecto-patentes; crassitie pennis dygnes et ultra, simplices, teretes, glabri. Folia petiolata, geminata, bipollicaria et ultra, altero

(subtus tomentosa parum minore, lanceolata, dentato-sinuata, glabra, subtus glauca, venosa, # Dentibus obtusis, acuta. Pedunculi axillaresque ramulo, uni flori, solitarii, brevis sili. Calyx tubulosus, tri vel quadrilobis, latus, superne fissus. Corolla magna: tubus calycis longior et angustior, quinque-

gibatus: limbus campanulatus, albus, subtus radius quinque purpureo violaceus, margo decem dentatus. Stamina corolla breviora. Fructus oblongus, loricatus.

teratocaula *Datura* foliis ovato-lanceolatis undulatis pubes.
Tomentosi, pentacarpis obovatis nervibus pendulis Ort.

Cecid. pag. 114

Habitat in Cuba.

Caules crassi, corni formos, teretes, glabri, glaucis rebulez.

non vid.

Bananea Datura

Datura Bananea pericarpis inestribus oblongo cylindrico pendulis,
foliis lanceolatis angulatis congestis, caule fruticoso. Fl. Penur. 3. pag
15.

Habitat in Penuria in altis, frigidis et rudentibus

Stem quadrangulo, Caulis erectus, crassus supra ramosissimus. Ramis ter-
rectis, fraxillis, in summitate flexis. Folia 4-5-6 ex eodem puncto petiolata,
vultus laevissime pubescentia, supra glabra, nitida, inferiora ovato-lanceolata
angulata; superiora integerrime. Petioli teretes, folio duplo breviores. Pedunculi
terminaliter, solitarii, curvati, uniflori. Flores penduli, magni. Calycis ovati
pentagoni, pollicaris, variegati. Corolla calyce quadruplo longior, a medio
ad basem lutescent, superne rubra, lineis 15, sanguineis striata maculata. Cap-
sula fere bipalmoni. Fl. Pen. l. c.

'ferox Datura penicarpis spinosus erectis ovatis. spinis summis maximis convergentibus

Lin. Spec. pl. p. 255. t. V. p. 220. Am. Acad. 3. p. 403 +

Stramonium ferox Boer. Jac. 50.

Stramonium f. Datura ferox, pino crassioribus aculeis robustioribus Monj. h. 3.
p. 607. f. 15. t. 2. fig. 4. Raii h. 748. Germ. Lugd. b. 503.

Stramonium longioribus aculeis Karst. Ic. 112. 1172.

Datura Cochinchinensis spinosissima Zan. h. 1. p. 76.

Habitat in China ☉

Similis *D. Stramonio*, sed minus glabra et Capsula 4. spinis supremis maximis salda
convergentibus

Stramonium D. pentacarpis frunofis erectis ovatis, foliis ovatis glabris Linn. f. V

p.

fl. Dan. t. 436

Taxula Cam. Epid. 176.

Solanum foetidum, pomis frunofis oblongis, flore albo Bauh. pin. 160.

Habitat in America, nunc vulgaris per Europam ^{superioris et borealis} ~~superioris~~ ^{peninsule} dentata

Caulis erectus bis. tripedalis ramofis folia petiolata ovata
ang. ~~laciniato~~ angulata, utraque glabra. Pedunculi ex dorsum
ramorum biseri

~~ut minus de finienda~~

5, *Statula Datura Penicarpis fructus erectis ovatis: foliis cordatis glabris dentatis* Lin.
Spec. pag. 2567. LV. p. 220

Stramonium majus purpureum Raii h. 740.

Habitat

Similis *S. Stramonio* sed duplo major. Caulis purpureo-fuscus, punctis albis
adpressis, ad angulum acutum divisis, laxis. Corolla pallide corulea.
Folia argutius dentata, si complacentur cordata hinc Spec. l. c.

non vidi

metel d. Pericarpis fructibus rotundis, foliis cordatis subintegris pube-
scentibus. Lin. S. V.

Solanum prono fructu rotundo, longo flore Bauh. pin. 160.

Hummatu Rheed. Mal. 2. p. 47. t. 20.

Datura alba Rumph. amb. 5. p. 242. t. 07. fig. 1.

Habitat in Asia, Africa &

Caulis uti petioli ~~et~~ costa foliorum ^{folia} ~~et~~ ^{et} ~~venella~~ ^{venella} ~~pubescentibus~~ ^{pubescentibus}
_{sup. altero latere breviora}
folia integra vel obscure angulata. Corolla magna, aiumi-
na corolla ciliata ^{et calyx}

5
4 *foetida* L. perianthii tuberculatis nudantibus globosis, foliis ovatis angulatis
Lin. Spec. pl. p. 256. x

Nux metella Camer. Epit. 175.

Solanum foetidum, fructu spinoso rotundo, semine pallido Bauh.
pin. 60.

Datura rubra Kumpfh. Camb. 5. p. 246 f. 243. ⁸⁷ fig. 2.

13. *Solanum Aegyptiacum* flore pleas Bauh. pin. 160.

Solanum fructu spinoso rotundo, flore duplici triplicive Tournef. Fl. R.
4. 119.

Habitat in Aegypto O

glabra. folia tri-vel quadri-pollicaria, angulis remotis pinnatis
inquealibus. Calyx purpureus tubo dimidio brevior lacini-
bus lanceolatis acuminatis intus bifidentibus. Tubus supremus
vespi sensim amplatus. Corolla ex his violacea intus
alba sive opemina una extra albam. ^{et contrahitur} Duplicata
acuminibus corollae parum latioribus quam in metel glabronibus

glabri

~~Kumpfh. 5. 7. 243. 72~~

Coccoloba ^{fistuloso} *D. panicariis ovatis glabris inermibus erectis, caule herbaceo* Lin. Suppl.
foliis glabris
p. 146 * L. V. p. 220. Hort. Kew. 1. p. 239

Satura inermis Gaertn. hort. J. 3. V. p. 2.

Habitat in Abyssinia ☉

non vid.