

# Daucus

1. carota. D. seminibus hispida, petiolo pubescente nervosi
2. maundaucus. Seminibus hispida, foliisq[ue] centrali sterili carnosio receptaculo  
communi hemisphaerico, umbella radiata
3. Lucidus D. foliis lucidis, caule hirsuto, petioli lobatis, seminibus globosis
4. gummosus D. foliis bipinnatis: pinnis lanceolatis inaequalibus, involuelli  
foliolo extimobis trifido, caule piloso.
5. hispanicus D. foliis tripinnatis lineari-bus, involucri setaceo  
seminibus cauleque globosis
6. v. fraxinifolius D. umbella uniuersali basi coarctata, seminibus globosis
7. gurgelium D. radiis involucri planis, laciniis recuruis seminibus
8. manicatus D. seminibus in glochidi aculeatis
9. polygamus D. foliis pinnatis, folioli multifido lineari-bus, involucri  
foliolo trifido, seminibus hispidissimis, stylis conspicuis divinis
10. pumilus D. nigri  
foliis pinnatis: folioli inaequalibus pubescentibus pilosis, caule nudo
11. prostratus D. foliis pinnatis multifido lineari-bus hirsutis, caulebus pilosis  
inibus diffusis.

*Juncus Creticus* mill.  
*hispanicus* Gouan.  
*grammifolius* Gouan.  
*Polygamus* Gouan.



meoides Lanius

Habitat

hort. Pans. herb. Desfont.

Caulis erectus, angulatus, glaber, ramosus. Folia bipinnata, capillaria, facie  
mei. Umbella pedunculata. Anvolucra foliola fissa alia indivisa: involu-  
cella indivisa.

aureus Laurus

Habitat

Herb. Desfont

Caulis teres, hirtus, mucronatus, scaber. Folia subtrepinnata: pinnae lineares, acutae nervae

grandiflorus Darius

Habitat herb. Desfont.

Caulis herbaceus, scaber. Folia tripinnata: pinnae subpinnatifidae: lacinae lineariter acutae, costa fere vana.



*Vignaga* D. seminibus levibus, umbella univesfoli basi coacta. L.V.p. 277x  
Mant. 352. Gaigu. hort. 3.t. 26.

*Gingidium* alterum Dod. pempt. 702.

*Gingidium* umbella oblonga Bauh. pin. 151.

Habitat in Europa australi, Mauntania, Libano

Caulis bipedalis erectus glaber sulcatus ramosus petioli  
membranacei vaginantes subtripinata foliola  
quinque ad extimum e vagina pinnis angustis imo  
linearibus glabra umbella basi est receptaculum commune  
subrotundum solidum. Involucrum foliola plura  
angustissima pinnata pinnis utrinque geminis longi-  
tudine fere umbella in rotella longitudine umbella

Caulis glaber. Folia inferiora bipinnata, superiora petiolata, pinnatifida  
in planta majori pinnata: pinnis inferiorum alternis, subnatis  
micronatis, inferioribus petiolatis. Petiolus a fetis aequat subprostratus & laevius  
superiorum oblongus, obtusis inferioribus bifidis. Involucrum umbella lon-  
gus: fideola lanceolata: lacinis remotis, superioribus simplicibus, lanceolatis

seminibus glabris

inferioribus trifidis. Involucella 3 fida. Flores lutei. Radix villosa  
herb. prox. com

Carota D. seminibus hirsutis, petiolis subtus nervosis len. L.V

St. Jan.

7.723

Daucus vulgaris Clus. hist. 2. p. 190.

Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridi Bauh. pin. 151

β. Pastinaca tenuifolia sativa, radice lactea Bauh. pin. 151.

γ. Daucus sativus, radice atrorubente Tournef. 4. Pl. 4. 307.

Habitat in Europa merid. et  
hinc usque ad Alpes

Caulis ~~erectus~~ folia subtus pilosa tripedali folia bipinnata  
folioli cuneatis incis. involucria pinnata basi magis  
membranacea semina



mauntanicus D. seminis hirsidis, floribus terminali centrali sterili carnosio  
 receptaculo communi hemisphaerico hirsuti: pl. p. <sup>340</sup> <sub>341</sub> Len. Mant. 391. 5

~~Pastinaca tenuifolia, radice et umbella lutea Monf. hist. 3. p. 308.~~  
~~fig. 13, fig. 3. sicula hirsuta crispata~~

Pastinaca tenuifolia sicula hirsuta crispata Monf. hist. 3. p. 305: 19

Habitat in Hispania, Italia, mauntania O 4. 13. fig. 3

similis Carota sed umbella amplior non ad basin diversa  
 veniens ipsa basi hemisphaerico solido. Caulis uti rami

~~caerulei hirti. Folia et petala glabra. Folia bipinnata~~

~~folioli ternati pinnis obovato-oblongis <sup>basi</sup> acutis~~

~~lobis areis latioribus quam in omnibus aliis~~

~~quibus apex crepato-sublobata. Foliolum unum pinnam~~

~~recipere pinnam <sup>unam</sup> pinnis lanceolatis attenuatis mucronatis~~

~~pedis radii hirti involuella ovato-lanceolata~~

~~atenuata margine membranacea <sup>et</sup> hirti. flores~~

mattheoli ~~atenuati~~  
 gingidium ad gummi ferum refert all. Davi: hespan. joan

bene convenit ~~et~~ si pedunculum sterilem ad esse <sup>omnino</sup> negat quamvis

cum mea ~~et~~ joanis <sup>peru</sup> observata sed joanis planta ab

an mea ipsius all. diversa et forte huius pertinet descriptio enim  
 gingidium ~~omnino~~ convenit



Caulis bis. <sup>partes profunde</sup> In pedalis sulcatus lineis tuberculis plurimis piliferis ma-  
niato <sup>ramosus</sup> fraxat, ramosus. Folia petiolata bipennata, pinnis  
distantibus lanceolatis basi versus angustioribus serrato incis.  
dentibus mucronatis glabri margine pilis albidis raris <sup>hinc</sup> cili-  
atis. Petioli vaginates striati estus villosi tomentosi. Pedun-  
culi <sup>radicalium</sup> cili cadentes et terminales apice in receptaculo caroso  
orbata dilatati. Umbella ~~multa~~ radiata <sup>radice</sup> ~~longa~~ <sup>longa</sup>. Involucrum  
polyphylla linearia <sup>trifida</sup> ~~trifida~~ bipinna <sup>longitudina</sup> striata longitudine  
umbelle involuella externa trifida <sup>inter</sup> longiora in-  
terna subulata indivisa breviora. Corolla fere pharica  
radii petali duobus majoribus. semina parva oblonga  
seriebus geminis setarum. flos centrali pedunculatus  
carnosus uterum bini  
si hoc Len: Syn. Monsoni exclusum restitutum  
cultu hirsutem deponit

radicatis

floribus

*Cucumis Daucus*. Foliis lucidis, caule hirsuto, petiolis lobatis. Lin. Suppl. p. 179 \* P. V. p. 277.

Habitat in Mauritania &

Natura D. Carota, sed multo major. Caulis hirsutus, frigus rigidulus, nec ut in Dauc.

Carota tantum scaber. Folia grossiora, lœvia, ut petioli mitida. Lin. l. c.

Habitat in Mauritania &

Caulis in meâ valde hirsutus ut et vagina foliorum & rami, sicut  
bet bipedalis folia bipinnata inferiora foliola opposita  
scissile ut angustulana supra linea venis prima exarata  
cuneata acuta dentibus 2-4. superne cuneata in foliis supra  
nervi linear lanceolata integerrima, omnia mucronata  
evolvens foliola trifida laciniis subulatis, umbella triplo  
breviora Radix glabra ut semina

semibus glabris



gummifer. L. foliis <sup>bi</sup>pinnatis pinnis lanceolatis incis, involuiculis  
foliolo extremo bi p. trifido, caule lani caule nudo

*Daucus lucidus* gummifer Boic. mus. tab. 20.

*Daucus hispanicus* All. fl. pedem. n. 1383.

Habitat in Europa australi &

affinis maritimo folia supra lucida pinnis et lacini  
no pinnarum aristata. involuicula pinnatifida. foliolum  
unicum vel 2 ~~umbellule~~ umbellule longior et bus plerum  
que trifidus raro bifidus

Hispanicus 2 folus tripinnatis lineatibus, involucri setaceis femini-  
bus cauleque glabris

Habitat in Hispania suspens

Caulis erectus tenuiter striato loriculaber romosus. pinnae  
angustissimo integra una vel altera interdum in ipsa. flores  
non radiati



gingidum I radiis involucri planis: laciniis recurvis Lin. 1. v

Gingidum Matth. Com. 523. t. 524

Gingidum folio chorophylli Bauh. pin. 151.

Pastinaca folio Oenanthes Boell. sic. 75. t. 40. fig. 3.

Habitat Montpellier

Caulis et rami rade hirtis. Folia et petioli glabra, pennata  
foliis ternis, obovato-oblongi basi acuti saturate venatis  
lobis <sup>in summa</sup> crenatis, latioribus quam in cingentibus apice  
crenato sublobatis. Involucrum decursive pennatum pinnis  
lanceolatis attenuatis, mucronatis. Radii umbello hirtis  
involucella ovato-lanceolata attenuata margine membr  
natis alatis. flares vix radiatus

Dubito valde enim hic descripta Gingidum Linnæi vel  
potius ~~Boissianicum~~, obse maximam similitudinem  
cum figura Matth. nonnulla Lin. appropie. Boissianica plan  
ta longe diversa est et a Joanne ad D. polygonum elata  
folia inferiora magis composita

~~Synonymum Boe. ad polygonum se fert Joann~~

polygamus. F. foliis pinnatis folioli multifidi lineariibus, fo. una duam foliola  
trifida, Lamentibus hirsutis semis, styli longi semis divaricati

Pastinaca tenuifolia Ceanothis folio Boic. ju. pag. 75. id: 40 Mont. p. 9.

<sup>Tab. 9</sup>  
Daucus polygamus, seminibus hirsutis, umbellularum floretuli margi-  
nalibus pluribus masculis Gouan illustr. pag. 9.

Habitat in Europa australi

Caulis erectus vel ascendens pedalis stratus scaber proferens

superas, pter hirsus. Folia pinnata pauca in caule  
pinnis multifidis Inpartiti multifidis laciniis subulatis

superiorum minus divisi. Anvolucrum 6. 7. phyllum.

Folioli lineari subulata trifida laciniis sabula-  
ti reflexis. Anvolucelli foliola linearia lanceolata acumen-  
ta, una exteriora majora longitudine umbello. Radix scabri

Petala subequalia ante evolutionem purpurea. <sup>quasi albis</sup> Guttur

globosus pulis corosif semis longi purpurascensibus. Stylus

Styli longi divaricati purpurei



minutus *D* semini bus Triglochi aculeatis Lin. Sp. pl. pag. 349x

Caucalis monspeliata, echinato magno fœetu Bauh. pin. 153.

Echinophora altera asperior, platycarpus Col. Eiphr. 1. 95. 7. 94

Caucalis major daucoides Lingitana Monf. hist. 3. p. 300. / 9. 7. 14

fig. 4. Herm. parad. III. t. III.

Habitat in Europa australi et Barbaria

Caules ramosi pedales et ultra scapemini pilis albis  
rigidis patentibus tuberculo insidentibus uti et petioli  
folia et pedunculi et involucri. Solia bipinna  
ta pennis alternimultifidi laciniis linearibus acutis  
umbella oppositifolia et terminali interdum in  
solo natali prope radicem, radiata patens plana  
involucri trifida vel pinnato bipinno pennata linea  
linearis involucri trifida umbellula longior  
aculei seminum lanceolata attenuata opice  
purpurascenti petala radi <sup>tope</sup> purpurascencia

varietas B. adaleam plantam  
forte eadem cum Caulis platycarpus Lin. Suppl.

humilis. *Galis pinnatis* ~~foliis~~ foliolis incisim subtus pilosis, caule  
nudo

Habitat in Barbaria Neapoli

Caules plures palmari erexit simplicissimi striati striis  
fili. Folia radicalia bipollicana foliola pinnatum  
incisa lacini linearibus obtusi mucronati. Folia in  
volvum trifida involuelli tria externa umbellata  
longiora subulata. florea umbella subdividua gemma  
hista.



prostratus 2-folius pennatis multifidis lineantibus <sup>hirs</sup> caulebus filiformi-  
bus diffusis.

Legi in ~~Montania~~ agro madontensi

Caules filiformes filiformes palmares subsimplices ~~horat~~  
ad eandem partem raris adpressi. folia angusta breviter  
invenit vel obtusum in caule. involucri foliola infima  
involucelli umbellula breviora. semina parva lineis hirs  
di

an species distincta in Polygonum specimen pupillam  
semibus tamen differre videtur

Grand. flous. Dancus: folus Deconyotiki: folioli lineantur, umbellis late  
volibus folis breuibus: aculeis feminum peltato-stellatis Defens  
fl. Atl. pag 240 tab 59.

Habitat in Barbaria  
corolla radicans



*Chamaecrista* L. *ferruginea* (Sw.) Jacq., caule dichotomo ramo supremo, um-  
bello radii subtriflori Walt. **flor. Car.** p. 114  
Habitat in Carolina

non radi

alatus D. feminum anguli membranacei suprad. Pers. N. 2. p. 135  
Habitat in Babaria

nihil ignotus