

# Dianthus

## \* floribus aggregatis

1. barbatus D. floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis ovato-subulatis tubum  
aequantibus; foliis lanceolatis
  2. carthusianorum D. floribus subaggregatis; squamis calycinis ovatis angustatis tubum suba-  
quantibus; foliis trineris vici
  3. femineus D. floribus aggregatis, petalis bifidis & laciniis tridentatis
  4. armena D. floribus aggregatis fasciculatis; squamis calycinis lanceolatis villo-  
sis tubum aequantibus
  5. japonicus D. floribus aggregatis fasciculatis; squamis calycinis acutis cilia-  
tis tubo brevioribus
  6. prolifer D. floribus aggregatis caputatis; squamis calycinis ovatis obtusis mu-  
ltis tubo superantibus
- \* flores solitarii, plures in eodem caule
7. dimidiatus D. squamis calycinis octonis & florem superantibus
  8. caryophyllus D. squamis calycinis subovatis brevissimis covelis dentatis

9. pomeroi canus D. squamis calycinis cordatis brevissimis, corollis emarginatis sub  
integerrimis
10. deltoideus D. squamis calycinis lanceolatis, corollis crenulatis
11. superius D. ~~squamis calycinis obtusissimis, petalis crenatis~~
12. ~~glaucus D. floribus subsolitariis, squamis calycinis lanceolatis quaternis  
brevibus, corollis crenatis~~
13. chinensis D. squamis calycinis subulatis patulis tribus aequantibus, corol  
lis crenatis
14. monticola D. squamis calycinis subulatis longitudine tubi, corollis  
multifidis, caule erecto.
15. plumarius D. squamis calycinis subulatis brevissimis, corollis multifidis  
fauce pubescentibus
16. superbus D. floribus paniculatis, squamis calycinis brevibus acuminatis  
corollis multifidis capellanibus, caule erecto.
- † 17. arenarius D. cauleibus subuni-floris, squamis calycinis ovatis obtusis,  
petalis multifidis, foliis linearibus.  
+++ caule subuni-floris. herbae co
- †† 18. albens D. squamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, corollis  
emarginatis

19. alpinus D. corollis crenatis, squamis exterioribus tubum aequantibus,  
foliis lineariobtusis
20. virginicus D. caule subunifloro, corollis crenatis. squamis calycinis  
brevissimis, foliis subulatis  
XXXX fructiferus
21. arboreus D. caule fruticoso, foliis subulatis, petalis serratis
22. fruticosus D. foliis lanceolatis
23. pungens D. caule suffruticoso, foliis linearibus subulatis, petalis inte-  
gris
- 10-19 humilis D. acaulis foliis linearibus

Dianthus in Horto Antwerpensi cum sequente synonymo videlicet in herb. Royani  
Coryphillus tenuifolius plurimus, flor. pallide car. arnuto cum duobus  
corniculis - quamo duo subditunda.  
Lychas quo ozymoides nomen sine a. Urban. huzon. Tournef

ex Dianthi. Coryphillus laxatilis, eni & folius ramosus reperit Bauh.  
herb. Tournef  
Caulis cespitosus, diffusus, ascendens, basi nudo.

petraeus Dianthus

ex Hungaria

Pauli basi ramosi & minus <sup>spit</sup> ramis erecti: spithomaei filiformes; glabri uti  
tota planta. <sup>linearia</sup> folia frequentissima subulata 1-2 pollicaria angustissima  
patentia pedunculis terminalibus unifloris: bractae quatuor sub  
calyce ~~aeque~~ multo breviores ovatae, acuminatae exterioriores  
angustiores. Calyx viridi purpureo angustus. Corolla ~~dentata~~  
deltoidi parum major tota alba petali inaequaliter incisio  
media corolla longior

~~res. fructuum subreductum, acido amaro punctatum.~~

~~et terminales, vaginae longiores: pedicelli vaginae parum longior~~

~~praecedentibus. vaginae purpureae punctatae. pedicelli laterales~~

~~Pauli ramosi glabri. folia pollicaria viridi. glaucescentia, marginis~~

~~spithomaei in India orientali?~~

~~per unctae.~~

~~in rebus lateribus determinatis in rebus multo longioribus, cunctis~~

Scabra. Compositae foliis ovatis sessilibus pubes marginisque scabrae, vaginae ciliatis,

Benghalensis *C. corollae* inaequalibus, foliis ovatis obtusis caule repente  
L. S. V. pag. 111. Mur. in com. Gott. 1774. p. 10. t. 5  
*Ephemeron* Benghalense serpens, folio subrotundo brevi, phalan-  
gioides Pluken. alm. 130. t. 27. fig. 3.

Habitat in Benghala

Caules reptantes. Rhachi pilosuli. Folia petiolata basi ciliata  
subundulata obtusa sesquipedalana. Vagina laxa ungui-  
culares nervosa membranacea involucrium <sup>turbatum</sup> cordatum  
pedunculati longitudine involucri

———— petiolatis basi ciliatis

*Commelina cuculla* L.  
*Commelina nervosa* Burm.

Libanotis

Habitat in Libano dedit L. Willd.

Caulis erectus, teres pedalis, glaber. Folia pollicaria, basi in vaginam  
connata, lanceolata, subnervosa, recurva, subperungentia. Flores in  
ramis solitarii vel gemini. Squama calycina b. oblonga, ac-  
uminata, aeternum subulata, unguiculata, patente recurva, stri-  
ata, margine membranae natis, tubo dimidio brevior. Calyx tubulo-  
sus, striatus sesqui-pollicari: laciniis lanceolatis. Petala mult.  
fida: laciniis linearibus simplicibus

cephitofus - I caulebus uniflori corollis integris calycinis squamis  
quatuor lanceolatis; foliis trigonis Thunb. prodr. fl. - cap. p. 81  
Habitat in Cap. b. frei

non vid.



minor var. *D. flombus* solitarius squamis calycinis quaternis ovatis brevibus  
fimis, petalis integris. Humb. prod. fl. cap. pag. 11  
Habitat in Cap. p. p. p.

non vidi

Crenatus D. floribus solitariis, squamis calycinis <sup>senis</sup> ~~quaternis~~  
~~is~~ ~~beccafonii~~ canaliculatis, corollis crenatis Thunb. prodr  
fl. cap. poj. 01  
Habitat in Cap. b. pei

non vid.

abatu J. of *Combur aggregatis fasciculatis*, squamis calycinis ovato-subu-  
catis tubum squandibus, foliis lanceolatis. un. 1. v

Thyrso Rencal. p. 47.

*Panyphyllis Kotsenji barbatus latifolius* Bauh. pin 200.

β. Armenius flos alter God. pempt. 176.

*Panyphyllus barbatus Kotsenji angustifolius* Bauh. pin 209.

Habitat

4

Caulis erectus teres, sesquipedalis, glaber <sup>unigenis</sup> simplex. Folia sequoyol  
lea glabra ~~marginata~~ <sup>one-centis pinnatis</sup> margine scabra internodis lon-  
giora. Tubus calycis superne purpurascens. Squama in circum-  
ne longitudine tubi producta.

scabris ————— lanceolato-subulatis foliis margine  
squama calycino angustiore nec pallide ferruginea ut in Carthay

*Carthagenorum* D. floribus subaggregatis, squamis calycinis ovatis antra  
tis tubum subaequantibus, foliis trinerviis Lin. Spec. pl. p. 506.

*Caryophyllus sylvestris vulgaris* Catipoliis Bauh. pin. 209.

*Caryophyllus arvensis*, calyculo florum numeroso Loeff. p. 39. f. 17.

~~β. Caryophyllus sylvestris, florum tubo brevioribus de summo caule prodeunte~~

ad atrorubem sequ. ver. 434. t. 8. fig. 2.

tem  
alleonii  
pestinet.

Habitat in Germania, Italia, Sicilia floribus apertis &  
a barbato D. differt foliis dimidio angustioribus trinerviis  
nec unis nervis. Caule panis tubo, nec compresso. Petalis  
oppositis supra villosis nec glabris. Pistilli tubo longioribus  
Lin

tubo brevioribus

foliis lineari

concavatis margine lobatis

legi Parisii.

bas squama calycina latiore subsessum acumine  
brevior margine scariosi petalis dentatis.

atro rubens L. floribus aggregatis fasciculatis squamis ovatis acuminatis  
tubo brevioribus foliis caul petalis dentatis caule tetragono.

Caryophyllus sylvestris, flore rubro plurimo de summo caule  
prodeunte Segu. Veron. 434. Tab. I. fig. 2.

Dianthus florum aggregatis, squamis calycini ovatis  
angustatis tubo brevioribus, foliis connatis striatis All.  
fl. Ped. no 1545

Habitat Pedemonti in collinis &

similis catharticanorum <sup>at</sup> foliis angustioribus striatioribus  
caule angulato, calycibus interne coloratis  
Folia angustissima internodiis brevioribus

*Fernigenes* D. floribus aggregatis, petalis bifidis: Calicis tridentatis  
hen. mant. 563. + L. V. p. 417

*Caryophyllus montanus* umbellatus, foliis variis luteis fernigenis,  
italicus Barr. rar. c. 1497.

Habitat in Apenninis Italiae

*Comula* Caulis pedalis erectus simplex, glaberrimus: folia angusta  
*Carthagenorum* linearia 2-3 pollicaria internodis longiora: flores termi-  
nales <sup>subangulatus</sup> ~~cap. longiora~~ <sup>in</sup> squama ovata acuminata pallida commu-  
ner anfracta calycis breviori propria longitudine corollae

— squamis ovatis anfractis, propriae anfracti longitudine  
corollae

alud specimen ab Allionio <sup>fructu folisque viridi</sup> Caete subtetragono ceterum  
non diversum

Carolinianus Dactylis. pedunculis elongatis, squamis calycinis tubo dimidiatis  
Compositus. Walt. car. p. 140  
Habita in Carolina

non vidi

prope femur

Armenia. D. floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis acutis  
ciliatis & lanceolatis villosis tubum sequentibus. Lin. V. fl. Dan.  
tab. 230.

Armenia sylvestris altera Lobel. ic. 448.

Caryophyllus barbatus sylvestris Bauh. pin. 209.

Habitat in montibus Gothlandia, Germania, Gallia Italia <sup>Armenia</sup> O

Caules teres striati rami oppositi. folia angusta  
internodiis longiora flores tres vel ~~quatuor~~ plerumque in  
singulis pedunculo aggregati. squama attenuata  
perinata virides



japonicus D floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycis nudis  
du ciliatis tubo brevioribus Thunb. fl. jap. p. 103 t. 23 p. 417

Habitat in Japonia

Caules basi decumbens, dein erectus, teres lavi, glaber simpliciter, rami apice dimidio pedalis. Folia opposita petiolata, ovata, acuta, integra glabra nervia erecta pollicaria supra nerva minor. Petioli lati amplexicaules.

Flores terminalis fasciculati fasciculati. Calyx longitudine sub corolla, finatus glaber. Squama ovata acuminata carinata, calycis duplo brevioribus. Corolla crenata.  
Thunb. no

prolifer D. floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis obtu-  
si mucicis tubum superantibus. L. V. fl. Dan. 7. 221.

Caryophyllus sylvestris prolifer Bauh. pin. 209 Sequ. veron. l. p. 153.  
8. 7. fig. 1.

Habitat in Europa nascitur sterilibus O

Caulis subtetragonus tenuis ramulosus. folia angusta  
marginata  
squamae pallide ferrugineae. folia ope lentis marginibus  
serulata.

diminutus, ut nup. hujus varietas

Gramineae - Dianthus.

*Caryophyllus alpinus* - perianthium flore purpureo subtus lutescente

Habitat in alpebus. Caulis herb. Musc.

Caulis palmarum, caespitof.

lanceolatus Lanthus

Herb. Royeni

Caulis basi ramosissimus

cancel

*Scanthus*

*Caryophylli* flores sylvestres Camerar. epid.

*Caryophyllus* sylvestris calidarum regionum Tournef. Inst. v. h.

Habitat herb. mur.

Caulis suffruticosus; basi ramosus: rami sparsi, flexuosi, ascendentes, pedales, teretes, viscosi.

Scabriusculi, villosi, subramosi. Folia inferiora congesta, linearis-lanceolata, rigida  
fornata, nervosa, ut pollicaria: caulina erecta, superiora internodiis breviora  
Pedunculi terminales, interdum unicus, inferius tres vel quatuor

*Dianthus*

*Paryophyllus omnium minimus et humillimus* Morf. Blesf.

Habitat herb. mufsi

Caules caespitosi - Scapi pollicares

Cespitosus Dianthus

Habitat herb. mef.  
Caulis digitalis, cespitosus.

habes



*Campophyllis græca sanatilis*

Habitat in Græcia herb. Tournef.

Caulis basi ramis plentibus

Labeo

*Caryophyllus orientalis*, minimus, tenuissime laciniatus, flore purpureo

Tournef. Cor. pag 23.

B. <sup>con. gkbo. ib.</sup>

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Caulis plures, spithamo:

habes

serratus Dianthus

Desfont. fl. atl.

Habitat

herb. Desfont.

Caulis herbaceus, erectus, sesquipedalis, tenes, ramosus, uti tota planta glaber.  
Folia bipollicaria, lanceolata, attenuata, margine scabra, ope lentis serrulata.  
Squamae quatuor, lanceolatae, attenuatae, calyce breviores. Flores terminales, solitarii. Petala multifida.

*Hyssopus folius Deanthus*

Habitat in Syria herb. Desfont.

Caulis pedalis, suffruticosus, ramosus: rami simpliciter, teretes, glabri. Folio semi  
pollicaria, et ultra, nigridi sicula, glabra, leucani-lanceolata. Flores terminales  
solitarii. Squamae 6, calycis breviores, oblongae, mucronatae. Petala in 4

pallidiflorus Dianthus squamisi calycinis quaternis oblongis aristatis brevibus, petalis linea  
ni cuneatis dentatis

Habitat in Syria herb. Mus.

glaber. Caulis angulatus, ramosissimus. Folia lineari-lanceolata, bipollicaria, superiora  
angustiora et breviora, serrulata, cernua. Flores ex apice, plerumque solitarii,  
raro gemini, pallidi

*Juniperus* *Dianthus*.

*Caryophyllus creticus arboreus*, *juniperifolus* Fournet. Cor.

Habitat in Creta herb. Mus.

Caulis *pyramidalis*, ramis *semi flexuosis*. Rami *prostrati*, *flexuosi*.

*Dianthus*

Habitat in monte ventoso Lesb. Gusf.

Planta caespitosa, facie Silen. caerulei. Folia linear-lanceolata, rigidiuscula,  
glabra. Caulis pollicaris, uniflorus. Bractea quatuor sub calyce, brevis, mucro  
nata.

ex varietate *D. arenans* ad eadem ac *caerulei* Gussf.

simi videtur Deanthus foliatus: squamis calycinis et tunc flores superantibus.

Lin. spec. pl. p. 587 + L. V. pag. 40

+ Charyophyllo sylvestris quarto, alia specie Thal.

Charyophyllo prolifero affinis, unico q. ex quolibet capitulo flore Bauh. Pin. 209

+ Charyophyllus sylvestris minimus Tabernem. hist. 290

Habitat in Germania & Cahira Forsk. &c.

Nota D. proliferi, eique nimis affinis an pro specie agnoscenda? Folia angustiora,  
& Caulis ramosus. Flores terminalis simplices nec aggregati. Calyx paribus  
4. squamam, quam interior per gradus majores obtusior. Corolla  
transverso, vix extra tubum prominens, ad eoque fructificatione D. proliferi,  
sed non aggregata, verum simplex Lin. spec. l. c.

varietas proliferi potius



*Paryophyllum* D. floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevi  
fimis, corollis crenatis Lin. L. V.

varia a *Paryophyllum hortenii* simplex flore majore Bauh. pin. 200

b - *Paryophyllum aetidis* major Bauh. pin. 207.

γ. *Paryophyllum maximum* ruber et variegatus Bauh. pin. 209

tribus a *Paryophyllum frumenta* referens Eph. N. O. cent. 3. p. 360.  
Tab. 9.

inodorus E. *Paryophyllum sylvestri* biflorum Bauh. prodr. 104. pin. 209

*Paryophyllum sylvestri*, flore rubro inodoro, calyce oblongo cum  
brevibus unguibus Segu. Ver. 435. v. 7. fig. 3.

Habitat in Italia et alpebus Helvetiae 4

Caules plures pedales teretes (in montana subangulati)  
glabri simpliciter. folia angusta inter nodos breviora  
sesqui pollicaria - squamae 4 parum cuneatae

subthombei  
in herbis Smith in L. Transact. 2. p. 299

promendianus Diarrh. floribus solitariis: squamis calycinis bene cordatis brevissimis, corollis  
emarginatis subinde geminis. Lin. Spec. pl. p. 1673. \* L.V. pag. 410  
Caryophyllus sylvestris et saxatilis, flore magno lacteo, subtus ad gradicum  
vergente Tournef. Corol. 23.

Habitat Constantinopoli, in Palæstina & Lib. Vall. 228 4us.  
Herba simillima S. Caryophyllo. Radix vix se multiplicans. Caulis ramis tribus  
quatuorve simplicibus, longis, unifloris. Calycis squama tantum duo, bre-  
via acuta, non acuminata. Corolla lutea, subtus virescente-albida. Peta-  
la lateribus revoluta, hinc convexa nec dilatata, sed dilatata, calycis  
tubo breviora, obtusissima, parum emarginata, linea exarata. Stami-  
na <sup>con-</sup> longitudine calycis, alba. Pistilla demum excreverunt in longitudinem  
corollæ. Flores aperitur hora diei 12<sup>ma</sup> cum demum, claudatur nocte  
hora decima lin. Spec. l. c.

Caulis suffruticosus, basi ramosus: rami ascendente, compacti, frequentes  
sparsi uniflori: folia inferiora approximata, cæulem turgentia

— ovatis acutis tubo  
Smith in Lin. Trans: 2. P. 300

calycis apice striato —

*Deltoides* D. floribus solitariis, squamis calycinis lanceolatis, corollis  
Erenatis Lin. S. V. fl. Dan. tab. 577.

*Caryophyllus simplex* *supinus* *latifolius* Bauh. pin. 208.

*Betonica coronaria* f. *Caryophyllus minor*, folio videri neglican  
de reperit Bauh. herb. 3. p. 329.

Habitat in Europa pratis & <sup>superne ramos</sup> usque altero  
ve unifloro  
Caulis ascendens digitalis vel ultra folia ad basin et  
in cauliculis peribasi confertiora linearia unguiculata  
opae lentis margine ciliata. caulina internodiis breviorum  
flores parvi

glaucescit nisi colore florum differt et squamis plerumque  
fontum gemini

fl. Angl. tab 62

— ovato — acutis subgeminis, foliis  
obtusiusculis subnubiscentibus, petalis crenatis l. m. & c.

glaucescens & floribus subsolitariis, squamis calycinis lanceolatis quaternis  
brevibus, corollis emarginatis Lin. S. V.

Tunica ramosior, flore candido cum corolla purpurea Willd. Elth.

400. 1. 290. fig. 384.

Habitat in Anglia 7

varietas Duxth Deltoidis Jacq. Smith

Chinensis D. floribus solitariis, squamis calycinis subulatis patulis tubum  
subquantibus, corollis crenatis Hort. Ups. 1044

Caryophyllus chinensis superius, leucogi folio, flore unico Tournef.  
act. 1705. p. 264. fig. 5. Mill. ic. 81. fig. 2.

Habitat in China O

Caulis teres glaber folia utrinque angustata inter nodos  
longiora nervis margine lobatis. Squamae 4-6 margine  
membranaceo uti lacinis calycis orculo armato subulato

tes Smith l. c.

patulis foliaceis subquantibus foliis lanicola

monspeleaeus D. floribus solitariis, squamis calycinis subulatis longitudine  
tubi, corollis multifidis, caule erecto. Lin. Am. acad. 4. p. 313.  
Habitat mospelii, Verone &  
caulis ascendens glaber teris. Folia angustissima bipollicia  
na interradia longiora margine sicbrunfula. Squama  
quatuor striata. Ductus superne angustatus.

beronibus etc:

— rectis subpanem

plumarius D. floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis,  
Corollis multifidis, faucibus pubescentibus.

Caryophyllus sylvestris, flore laciniato sine corniculis. Odore Bauh.  
p. 210.

Caryophyllus sylvestris, fl. v. species alia Pluf. hist. 1. p. 202.

Dianthus floribus solitariis, petalis multifidis basi canaliculatis  
Hort. Upf. 105.

Habitat in Europa et Canada paucis nemorosis.

Caulis spithameus et ultra, glaber super ne ramo uno altero  
florifero. Folia lineari lanceolata glabra, margine ope  
latis serrulata. Squama 4. lata ovata purpureo glandespen  
tia mucronata brevis. Flores magnitudine Caryophylli

mucronatis  
mucronatis

foliis  
corollis multifidis latis. margine serratis

- obtusifloris

*Erinthus* *D.* floribus solitariis, squamis calycinis ovalibus mucronatis  
subwegentibus tubo triplo brevioribus, petalis multifidis imbricatis.  
Smith in Act. Soc. Lin. 2. p. 300

*Caryophyllus* orientalis, minimus, tenuissime laciniatus,  
flore purpureo Tournef. Cor. 23.

Habitat in armeria

Caules prothamoi Loria. Folia linearia angustissima, brevissi-  
ma obtusifida Loria. Flores 2-4 in caule, erecti.

Calyx tubo gracili forato, dentibus lanceolatis rectis acutis  
squamis ad basin 4. ex parte ovalibus, dorso forati mucrone bre-  
vi patente. Petala angusta limbo ad basin usque irregulantes  
multifido capillares imbricati Smith.

non vidi



*Supercus* D. floribus paniculatis, squamis calycinis brevibus acuminatis,  
Corollis multifido capellanibus, caule erecto Am. ac: 4. p. 272 & Gaerq.  
obf. 40. t. 25. fl. Dan. tab. 578.

*Caryophyllus sylvestris* VI. Clus. hist. 1. p. 204.

*Caryophyllus simplex* alter, flore laciniato odoratisimo Bauh.  
p. 210.

Habitat in Gallia, Germania, Dania, Nemi &

Folia angusta internodis longiora. Calyces purpurei  
seu attenuati. Squama 4 orata acuminata

non foliorum etc:

Pump. syn.

Imita C. C.

attenuatus L. floribus solitariis, squamis calycinis brevibus lanceola  
di acuminatis sessilibus. tubo apice attenuato, peltis crenatis (M  
Pur tropic Cor. 2. 11. 3. 51.  
Caryophyllus sylvestris repens multifidus Bauh. prod. 2.

Habitat in montibus galles meridionalis

Caules diffusi basi lignosi, tortuosi, ramosissimi; rami floriferi  
asciendentes, pedales, foliosi, teretes, glabri, apice in ramulis  
folia in cau 2. 3 divisi, uniflori. Folia subulata, mucronato-pungentia  
luculis frontibus  
confertis trifloris  
Semi palliana  
glauca margine siabra: caulina internodii brevia. Flori  
carnei nodori. Calyx squamis cad basi, quarum interno  
ri margine saepe membranaceo tubo striato apice amplexu  
laxum attenuato, dentibus erectis margine membranaceo. Corolla  
narva crenata imbedis (Mitt)

purpureo D. Caule suffruticoso, foliis linearibus subulatis, petalis integris  
Ler. Mant. 240. & S. V. p. 419.

Habitat in Hispania maritima &

Caule suffruticoso alternatim dense ramosi. Folia caulina basi  
connata - vaginatis conferta, vaginis ramulorum tegentia  
rima leviter connata vaginis distantibus omnia linea  
nisi planiuscula subpergentia. Pedunculi ex axillis  
ramulorum lateralium. pedicelli 1-3 floris lili

michi ignotus

floribus solitariis, caulibus paucifloris, squamis calycinis basi  
limbo mucronatis. pat. extibus tubo gibbo, petalis integris, m. m.

virgineus D. Caule subuni-floro, collis crenatis, squamis calycinis brevis  
simis, foliis subulatis Lin. spec. pl. p. 590. & aequ. fl. austr. s. app. 15.  
~~refertur Ranunculus sylvestris repens multiflorus Bauh pin. 104. 1~~

~~15 Tunicia rupestris, foliis copio molli floris carneo Dill. 214.  
401. 7. 290. fig. 305.~~

Habitat Montpelii & Aragonia &

Radix multiceps folia <sup>radicalia.</sup> plurima dense aggregata in caespitem  
subulata rigidiuscula perquiculata ore latis margine  
ciliato serrulata, caulina remotissime articulis 3 plo brevior  
bus. Caules plures spithamei 3-4 nodis erecti plerumque uni  
flori interdum & vel 2 ex alio superioribus squamo 4 or  
tus inferiores petala angusta

Dianthus rupestris Lin. suppl. p. 240.

Synonymum Dillenii ad *Cosium* pertinet

Stonici solitarius, caulibus paucifloris, squamis calycinis  
brevissimis obtusissimis brevibus, petalis crenatis. mixta  
~~synonymum Bauh forte ad attenuatum pertinet.~~

Albens Dianthus floribus solitariis. squamis calycinis lanceolatis quaternis  
brevibus, corollis emarginatis Hort. Kew. 2. p. 90\*

Habitat in Cap. bono spei 4

Petala supra alba, subtus e viridi albentia, apice utroque violacea. Dif-  
ferentia D. glauci, petalis vix crenatis. Et absentia circuli perispermici Hort. Kew.  
Caules plures basi lignosi erecti spithamei uniflori simplicis.  
Semi pubes quadrinodia folia angusta lineana internodiis bre-  
viora

in Dianthus siaber Herb. prodr. fl. cap. v. 9. p. 9.

moschatus. D. squamis orato - obtusis, corollis profunde multifidis, foliis  
filiformibus subulatis ~~in~~ Mayr boehm. atk. 1707 p. 3120

non plus quam non vidi

glacialis D. floribus subaequalibus, squamis calycinis elongatis acuminatis  
+i tubum superantibus, foliis linearibus floribus peperantibus  
bus Haent. Jacq. coll. 2. p. 84

non vid.

*Sylvestris* L. caulis herbaceo, squamis calycis subovatis  
brevifloris, corollis crenatis, foliis rigidis subulatis  
supra pilicatis Wulfer. Faey. coll. 1. p. 237.

non ed.



hispanicus caulebus unifloris, squamis calycibus ovatis acutis, petalis  
lineantibus

Dianthus hispanicus caule subunifloro squamis calycibus  
ovatis, petalis lineantibus endogenis cas. fl. Anag. n. 371. t. 63.

Habitat in Aragonia 4

Caules plures erecti simplicissimi perthamoi flore solo  
unico terminati. Folia ad radicem aggregata subula  
in margine scabriuscula unguiculata caulina inferiori  
longiora superiora minus internodiis breviora.  
Squamae ovatae aequales acumine brevi terminatae

alpinus D. Caule unifloro, corollis crenatis, squamis calycinis extenori-  
bus subum aequantibus, foliis linearibus obtusis in spec. pl. p. 5904  
Gaerq. fl. austr. 1. 7. 52.

Caryophyllus sylvestris 2. Clus. herb. 1. p. 283. fig. 1.

Caryophyllus pumilus latifolius Bauh. prod. 104. pin. 209.

Caryophyllus sylvestris, flore magno inodoro refuto. Bauh. pin.  
209.

Habitat in Sina, Austria 4

Planta longitudine digiti intermedii et ultra. Caulis simplicis pum-  
erecti tri-nodes. Folia lineari lanceolata. In floribus racemales  
plurimae solitaneae rarius unacum inferior squama 4. Duo  
exteriori lanceolata attenuata, interiori oblonga acuminata  
Calycis glauci purpurascens

subum subaequantibus imita  
variat foliis obtusis et acutis latioribus et angustioribus.

repentes 2. floribus solitariis, squamis calycinis obtusisimis bene, pe  
talis crenatis Lin. Suppl. p. 240. & V. p. 410.

~~Campophyllis primus~~ Clus. hist. 1. p. 202 <sup>figura</sup> pedunculata ad apicem <sup>etiam</sup>  
Habitat in Alpibus Europa australis & Clusii est eadem in cui flor  
Armeniae 3. us  
Oedt Desfont

eadem ac virginicus Jacq. In Smith.

Dianthus

1849  
19.20

rumicis

Dianthus acaulis, foliis linearibus, squamis lanceolatis sub brevioribus petala

Dianthus uniflorus; capro brevissimo, unifloro; foliis linearibus toph. Cat. pl. arab. pag. 111.

nr. 284

Planta caespitosa

Folia ad terram congesta, linearia, acuta, glabra, semipollitana ope lentis femula

capus subnullus. Coro sessili solitarii

Calyx longitudine foliorum, glaber, striatus, squamis 6. oblongis, acuminatis  
subo. exterioribus minoribus

Petala dentata

Cofus

*D. caulebus puberifloris*, squarais calycinis subrotundis brevibus  
petalis crenatis pubescentibus, folus margine siabris Smith. Act.  
f. lin. 2. p. 302.

Armeno speciei flore in summo caule singulari Ray Synop.

336.

*Tunica rupestris* folio cofis molli, flore carnes Bell. H.

Elth. 401. 8. 290. fy. 305.

*Dianthus glaucus* Hud. fl. Angl. 105

Habitat in Anglia Helvetia

Radix lignosa. Caulis plures pithamos erecti sim

Virgineus fl  
lin.

plici glabri, anguli, conjugationibus foliorum duobus  
vel tribus; uniflori, vix unquam biflori. Folia lineari-lan  
ceolata, obtusiusculo, glaucis, margine siabra. Calycis squamo  
tubo triplo brevioris, ovato-subrotundo, obtuse mucronato,  
sinuato. Petala carnea, obtuse duplicato-crenata, basi  
lineata atque barbata Smith

~~non vidi~~

*Lonicera* D. caule fruticoso, foliis lanceolatis Lin. S. V

*Caryophyllus* græcæ arboreus, Leucioji folio peramaro Tournef. cor.  
23. itin. 1. p. 103. & 103.

Habitat in græciâ

Caulis e capite foliorum <sup>basin ferrus angustato</sup> rugosus ramis tortuosus. Rami erecti. Folia  
lanceolata obtusa <sup>frequenter</sup> serrulata integerrima glabra  
venâ nervâ <sup>crassa</sup>. Globis superne plures congesti squamæ  
C. D. imbricatis ovatis acuminatis apice cernatis tubo calycis  
brevioribus

varietas arboris sci. An Smuta vix credo

boreus. Dianth. caule fruticoso, foliis subulatis, petalis serratis Linn. t. V. p. 410

Caryophyllus arboreus sylvestris Alp. Exot. 39. t. 38.

Caryophyllus arboreus creticus Bauh. Prodr. 104. Pin. 208.

Betonica coronaria arborea cretica Bauh. hist. 3. p. 320.

Habitat in Creta herb. Aus. vadit huj.

Caule erecto, rami varie flexi glabri teretes semipedales, apice in ramos  
bichotomos floriferos divisi. Folia sempolluciana, subulata, rigidiuscula  
inferiora approximata, superiora distantia, internodiis breviora. Pedunculi  
bifidi, biflori, alter interdum vel uniflorus vel triflorus. Squamae ad basin  
calycis 2, una externa linearis oblonga, reliqua obovata, omnes aristatae, calycis  
breviores

Betonica coronaria arborea cretica Bauh. hist. 3. p. 320. fig. 2.

Dianthum fruticosum varietatem hujus facit & Smitz plammado  
diversus foliis brevioribus calatibus et obtusis

— caule fruticoso, foliis oblongis subcarinatis, squamis caly-  
cini numerosis obtusis ante imbricatis brevissimis Smitz

arenarius L. Caulebus sub unifloris, squamis calycinis ovatis obtusis,  
petalis multifidis, foliis lineariibus. Lin. Sp. Pl. p. 5094 fl. Vei  
n. 3847

~~Armenius flos. Linn. Sp. Pl. p. 5094 fl. Vei~~

Dianthus arenarius

Del. 4. 445

Caryophyllus sylvestris

Plin. 1. p. 180

herb. Progn.

Synonymum Oley

et Bauh. male

hinc a Lin.

comendantur

herb. Vahl

Caryophyllus sylvestris L. Clus. hist. 1. p. 202.

Caryophyllus sylvestris humilis, flore unico Bauh. pin. 402.

Habitat in Europa frigida in arena mobili.

Dolci radice in apertis collecta angusta unguiculari maji  
ne semulata ciliata, caulina parum longior et latior. Caulis  
in arnodis brevior. Caulis plures erecti <sup>superne</sup> ~~superne~~  
flor. 1-2. Squama calycis 4. obtusa absque <sup>mucrone brevissimo</sup> mucrone. Caly-  
cis tubulosi superne attenuato.

Dianthus ad Bayonam Leyi ab arenario forte non diversus  
radix superne divisa in ramos plures totos lignosi tenues  
steriles foliis confertissimis lineariibus lanceolatis angustis paten-  
tibus  
armenius flos virtuti plantam nostram optime representat ad  
virginicum refert Dr. Smith sed non minime illius spectat  
Synonymum Bauh Dubium plane fere persuasus sum



Juniperus L. caule fruticoso foliis subulatis squamis calycinis  
subquaternis obovatis mucronato-pungentibus petalibus tubo  
duplo brevioribus Smith. Act. f. h. 2. p. 303

Caryophyllus sylvestris arborum alpina. Exot. 39. t. 38?

Caryophyllus ceticus arborum juniperifolius Tournef. Cor.

27.  
Habitat in Creta

Caulis fruticosus, cortice nudo, laevio, ramis spinis, ramuli  
apice dense foliosi; floriferi elongati, cum oppositifloribus  
2-3 tubum foliorum, inter nodos multo brevioribus, teretes  
glabri. Folia subulata, angustissima mucronato pungentibus  
canaliculata, margine laevi. Flores bini vel terni in  
apicibus ramulorum pedicellati parvi. Calycis squamae  
obovatae, obtusae, ut si natae, margine apiceque membra-  
naeae, mucrone pungente divaricato brevi terminata  
tubo duplo brevior; tubus si natus dentibus acutis,  
margine haud membranaceo. Petala crenata et alia  
Styli exserti capillares Smith non vidi