

Dichondra

Capf. 2. monopetalo. Cor. rotata 5-partita

1. *benica* D. foliis reniformibus integerrimis subtus serratis
2. *repens* D. foliis reniformibus crenatis villosi utrinque cœni coloribus

Poiratia Gmelin Syst. veg. hinc pertinet
repens est insula Bonario, ex herb. Mus.

repens Desf. Deccan

carolinensis Richardia

Habitat in Carolina. Richard

habeo

repens. S. foliis reniformibus crenatis utraque concinobus.

Dichondra repens Toff. prodr. pag. 21 nov. gen.

Habitat in nova Zelandia

Similis strobilacea pilis ~~setis~~ villosa: minime vero
nitida: calyx et aicuti nec obtusi.

Hydrolea

Zeylanica ~~caule erecto glabro, foliis linearibus, floribus racemosis~~
Alpine veronica affinis, gracile foliis, maderaprotana Planch

atton 22. 8. 130. fig. 2.

nana Lin fl. Zeyl. 117. 4. 2.

Nama zeylanica ~~caule erecto glabro, foliis linearibus, floribus~~
racemosis Lin. t. V.

Senecio Dichondra foliis subterrenis Senecii Sw. prod r. 54

Habitata Jamaica ☉

Caules repens filiformis ramosus ad lentem Venustus vellosus
pilosa. Folia petiolata semiconvoluta cordato-subrotun-
da integerrima supra glabra. Petioli longitudine foliorum
subterrenis. Pedunculi axillares, folio parvis longioribus
uniflori. Corolla calycina oblonga exserta, obtusa

evolvulaea Sibthorpii foliis uniformibus integerrimis. Lin. Suppl. pag. 2804

L. V. pag. 572. Smith. ii: 1. p. 8. Tab. 18

Habitat in nova granada

Planta facie minoris convolvuli caules herbaei prostrati
repentes, teretes. folia alterna petiolata reniformi

miu ~~integerrimis~~ emarginata subtus ~~lanata~~ ^{sericea}

Petiole ^{sericeo} folio longiore. Flores axillares Lin.

Peduncululi sericei, folia radiato venosa. Flores subtus
tantes

evolvulaea D. foliis reniformibus integerrimis subtus sericeis

Dichondra sericea Sw. via differt, quod tamen a Sweetia
aspiratur sed quomodo ~~si~~ ^{si} differt. Postea diversa est
et forte a ~~misitako~~ ^{misitako} ad ~~evolvulaeam~~ ^{evolvulaeam} relata
Dichondra ~~evolvulaea~~ est adeoque in pentandria quorunda