

116. *Dichromena* Squamae  
Glucae undique imbricatae. Cor. 0. Styl. 2-fidus.  
Sem. subarticulari, transversim undulato-rugosum <sup>ultrason</sup>  
 acum obtuse acuminatum, Setae nullae

*Synonyma*  
 Illi.

Si recte meminero, Caractere speciali *Dichromena* *Rynchoporis* in pluribus convenit, anne ergo  
 rectius illis immediata postponenda est? Th.  
 Vaginae integrae, <sup>iniguales</sup> ~~capitulum~~ terminale involucri multo ~~obis~~ brevior - spica  
 lae oblongae squamulae ovato-lanceolatae

~~Stellatus~~  
Leuciocephala  
leuciocephala

1 Dichromena glabra, involucri basi utriusque coloratis.

Gramen cyperoides spica compacta alba, foliis ad spicam partim albis,  
partim viridibus Sloan cat. 36. hist. 1. p. 119. t. 70. f. 1.

Schoenus stellatus; culmo triquetro basi foliis, capitulo glomerato  
parvo, involucri colorato stellato colorato pentaphyllo Lamarck  
Det. 1. p. 741. Illustr. 1. p. 136.

Schoenus stellatus; culmo subtriquestro; spiculis conglomeratis,  
involucri stellato colorato pentaphyllo foliaceo, basi colorato  
Swartz. prodr. 19. fl. ind. occid. 1. p. 102.

Dichromena leuciocephala; erecta, glabella: involucri inferne ca-  
pituloque candidis Michx. fl. bor. amer. 1. p. 37.

Habitat in Caribaeis von Rohr, in Carolina Bosc.

Tota glabra. Culmus saepe pedalis vel parum ultra, apice obtuse <sup>vel acute angulatus</sup> ~~trigona~~. Folia  
culmo interdum longiora, interdum breviora, ~~linea~~ <sup>superne</sup> ~~apice margini~~  
ne strabiuncula. Involucri foliola quinque ~~sex~~; longius quadri-quin-  
que pollicaria, lineare, attenuatum. Spiculae ~~niveae & squamulae~~ <sup>niveae & squamulae</sup>  
~~lanuginosae~~. ~~Habitat in~~ <sup>Caribaeis</sup>

Semen subrotundum, compressiusculum, magnum Swartz L. C.



*Corymbus*. C. culmo triquetro capitulo glomerato globofo, involucrio  
diphyllis glumis obtusis Thunb. prod. fl. cap. pag. 10  
*Cyperus Corymbatus*, culmo triquetro nudo, capitulo diphyllis.  
floribus Corymbatis Lin. mant. pag. 174 Rothb. gran. pag. 19. tab  
16. fig. 1

Habitat in cap. 6. spec.

Similis *Cypero* mucronato facie et speculis diversis culmo  
triquetro sesquipedali, involucrio diphyllis speculis plani-  
bus t. 30.

Neumann. alm. 175. tab 300. fig 7. pl. 5

delabata  
pubosa

2.

Dichromena pilosa, involucri supra basi coloratis

Gramen gracile, species Magr. hist. fide herbarii Manegrandii  
Habitat in Caribaeis West. America meridionali Richard, Weste Porto  
rico. sel obtuse triquetra

9.241.

Caumi pedales vel ultra, filiformes, apice acute triquetra trigona  
pubesi, interdum glabri excepto apice. Folia culmo breviora, can-  
nata, marginibus hirsutissima, aeate glabiora: vaginae hirsutissimae  
Spiculae in involucri basi extus marginis que pubosa hexaphylla, supra  
albidae. Semen transversum tenuiter undulatum, basi purpureo  
acumine nigro.

# basin versus  
albido-flavo  
ceno

Michelleanus f. Culmo Inguetro, capitulo globoso, involuero polyphylo longo  
Len. f. V

Pyrrenis italica omnium minimus Tell. ref. 51. 8. 20. fig. 5

Habitata in Italia raris comminuat in Bellardi

Radices longi  
filiiformes

Culmi digitales plerumque globosi basi foliosi. Folia lineari  
culmo altiora canaliculata Inguetra, glabra, mar  
gine laeva Capitulum vermicale ovatum magnitudine  
pisi squamis lanceolatis attenuatis - involuorum penta  
phyllum folioli culmo altioribus patentibus Inguetra  
culmi fa. lobis Globos.

ovato, involuero pentaphyllo elongato  
lobis carinatis laevi

Pyrrenis pygmaea et dubia Rothbolli omnino afferunt

pubera 44

Dichromena foliis involucrique undique concoloribus ciliatis, & piculis  
pubescentibus

Habitat in America meridionali Pichard, in insula Trinitatis v. Rohr.

Pulmi plures, & pertha males vel semipedales, & etacei, interdum pauci

Crassiores, obtusè angulati. Folia altitudinis pulmi vel breuiora, plana.

Sagittae glabrae. Involucrum Tri- <sup>Conjugi bipartita</sup> tetraphyllum. Piculae Tres quae in singulis  
capitulo: Squamae pubescentes, ciliatae, albidae purpureo punctatae

Semen transversim profunde undulato striatum.





multicaulis <sup>ovata</sup> S. culmo tereti basi vaginato, spica subserali terminali, glumis obtu-  
palestris  
ris aequalibus, radice fibrosa Smith. Bot. pag 40.  
Scirpus multicaulis equiseti capitulis minoribus Rel. Rudb. 28. fig. 2.  
Scirpus palestris Lin. fl. Lapp. pag. 16. no. 19. p. 3.  
Scirpus equiseti capitulis crassis et haederatis, pumilus et mul-  
ticaulis Rupp. Fl. jen. 319.  
Habitat in paludibus sursis Lapponia, Germania, Anglia &c.  
Culmi numerosi, caespitosi, basi patentes, spithamei, teretes, glabri, basi pro-  
ximè striati, ante seorsum vaginati, vagini cylindrici, truncati, suba-  
cuminati, basi duplicati, squamis nullis interstinctis. Sola nulla.  
Spica ovata vel elliptica, demigraea, multiflora, nuda. Squama imbrica-  
ta, ovata, adnata purpurea vel fusca, apice scariosa, carina obsolete, viti-  
di. Smith. l. c.  
Dorsulorum unus vel alter, ad basin spicae, saepe vivipari, et Stovaria  
tuo exadit Smith

confer cum fig. fl. Dan. tab. 167. et Scirpo intermedio Thuellæ

Character naturalis.

- lanceolatae

<sup>ulo</sup>  
 Antherae Spica undique imbricata: squamis ovato-oblongis, concavis, flosculis  
 linearibus distinctibus. Corolla nulla. Stamina filamenta tria, rarisime  
 unicum, semina elongata. <sup>compressis</sup> Peristillum germen nudum. Stylus capillaris  
 elongatus, basi dilatatus, stigmata duo, capillaria, longitudine styli  
pericarpium nullum. Semen unicum <sup>nudum</sup> plentius transversim  
 + acuminato-undulato-striatum, apice basi styli persistente acuminatum. Setae  
 + obtuso-nullae.

Habitus. Radix rhizomae, apice trigoni, striati inferne vaginis foliorum  
 + pluribus, tecti. Folia plura, linearia: vaginae integrae, uti folia subtilissimi  
me striatae. in folium de involucrum patentissimum: foliola striata  
tura foliorum, unicum capitulo brevius, reliqua sen sim longiora. Spiculae  
oblongae in capitulo sessiles, oblongae: squamae membranaceae  
ae hyalinae, subaristatae, acutae, albidae.

Character naturalis

Cal. Spica undique imbricata: squamis ovato-lanceolatis, concavis  
flores distinctibus  
Cor. nulla

Stam. Filamenta tria, raris & una unicum, demum elongata. Antherae lineares

Pist. germen minutum. Stylus capillaris, elongatus, basi dilatatus & compressus. Stigmata duo, capillaria longitudine styli

Per. nullum  
sem. unicum, sublenticulare, transversim undulato-striatum, rugulosum apice & basi styli persistente acuminatum; acumine obtuso. Setae nullae.

Character notulis  
Spermae praesens & coarctatus, conglobatus. ~~Ger. lineares~~