

Septalis ferruginea B. Digitalis  
Lupiflor - La Mark

1. purpurea D. folioli calycinis <sup>oblongis</sup> ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro, foliis ellipticis rugosis serratis
2. minor D. <sup>folioli calycinis lanceolatis</sup> corollis obtusis: labio superiore <sup>sebbiloto</sup>, foliis lanceolatis lobatis <sup>sebbilatis</sup>
3. thapsi D. <sup>folioli calycinis ovatis</sup> foliis lato lanceolatis serratis subtomentosis <sup>ferrugineis</sup> decurrentibus
5. <sup>leud ea</sup> D. folioli calycinis lanceolatis, corollis acutis, labio superiore bifido, foliis lato lanceolatis lobatis
6. ferruginea D. folioli calycinis ovatis obtusis patentibus, corollis labio inferiore barbato.
4. ambigua folioli calycinis lanceolatis villosis <sup>viscosis</sup>, corollis galea emarginata, foliis subtus pubescentibus.
6. obscura D. foliis linear-lanceolatis integerrimis attenuatis, corolla labio barbato
7. canariensis D. folioli calycinis lanceolatis, corolla labio superiore bifido, inferiore tripartito laciniis lanceolatis acutis, caule pubescente

*S. septem* *S. folioli calycinis subulato, bracteis linearibus flombus longioribus, corollis obtusis, foliis ellipticis serratis, caule fruticoso*



*D. cubajensis* Benth.

*D. cochinchinensis* } Lourson  
*sinensis*

Fernandezia

Digitalis calycini folioli evati obtusi patentibus, corollae labio infe-  
nore barbato *Len. S. V. pag. 562.*  
*e costa folii decurrente.*

Caulis erectus simplicissimus, sesquipedalis, (angulatus), pubescentibus,  
inferne glaber, *superne villosus.*

Folia *linearibus lanceolata* *inferiora basi parum attenuata, nervosa, venosa, an-*  
gustata, nervi subter et margine villosa, integerrima vel  
de tubiculo uno vel altero obfusa, univulvis lanatis

Racemus *terminalis* *paniculatus* *et locis minoribus quana in reli-*  
quis, *corpore sine appendicibus, foliis fernandezii*

Bractea lanceolata, attenuata, margine villosa, longitudi-  
ne corollae

Calycis *foliola* rotundato-oblonga, glabra, margine membra-  
naceo villosa.

Corolla pubescentes marginibus labiorum villosissimi

~~Concedendum tamen, respicit in variis de qua descriptionem  
ferte cultura multum, cum *descriptio* *hinc* *est* *plantae* *cultae*  
*temperamentum secundum plurima specimina in monte Montezayo*  
*si latius ad jungere haud abs re fore iudicari.*  
corolla in figura *Burbaemii* quadruplo majores  
diff.~~



*Asplenium ceylanicum* Paeyg. coll. 3. pag. 168  
*Borago ceylanica* ————— 169  
*Passiflora ceylanica* ————— 171  
*Limnium visfoliatum* ————— 176  
*Euphorbia hirsuta* ————— 179  
*Asplenium ceylanicum* ————— 181  
*Borago ceylanica* Paeyg. coll. 3. pag. 168  
*Asplenium visfoliatum* ————— 185  
*Euphorbia hirsuta* ————— 189  
*Asplenium ceylanicum* ————— 190  
*Borago ceylanica* ————— 191  
*Asplenium visfoliatum* ————— 192  
*Asplenium ceylanicum* ————— 195  
*Borago ceylanica* ————— 197  
*Asplenium visfoliatum* ————— 200  
*Borago ceylanica* ————— 199  
*Asplenium visfoliatum* ————— 204  
*Borago ceylanica* ————— 202  
*Euphorbia hirsuta* ————— 214  
*Borago ceylanica* ————— 216  
*Asplenium visfoliatum* ————— 218  
*Borago ceylanica* ————— 219  
*Asplenium visfoliatum* ————— 220  
*Borago ceylanica* ————— 221  
*Euphorbia hirsuta* ————— 222  
*Asplenium visfoliatum* ————— 224  
*Borago ceylanica* ————— 225  
*Asplenium visfoliatum* ————— 226  
*Borago ceylanica* ————— 228  
*Asplenium visfoliatum* ————— 230  
*Borago ceylanica* ————— 231  
*Asplenium visfoliatum* ————— 233  
*Borago ceylanica* ————— 236  
*Asplenium visfoliatum* ————— 233

Ferniginea D. Calycinis folioli ovatis obtusis patentibus; corollis labiis in  
genere barbato Ten. S. V. p. 5624

Digitalis angustifolia, flore ferruginea Misc. Bauh. p. 244

Digitalis latifolia, flore ferruginea. Monf. hist. 2. p. 470 f. 5. t. P.  
fig. 23.

Digitalis lutea non ramosa, Scorzonera folio Buxb. Cent. 5. p. 25. t. 49  
Habitat in Italia, Hispania, Constantinopoli &

Caulis erectus, simplicissimus, terquipedalis, angulatus, purpureus  
fiens, inferne glaber superne villosus. Folia sessilia inferi-  
ora basi parum attenuata nervosa venosa, angusta pennis  
subtus et margine villosa integerrima vel denticulo  
uno alterove obsita. Racemus terminalis raris. Flores  
minores quam in reliquis speciebus ferruginei copiosissimi  
approximati. Peduncululi torulosi in culta glabra  
bractea lanceolata attenuata margine villosa; longitudi-  
ne corollae. <sup>foliolo</sup> Calicis calycina rotundato-oblonga (in culta  
glabra margine membranacea), margine villosa. Corolla  
pubescentes

Cultae habet  
montanae  
an eadem cum  
altera

in umbra in praesentia

corolla duplo minori quam habet  
figure 13. et 6.



Tragopo, Digitalis  
quinisfolia

flore alba

Digitalis orientalis Tragopoginis folio Tournef. Cor.

Habitat in India Orientali herb. Mus.

Caules teretes, glabres, erecti, simplicissimi. Folia glabra, integerrima, radicalia frequen-  
tia, linear-lanceolata, sessilia, semipedalia, subnervosa, caulina distantia,  
parva latiora, fistulosa sessilia. Racemi ex alii supremis et apice. Flores remo-  
ti. Bractea ovato-lanceolata, acuta, longitudine calycis. Calycis foliola lan-  
ceolata, obtusa, villosa. Corolla extus pubescens, intus glabra absque barba  
labium inferius longitudine ipsius Corollae, oblongum obtusum

orientalis Digitalis

Digitalis orientalis Fraynogi flore albedo Tournef. Cor.

Habitat in oriente Herb. Turc.

<sup>herbaceus</sup> Caulis <sup>erectus</sup>, <sup>terres</sup>, <sup>glaber</sup>, <sup>simplex</sup>, <sup>superne</sup> inter flores <sup>villosae</sup>. <sup>folia</sup> <sup>septa</sup>  
<sup>remote</sup> <sup>dentata</sup> <sup>inferiora</sup> <sup>in</sup> <sup>petiolum</sup> <sup>attenuata</sup> <sup>superiora</sup> <sup>glabra</sup>, <sup>fulvosa</sup>, <sup>arsenica</sup>. <sup>Placenta</sup> <sup>floribus</sup> <sup>vel</sup>  
<sup>topo</sup> <sup>terminali</sup> <sup>simplex</sup>: <sup>pedicelli</sup> <sup>villosi</sup>. <sup>Di</sup> <sup>calycis</sup> <sup>et</sup> <sup>corolla</sup>. <sup>Bractea</sup> <sup>linea</sup>  
<sup>res</sup>, <sup>calycis</sup> <sup>longiores</sup>, <sup>unguiculares</sup>. <sup>Calycis</sup> <sup>laciniis</sup> <sup>lanceolatis</sup>. <sup>Flores</sup>  
<sup>mutantes</sup>. <sup>Corolla</sup> <sup>calicem</sup> <sup>inferius</sup> <sup>vir</sup> <sup>sempollicare</sup> <sup>oblongum</sup>, <sup>obtusum</sup>,  
<sup>longitudine</sup> <sup>ipsius</sup> <sup>corolla</sup>: <sup>saeva</sup> <sup>imbricis</sup>  
<sup>prope</sup> <sup>obscurum</sup>

habes



villosa Digitalis floribus capitatis, corollis pilosis Puffinb. arbeißen Kunstschütze Freunde in Wien 1783  
paol. pag. 71. tab. 2.

Habitat in deserto Mungalor ad munim Chenanf. 4

Radix fibrosa. Caulis spithameus pilosus uti tota planta. folia pauca lanceolata, petio-  
latis, nervosa, serrata, obtusa. flores terminales 5-6 fertiles, purpurei.

non vid.

purpurea 2 calycinis folioli ovati acuti, corollae obtusi; Labio superiore  
integro L.V. Fl. Dan. 774.

*Digitalis purpurea* Dod - pempt 160.

*Digitalis purpurea*, folio oppero Bauh. pin. 243

17 *Digitalis alba*, folio oppero Bauh. pin. 229.

Habita in Europa boreali et austriaca alpibus

Caulis exilis simplicissimus bipedalis et ultra, pubescens. Folia <sup>nigra</sup> inferiora  
basi in petiolum attenuata, superiora sessilia, elliptica in qua  
liber serrata, simpliciter venosa, pubescentia, inferiora palma  
na et ultra. Racemus terminalis secundus semipedalis. Bractea  
ovato lanceolata attenuata pubescentia uti pedicelli et calycis.  
Foliola calycina oblonga. Corolla magna purpurea intus  
albida pilosa maculis purpureis interdum tota alba.

oblongi acuti

nigra serrata

folia elliptica



minor D. corollis obtusi: labio superiore subbilobo, foliis cordatis Lin. Mant. 567.

¶ P. V. p. 562:

Digitalis purpurea hispanica minor Tournef. F. R. h. 165  
Habit. in hispania &

Caulis Digital. purpurea dimidiis brevior lavis pedunculi villosi.

Folia sesquial. lanceolata, non rugosa lora, subintegerrima:

~~inferius basi vix~~ ~~superius~~ ~~marginibus~~  
Flores. semillim. D. purpurea figuram magnitudinis, colore, sed

puncta copiosiora solati absque inde. Labium superius pro-

fundus bilobum: inferius obtusissimum laterale reflexa

anthera punctis semigineis Lin

sed un folius com  
munis d. bractea  
lanceolata pediceli  
et calycis villosi  
recipit

lanceolata subintegerrima  
fere

~~non vidi~~ non vidi

Thapsi  $\delta$  folios decurrentibus Lin. Spec. pl. pag. 8677

*Digitalis angusto verbasifolio*, montana Boiss. mus. 2. p. 100.

$\delta$  85

*Digitalis verbasifolia*, purpurea minor perennis hispanica Bar  
u. 1183.

Habitat in Hispania.

Racis  $\delta$  purpureo caulibus folia tomentosa. Folia inferiora  
elliptica, superiora lato-lanceolata, omnia basi attenuata in  
pedicellum per caulem semidecurrentia, venosa, serrata versus  
basin integerrima. Racemus et flores  $\delta$  purpureo modo minus  
foliola calycina oblonga acuta. bractea lanceolata attenua  
ta pedicellis breviori. Faux corollae pallida punctis sanguineis  
parvis lobis inferiori ciliato.



lutea D. calycinis foliis lanceolatis, corollis acutis; Cibus superior bifido  
L. S. V. *Facqu. hort. 2. p. 105*

*Digitalis major lutea f. pallida, parva flore Bauh. pin. 244*

*Digitalis lutea minor flore Monf. hort. 2. p. 479 f. 5. tab. 0.*  
*fig. 5.*

Habitatio gallica, Italica subulsi &

Caulis glaber simplicissimus bipedalis, erectus, subangulatus.

Folia sessilia, lato lanceolata, tripolliciana sensim minor, fe-

inferiora dentata  
ciliata

quentia, simpliciter nervosa venosa, glaberrima lobis inferis  
subciliata superne obscure denticulata vel integerrima  
necnon secundis corolla mutante parva pallide flava  
bractea ovato lanceolata acuta pedicellis longioribus

glaberrimis

lato lanceolatis subintegerrimis lobis

foliis

ambigua D. Calycinis folioli. canicollatis, <sup>villoso-velutis</sup> corollis galea emarginata, foliis  
puberulis pubescentibus Lin. suppl. p. 282. S. V. p. 562. \*

Digitalis lutea major Bauh. pin. 224.

Digitalis foliis calycinis canicollatis, galea incisae, faucibus maculata  
H. Hall. hist. n. 331.

Digitalis ochroleuca Jacq. austr. 1. p. 36. t. 57

Habitat <sup>villoso</sup>

Caulis teres, pubescens, sesqui pedalis erectus. Folium sessile nervo  
vulso, nervis et margine pilosa latiora et majora quam  
in lutea obscure serrata suprema ovata attenuata  
Flores pallide flavi magnitudine D. purpureae. Peduncululi  
bractea, pedicelli et calyces <sup>germina</sup> pelis glandulosi. bractea linearis  
canicollata pedicellis longioribus. Corolla erectus pubescens  
Stylus glaber

villoso-velutis

Digitalis grandiflora All. fl. ped. et ha. Mant.



Digitalis oblongis

parviflora

Semigena Digitalis calycinis foliis <sup>ovatis</sup> obtusis patentibus, corollis labio inferiore

# barbato Len. d. v. pag. 62. Pedunculo Communi canato

<sup>leg.</sup> in monte morcay, <sup>quod p. n. p.</sup>

Caulis erectus, simplicissimus, sesquipedalis, et costa foliorum decurrente angulatus, per partem inferne glaber, superne villosus

Folia sessilia, linear-lanceolata, inferiora basi parum attenuata, nervosa, venosa, ~~neris~~ <sup>et nervis</sup> subtus et emargine villosa, integerrima vel denticulo uno alterove obscuro.

<sup>spica</sup> ~~racemus~~ terminalis, erectus, quadri pollicari, cylindricus. Pedunculus

an Digitalis ~~botanica~~ Communi canatus. Flores minores quam in reliquis, vix seminaque culari, copiosissimi, conferti, prope dim superne, fusco ferruginei.

Digitalis Semigena

var. V. La Mark in Calyce foliata

Cyclop. Tom. 2. p. 1. pag.

177.

Bractea lanceolata, attenuata, margine villosa, longitudine corolla

Corolla pubescentes, marginibus labiarum villosis, interioribus: <sup>Lobium</sup> inferioribus obscuris

# Digitalis foliis radicalibus spatulatis, floribus in spicam ante congestis as. Orythograph. Anag. pag. 373

(maxime affinis D. Semigenae an modo varietas differat caule superne villosa, nervis foliorum et marginibus foliorum villosis. Pedunculo inter flores canato, corollis triplo minoribus)

217 confer: Gaoyu <sup>not</sup>

obscura D. foliis linearilanceolatis integerrimis basi adnatis Lin M.  
Symb. p. 410. Gaucq. bot. 7. 791.

*Digitalis angustifolia hispanica* Boc. mus. 2. p. 136. 790

*Digitalis hispanica angustifolia* nigracantha Townes. fr. 166.

Habitat in Hispania

Caulis pedalis erectus basi ramosus purpurascens inferne  
e lencis decurrentibus subangulatis glaberrimis. Folia  
angusta attenuata integerrima inferae superne versus  
racemum ferè nulla obscure trinervia arearia, glaber  
rima laevi. Racemus secundus flores distantes. Brac  
teo ovata attenuata, pedicello longioriti calycis glabra  
Corolla pollicaris. foliola or barbata intus subultra  
foliola calycina lanceolata

corolla labiis bor

labi



canariensis D. calycinis foliis lanceolatis, corollis bilabatis acutis, caule fruticoso. Lin. T. V. Mill. Det. 120

Digitalis acanthoides canariensis frutescens flore aureo Com. hort  
2 p. 105 t. 53.

Digitalis affinis canariensis, solidagineis acutis foliis ceteris pilosis,  
flore aureo cucullato Plukin. alm. 40 T. 325. fig. 2.

Habitat in Canariis

Caulis ramosus. Folia lata lanceolata, serrata acutissima basi attenuata, <sup>puberula</sup> ad <sup>ut lacina calycis</sup> ~~centem~~ villosa. Perianthia terminalia. Bractea lanceolata pedicellis longioribus. Corolla glabra.

---

labio superiore bifido obtuso, lacina inferioris lanceolata acuta

Sciptum D. calycinis foliis subulatis, bracteis linearibus, floribus longioribus, corollis obtusis, foliis ellipticis serratis, caule fruticoso Hort. her. 2. p. 346.

Digitalis sciptum foliis oblongis spatulatis serratis, spicis terminalibus liberis ovatis pedunculatis comae bractearum terminalis calycinis spatulatis serratis, corollis quadrifidis, caule fruticoso lin. sup. l. p. 202. S. V. pag. 563. ~~Hort. fruticoso tab. 24~~

foliis oblongis  
pedunculatis  
apice comae  
caule fruticoso  
- Hort. fruticoso  
Syncl. pag. 21

Habitat in Madera  
- lanta speciosissima. Rami hersti. Folia approximata subpedalea, sessilia, a basi sensim dilatata in oblongo, in medio serrata, acuminata, supra glabra, subtus hersta et albicantia. Peduncululus terminalis ramorum, foliorum teres erectus, palmatis intus porosis, terminatus in spicam ovatam floribus dependens. Bractea lineares flore longioris, et ante et plerumque comam spiciformes. Lacinae calycinis hersta. Corolla fere magnitudinis ferruginea lin. non vid.



fructu D. foliis ovatis, utrinque pilosis, floribus solitariis axillaribus: calycis  
lobis subulatis: corollis obtusis, apice integris Lour. pl. Coch. pag. 320  
Habitat in Cochinchina.

Caulis erectus, pedalis teres glaber. folia opposita. flos fusco pur-  
pureus. Carina calycis subulata superior major interdum bifida. Cor.  
4 fida Campanulata. Stigma cochleariforme

non vidi.

Proprietas *Justicia genticifolia*, foliis lanceolato-ovatis hirsutis sessilibus, spicis recurva-  
tis. L. V. p. 6. 25. Spec. pl. 21. 4.

*Justicia* foliis ~~oblongo~~ ovatis hirsutis sessilibus, floribus spicatis alaribus, caule  
genticifolo Mill. Gard. n. 1.

Habitatio vera Guicetj

Rami teretes, cortice cinereo, superne villosi. Folia subtus pilosi. Spica axil-  
lares terminalesque, erecta, <sup>superne</sup> recurvata. Flores secundi. Calyx  
minutus. Olos pollicaris lobis integris. Anthera parvula.



Cochinchinensis Digitalis foliis lanceolatis apertis, floribus solitariis apertis  
axillaribus, calycibus acutis, corollis obtusis apice emarginatis 11-71

Lour. fl. Cochinch. pag. 370.

Habitat in Cochinchina

Caulis herbaceus, sesquipedalis, pubescens. Folia in terzina, opposita,  
Flores albo-violacei, sessilis, axillares, solitarii. Cal. spicis acutis.  
Coroll. campanulata, subventricosa laciniis obtusis suprema emarginata. Capsula ovata

*Lycopodium* ~~foliis~~ ~~lyrata~~ ~~puberula~~ ~~foliis~~ ~~vario~~ ~~glaucis~~  
an *glaucis* *diversis*. *Blumen* in *herbario* *Hell.* *Plantae* *indicae* *foliis*  
in *glaucis* *vario* *glaucis* *et* *amarica* *septentrionalis*

Frondosa  
Clavata Justicia umbellae axillaribus pedunculatis, <sup>Compositis</sup> bracteis obovatis  
obovatis <sup>rhombicis glabris</sup> <sup>obtusis, foliis ovatis</sup> foliis ovatis

Dianthera clavata panicula subumbellata composita, pedunculis  
Habitus in Obarete apud Dilatati Donn. prodr. pag. 4. n. 15.  
Sahl.

Paulis herba Veretifolius, glaber uti totae planta.

Solici petiolata, bipollicaria, acuta glabra integerrima  
Pedunculata <sup>Petroseus unguicularis</sup> <sup>tetragonis</sup> <sup>angustis acutis</sup> <sup>triformes</sup>  
oppositi, solidani, apice pubescentes, per radii um

foliis triplo longioribus, longiores. basi bracteis duo opposito oblongo acuminata.  
erectis radii pariales gemina femiu unguicularis. bracteis duo structura

glabra inferiorum. pedicelli trij. et quatuor bracteis duobus majori  
bis subrotundo rhombicis, membrana raicis nervosis venosis  
et altero angustiore breviore et duo alia linearis ad basis per  
et flori subulata longitudine calycis

Calix pubescens quinque partitus  
extus pubescens Corolla bracteis longior, bilabata. labio inferiore tridentato  
Stamina corolla breviora. antheris geminis