

Dilatris

Æ 161.

103. Dilatris

Cor. 6-petalas, hirsuta. Filamentum tertium reliquis minor, Anthera
major. Stigma simplex. Caps. glabris, infera, 3-locularis

Heterena rostrata Gmelin
ex Angolop. lanaria hinc vocata Maske sub nomine herander

umbellata 1 Dilatris petalis oblongis, corymbo fastigiato hirsuto.

Dilatris corymbosa Berg. cap. 9. t. 3. s. 5.

Wachenborfia umbellata

Fixia hirsuta;
hirsuta prima, um-
bella bifida rari-
mosa Lin. mant. 27.

Dilatris umbellata, petalis ovatis, corymbo fastigiato hirsuto Lin. sup.
pl. 101. Thunb. in Act. Soc. Am. hist. nat. 4. p. 46.

Dilatris idioides; panicula ovata villosa, petalis ovalibus ex-
terne barbatis, staminibus corolla longioribus Lamont. illust.
1. p. 127. t. 34.

Habitat ad Cap. b. spei 4.

Scapus ^{caulis} erectus, sesqui-pedalis, inferne teres glaber, superne trian-
gulari. Cinereo-tomentosus. Folia plurima radicalia, tria circa
in ^{caulis} scapo, remotis & unia, tri-pollicaria, linear-lanceolata, infer-
ne glabra, superiora villosa. Corymbus terminalis, densus, pedun-
culis, bracteis, petalis etiam germinibusque hirsutis: peduncululi
bifidi, panes cespcentes, pedicelli alterni, breves, secundis, uni-
flori. Bractes lanceolatae. Petala purpurea, apice puncto
fusco, trinervia

Amplexicaulis

arvense Polygonum An. N.

Taequ. fl. austr. 4 Tab. 365.

Camphorata congener Bauh. pin. 486.

Habitat in Germania, Gallia, Italia arvis O

Caulis erectus angulatus ramosus glaber superne villosulus ramuli
alterni simplicissimi per se per se breviores folia sessilibus

alternis pubescentibus petiolis brevibus terminalibus floribus ad-
mentis ramorum in axillis floribus axillaribus solitariis sessilibus

alternis
foliis pubescentibus per angulos caule herbarico

vel salsum Pal. it. l. app. n. 31. t. 9. f. 2

adda Gal. syn.

~~Torandrum pal. 96 p. 488. t. J. fig. 2 et Tab. E. fig. 1~~
uno forte restinet

vucosa ? Silene petalis linearibus, corymbo fastigiato villosa. ^{viscidg} lin. suppl.
101. Thunb. in act. Soc. ^{am. hist. nat.} berl. 4. p. 40. +

Habitat in summitate montis tabularis Cap. b. spei. 7

Caulis teretiusculus, pedalis, uti tota planta, foliis radicalibus
exceptis hirsutissimus; pilis rufescentibus apice glut glandulosos
glutinosos. Folia radicalia plura, vixinantia, pedale breviora,

Strata: Caulina tria vel quatuor, pollicaria. Corymbus densus. Pediculi
pollicares. Bractea linearis. Petala unguiculata,
viscida. Filamenta longitudine corollae

paniculata 3. Dilatata pedalis lanceolata, panicula oblonga villosa viscosa
Lin. & suppl. 101. Thunb. in act. bot. am. hnt. n. ber. 4. p. 51. +

Habitat in arenosis Cap. b. 2 p. 4

Caulis pedalis, erectus, Aristus, uti tota planta hirsutissimus, e puli
densis patentibus infescentibus glanduloso viscosis. folia caulina
paucis, pollicaria vel ultra, lanceolata. Flores a medio caulis
ad apicem, paniculati. Bractea lanceolata. Pedunculi pollicari
res: pedicelli subquadri flori. Corolla purpureo flavescens. Petala
unguicularia. Filamenta corolla breviora Thunb. l. c.

Habitus. Radix carnosa, succo rubro fento. Caulis suffruticosus,
erectus, pedalis, simplicissimus, hirsutissimus. folia caulina
alterna, amplexicaulia, Pedunculi bifidi. Petala extra hirsuta

Dilatata caroliniana var. l'Heretiera La Mart. illud. l. p. 1
quod l'Heretiera Michaux fl. bor. Amer. l. p. 20 ad Cananiam per
tinere videtur

viscoso. D. petalis linearibus, corumbo fastigiato villosa ¹⁰¹ Lin. Suppl. pag. 93. Sw
pag. 93.
Habitat in Cap. b. p. mei

non vidi

cordata Dilatni petali lineari canaliculati extus villosi, panicula
corymbosa, foliis longi nervi sub lineari La Mart. T. Enc. pag. 127
Habitat in Carolina.

Panicula inaequalis tomentosa

Herbaria Gmel.

Stam. 3. Cap. 3 quatuor 3 locularis oligos per valvum 8 septo
medio ad axem aut connatis

cum lanana conjugenda.

~~Herbaria~~