

# Dillenia

1. speciosa D. foliis oblongis rotundato-acutis denticulatis, pedunculis unifloris
2. elliptica D. foliis elliptico-ovatis acutis serratis, pedunculis unifloris
3. rotunda D. foliis obovatis truncatis serratis, pedunculis unifloris
4. integra D. foliis obovatis obtusis subintegris, pedunculis unifloris
5. serrata D. foliis elliptico-ovatis acutis serratis, pedunculis trifloris

Dillenia  
indica Dillenia pedunculata uniflora  
Dillenia indica Lin. S. V. pag. 507

Dillenia dentata

Dentata Dillenia foliis ovatis rebus dentatis, pedunculis trifloris Thunbergii Act. Linn.  
Socet. Her. Lond. 1. p. 201. Tab. 20.

Wormia triquetra : Rottb. in Act. Hafn. petiolis triquetris alternis

latere superioris transversim fissatis Rottböl in Act. Hafn.

Habitat in India Tom. 2. pag. 532. Tab. 3

Pedunculi saepe 4-8 flori basi ramosi

Rami teretes glabri. Folia petiolata alterna ovato-oblonga  
palmata et ultra obtuse remote dentata basi integerrima  
et triquetra glabra, supra <sup>obtusius remote</sup> nervosa  
obtusius venosa. Petioli triquetri, folio 2-3 plo breviorum ad apicem  
nervi basi annulo crasso. Pedunculi terminales. Flores remoti.  
Secundi ——— racemosi

ovato-oblongi

Catmen Ruy her. 3. opp. Luz.

Sanguis Rumph her. amb. 2. pag. 142. Tab. 46 herb. Guss.

*Paspaliiflora* <sup>Dillenia</sup> D. ? foliis ovato oblongis tomentosis floribus axillaribus sessilibus  
solitariis

Habitat in India Orientali Bengalia. <sup>Carri</sup>  
Rami apice tomento tenui ferrugineo uti petioli et folia.  
Folia alterna, palmata integerrima obtusa supra sub  
tomento nitida, subtus reticulata venosa. Flores axilla  
res sessiles glabri. Stamina Dillenia deoque huius retuli  
quorumvis dubii dum per nec pistilla nec fructum vidi.

1 indica Dillenia Lin. S. V.  
Syalida Rheed. mal. 3. p. 39. t. 30. 39  
~~Longyam Triumph Camb. 2. p. 44. 45.~~  
Habebatur in Malabaribus

indica D. g. foliis oblongis, rotundato-acutis denticulatis pedunculis  
speciosa g. unifloris Thunb. in Lin. Transf. 1. p. 200

Rami teretes. Folia in apice oblonga, spithamea basi ovata et  
cuneata utraque nervosa: nervi in dentem tomentosum excurrentes  
supra glabri, arena, subtus subrenidis tomentos. Pedunculi ut  
pallide asi uniflori

2 elliptica 3. foliis ellipticis ovatis acutis serratis pedunculis unifloris

Thaun in An. trans. p. 200. ~~177~~

Banquet Rumph. herb. T. 2. p. 140-145

Habitat in Amboina, Celebe, Macassar

folia alterna petiolata, nervosa nervi oppositi paralleli

Pedunculi terminales solitarii

racemosa  
a triquetra

Dillenia floribus racemosis

Wormia Triquetra, petioli <sup>non</sup> triquetris alternis, lobis superioribus transver-

sim finatis Rottb. in Act. Hafn. Tom. 2. pag. 532. Tab. 3.

Ex India orientali misit de König 5

Rami teretes, adsculati, glabri, purpurascens.

Folia petiolata, alterna, palmata, <sup>longe oblonga</sup> oblonga,

inferne integerrima, utraque glabra, supra pallide virida  
obliqua nervosa, areolaria, subtus obscuriora inter nervos  
obliqua simpliciter venosa.

Petioli triquetri fol. sesquipollicariis,

Racemus terminalis, <sup>oblongo</sup> pyramideus, simplex, basi interdum ramosus

Pedunculus triquetrus. Pedicelli unguiculares, secundi

Calyx corolla stamina ut in D. India at omnia multoties

minora  
germina ut in India at stygmata 5-6 subulata

(a Dillenia differt modo numero stygmatum

5 *retusa* D. foliis obovatis truncatis serratis, pedunculis unifloris Thunb  
in Lin. Trans. pag. 200. 7. 17

Habitat in Ceylono sylvis &

arbor ramis glabris. Folia alterna approximate, petiolata inferne  
acuta integra, superne remote serrata apice subretusa  
conacea, utraque glabra. Petioli hispidi. Flores terminalis solitariis  
pedunculatis.



4 *Integra* L. foliis obovatis obtusis ~~puberis~~ pubescentibus pedunculis cernuis  
Thunb. in act. soci. lin. 1. p. 199. t. 10. \*

Habitat in Ceylona 5

arbor rami alternis glabris. Folia a medio ad apicem serratis obsole  
tis vix manifestis petiolata, utrinque glabra, venosa, subtus pal  
lidiora, subserratis. Petioli allosi. Flores in ultimis ramis  
eis subsolitatis pedunculatis

na vid.

49

*Lenata* J. foliis elliptico-ovatis acutis serratis, pedunculis trifloris

Thunbergi Ann. Transact. 1. p. 201.

Tanguar Rumph. herb. 2. p. 142. t. 46

Habitat in Celebe, Macassarana, Tavat

Folia alterna petiolata. Flores in pedunculis lateralibus terni  
pedicellati

un. 2.

*lespiliflora* D. foliis oblongis <sup>integerrimis</sup> ferrugineo tomentosis floribus axillaribus  
scissilibus solitariis

Habitat in India Orientali

Rami superne angulati tomentosi inferne vix glabri  
Folia petiolata alterna remota, oblonga obtusa basi  
ovata, palmata et ultra venosa reticulata utrinque  
tomento tenui <sup>velo glabro</sup> ~~vestita~~ <sup>tomentosius</sup> ~~vestita~~. Flores ante evolus  
tomentosa magnitudine nuclei Copuli. Petiolus supra  
planus subtus convexus

an huius generis samana ut in Dillenii P. stilla non vidi