

Diosma

1. oppositifolia D. foliis subulatis ^{oppositis} subtus punctatis, petalis oblongis sessilibus basi villosis.
2. tenuifolia D. foliis linearibus revolutis oppositis impunctatis, pedunculis axillaribus saepe ^{saepius} punctatis
3. uniflora D. foliis oblongis subtus punctatis glabris, floribus terminalibus sessilibus
4. latifolia D. foliis ovatis crenatis ^{reticulatis} sessilibus, pedunculis axillaribus foliis ^{lanceolatis} ~~triacentis~~ ^{caulis villosis}
5. ^{vata} elegans D. foliis oblongis obtuse crenatis glabris, subtus punctatis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris basi bracteatis
6. capitata foliis linearibus umbriatis scaberrimis, floribus capitate speciosis, calycibus umbriatis
7. unicapitata D. foliis lanceolatis serratis subtus punctatis, capsulis unilocularibus

7. oppositifolia D. foliis subulatis oppositis subtus punctatis, petalis oblongo, sepli
 bus basi villosi
8. rubra D. foliis linearibus mucronatis glabris caninatis alternis, subtus
 punctatis
9. encoides D. foliis subulatis subtus convexis punctatis glabris bifariam in
 bincati
10. hirsuta D. foliis linearibus hirsutis
11. tetragona D. foliis cordatis velutis complicatis - canatis ciliatis ramis
 nanifloris
12. marginata foliis cordatis - attenuatis membranaceo marginatis
13. barbigena D. foliis cordatis amplexitauribus, petalis barbatis
14. carnosa D. foliis oppositis triquetris canatis oblongis, carnosis glabris margi
 ne subulatis
15. thymifolia D. foliis oblongis oppositis planis integerrimis subtus punctatis
 umbellis terminalibus.
16. pilosa D. pilosa, foliis linearibus patulis, umbellis axillaribus pedun
 culatis
17. capensis D. foliis linearibus triquetris glabris, subtus punctatis, floribus
 terminalibus umbellatis

18. bicolor D. foliis lanceolatis triquetris canna margine que ciliatis subtus punctatis, floribus terminalibus umbellatis
19. Crenifolia D. foliis lanceolatis imbricatis sub ciliatis costa punctatis, floribus terminalibus umbellatis
20. microphylla D. foliis ovatis triquetris supra planis glabris patentibus, floribus terminalibus umbellatis
21. cupressina D. foliis ovatis triquetris imbricatis, floribus solitariis terminalibus ¹⁴⁻¹⁵ sessilibus
22. lanceolata D. foliis lanceolatis glabris subtus margine ciliatis punctatis, floribus terminalibus aggregatis ^{hul} sessilibus
23. ~~ovata~~ ^{ambriata} D. foliis ovatis lanceolatis mucronatis imbricatis ciliatis
24. ciliata D. foliis ovatis lanceolatis subtus punctatis rugosis, floribus terminalibus umbellatis
26. ovata D. foliis ovatis crenatis acutis petiolatis, ~~pedunculatis axilla~~ ^{subtus impunctatis} ~~ribus sessilibus solitariis unifloris subtus impunctatis~~
27. crenata D. foliis lanceolatis ovalibus oppositis glandulosis crenatis subtus punctatis, pedunculatis axillaribus solitariis unifloris
28. pulchella D. foliis ovatis obtusis glandulosis crenatis subtus impunctatis pedunculatis axillaribus geminis unifloris

Diosma decussata La Martii videtur periculis. specimen herb. L. M. esse
periculenta Presque

brevisfolia L. M.

Diosma folio late undulato floribus umbellatis undulato
virgata L. M.

folio viridi: antheris, floribus umbellatis & terminalibus albis

223
Diosma
Diosma
virgata
undulata
periculata
terrestris

Debil
La
Martii
virgata
brevisfolia
apicalatoides

Diosma latifolia; foliis oppositis, serratis, ovalibus, catis & imis; floribus terminalibus, albis, & exilibus Andr. repos. t. 33.

Habitat in Cap. 6. & p. 7

namque differre videtur a *crassa* vel affinis foliis magnis

corymbosa *Diosma foliosorata* - Can. colorati carnosis integerrimis Montan
in Act Soc. Phys. Lond. 1. 2. no 11.
Habitat in Cap. b. sp. i.

nunc ignota

Diosma foliosorata

Intob. Side

orbiculari *Diosma* foliis orbiculatis; ramis villosis Thunb prod. 1. pag 84
Habitat in Cap. 6. p. 5

non vidi

bifidum D. foliis lanceolatis imbricatis, pedunculis aggregatis terminalibus, petalis bifidis Jacq. Coll. 3. p. 270. t. 20 fig. 1

mich. Lynce

apatica Diopma foliis lanceolatis alternis, racemis subterminalibus Lour
se-cochinch. pag. 161.

Habitat in montibus Cochinchinae 5

arbor 6 pedalis. folia integerrima, glabra, alterna. flores flavi
Racemi compositi. foliola calycis ovato-oblonga. nectarium craspen
germen et lobum cingens. Capsulae 5que reniformes, semina solita
nec calyptrato. Capsula pedunculata propria

rubra L. foliis linearibus mucronatis glabri caninatis, subtus bifariam
punctatis Lin. Spec. pl. 207.

Spissa africana odorata, floribus suavis rubentibus Com. rar. 2. 7. 2.
Enica aethiopica, rosmarini sylvestris folio eleganter punctato, flore
tetrapetalo purpureo Plukh. mant. 60. t. 347. fig. 4

Habitat ad C. b. spec. 5

Rami suboppositi glabri ^{numquam} ~~non~~ subcrotome ramulosi. Folii
lineari utrinque glabri ^{in margine otulo armato tenui, sine nervis} supra plana subtus caninata
breve petiolata subtus fere unico puncto. Corolla
axillaris brevi pedicellulati super ad apicem ramulorum
calycis ⁱⁿ imbricati.

rubra foliis trigonis mucronatis glabris subtus bifariam punctatis

~~planta rubra~~

~~quomodo revere ab ^{ab} enicoides differat non ignoro forte
mea nil nisi ^{enicaides} rubra longi petalis albis
descriptio Bergii convenit tamen et purpureo et rubro spec.~~

encoides *Diosma* foliis linearibus canaliculatis subtus convexis, bifariam imbricatis
Linn. S.V. p. 239 Berg cap. 65

Enciformis *Coridi* folio, *Othiopia*, floribus pentapetalis in axillis
Pluch. amalth. 236 t. 279 fig. 5.

Habitat in *Othiopia*.

Erigitur ramosis semis ramulis filiciformibus glabris & Capis foliorum
inferne scabri. folia sessilia erecta patentia semper unguiculata
glabra, basi serrata, frequentia subtus punctata serratis peris
punctatur et *Diosma* tenuissima, alternis. flori inter ult
axillis ultimis terminalibus subsessilibus solitariis breviter pedunculatis.
Calycis basi imbricati foliis ovatis cuneatis acutis margine serratis
tomento ciliatis. Corollam unguibus glabris longitudine calycis

~~Folius~~

Alba

~~subulatus subtus convexis punctatis glabris. floribus
axillaribus solitariis calycibus imbricatis~~

maxime affinis purpurea
mihi haec nota

hirsuta D. foliis linearibus hirsutis Hort Cliff. 71. L.V.

Berg cap. 65

Habitat in Cap. b. p. 5

Rami fusco-lunari. ramuli subaggregati foliosi hirsuti super
ne pantes ramulosi. Folio subulato unguiculato pater
na penta subfissile mucronata subtus hirsuta ^{scabra capsula}
ciliolata glabra excepto margine. Flores ^{solitarii vel terni} terminales subumbel
latis brevissimis pedicellatis pilis hirsuti. Petala subrotunda-fimbria
glabra

Trigonis mucronatis hirsuti floribus terminalibus
subsolitariis Thunb prodr. pag. 42.

hippida
pelosa D. *pelosa* foliis linearibus ^{Anquetis villosis-hippida} ~~patulis~~, umbellis pedunculatis

axillaribus terminalibusque

Habitat in cap. b. sp. 5

Fruticulus humilis, ramis foliis pedunculatis calycibusque
pelosis. Panicula subrecta illata. Corolla subpetalata, unguicula
canis supra canaliculata, ^{subtus longe aperturata} costata ~~suppurata~~. Pedicelli
ei ex axillis supremis capillares. Pedicelli plures basi breviter
ti. unguis petalorum ^{vel unguis calycis} f. calycis longiores lamina oblonga
filamenta petalis duplo longiora

Diopha *hippida*. foliis vaginis muticis villosis-hippida patulis, umbellis
terminalibus Thurb. prod. flor. caped.

^{pubescenti}
lenifolia D. foliis lanceolatis ^{lanceolatis cuneatis} imbricatis subilatis costa puncta
pedunculatis umbellatis terminalibus

Habitat in cap. b. p. i.

Rami puberuli elongati teretes glabri. Solia pteris exserta
lyra concava ^{subtus convexa} vix unguiculata. Pedunculi
capillares ^{in pediculis terminalibus plerumque} propius glabri. Flores D. capensis Nitariis lacantibus

pubescenti foliis lanceolato-trigoni muticis villosis imbricatis
umbellis terminalibus Thunb. prod. fl. capensis pag 43

capensis D. foliis linearibus triquetris, subtus punctatis L. V

Hartogia capensis Lin. Spec. pl. pag. 280

Hartogia capensis Berg.

Habitat ad Cap. b. spec. 5

Rami et ramuli verticillati terni glabri. Folia parva late
viresca obtusifolia ^{glabra subtus, terni, pennata, punctata} in ramulis imbricata. ^{pedunculati}
terminales plurimi. unguis petalorum calycis longior
lamina linearis oblonga ~~est~~ lingue parum longior

lati

glabri

ped floribus umbel

regula la murchi fide herb la m

H. capensis

^{beicolor}
humilis *D. foliis lineanibus triquetris sub* ^{longis margineque ciliatis} *pelopis subtus punctatis, pedunculis*
terminalibus umbellatis

Habitat in C. b. spei

Fruticulus humilis ramis ramulisque paucis subverticillatis.
Folia frequentissime ramulis imbricantia parva. Pedun-
culi plures villosi hirti. unguis calycis longioris lamina
oblonga castus purpurascens margine albido. filamenta et
nectaria corollae longiora

varietas hujus? foliis glabris sub nomine enicoidi a Dr. Baker
deta

an varietas *Diosma ciliata* Thunb.

calicata D. foliis lanceolatis carinatis ciliatis, umbellis terminalibus Thunb
Pendr. fl. Cap. pag. 43
Habitat in Cap. / proi.

Ad de Descript

my funder La Martinière fide herb Lam

erioder L. foliis trigonis obtusis, floribus terminalibus subsolitariis
Thunb. prod. fl. cap. pag. 43
Habitat in Cap. b. pra.

adde Synonyma cum ^a Lia Thunberg a Linn. differt videtur an eadem
non vid.

Cyperus spina Diofma foliis ovatis triquetris imbricatis; floribus solitariis. Terminalibus sesquipedibus

Lin. Mant. 50* S. V. p. 239

Encosiformis Othopica, cupressifolia compressifolia Pluk. alm. 136. t. 6. 279. fig

Brunia floribus solitariis Lin. Spec. 289

Habitat in Othopia

+ glabri

Rami filiformes erecti alterni. Verti foliis imbricatis alternis
minutis (linea) exakte triquetris, ^{sub}glabris, sesquipedibus erectis, apice
calloso ~~ob~~longato terminalis. Calyx terminalis sesquipedibus. Petala saepe 4. obovata

supra canaliculata

folia ^{intenduntur} membranacea lanceolata erecta. Calyx duplo longiora. Lin

subciliata

Diofma dichotoma foliis oppositis oblongo carnosis imbricatis
caule ^{tri}dichotomo, floribus subgeminis terminalibus

fructu

Rami dichotomi glabri. Folia frequentia obtusiuscula
lineas 2. longa.

non vid.

rami dichotomi

non vid.

triquetris,

carnosa
solandv.
succulenta
Bergii

calicata Hofma.

microphylla L. foliis ovatis triquetris supra planis glabris, floribus
cimbellatis

Habitat ad C. b. sp. 5 ^{pedali.} ea herb. Schumath.

Fruticulus ramomoxi rami dichotomis flexuosis
ramulosis glabris. foliis. Solia minuta, alterna subtus adlen
tina ^{nubigena} ~~vallata~~, carinata pabala vix puncta pedunculi breves
fere fructificatio flastoga

oppositifolia D. foliis subulatis acutis oppositis Linn. 1. V

Speraa africana, foliis emicantim positis Com. rar. 1. t. 1.

Hypericum africanum vulgare Seb. thes. 2. p. 21. t. 40. fig. 5.

Habitat ad C. b. part

Rami ~~subreticulati uti ramuli~~ ^{plerumque tereti summe pubescenti} foliis unguiculatis

~~Angustifolia~~ ~~lesilia~~ ~~subulata~~ ~~petalis~~ ~~oblongis~~ ~~calycis~~ ~~foliola~~
Canaliculati ~~brevi~~ ~~basif~~ ~~tractati~~ ~~petala~~ ~~foliis~~ ~~oblonga~~ ~~calycis~~ ~~foliola~~
glabra ~~ovata~~ ~~attenuata~~ ~~in~~ ~~acumine~~ ~~corollae~~ ~~longior~~ ~~ciliata~~
~~petala~~ ~~oblonga~~ ~~foliis~~ ~~basif~~ ~~villosa~~

affinis maxime D. rubra

oppositifolia D. foliis unguis obtusis ciliatis, floribus terminalibus Thunb
prodr. fl. cap. pag. 43

an Thunb. eadem ac Linn. differt in plane opposita

~~foliis in meo non opposita, similibus rubra~~

~~mibi ignota~~ mibi haud satis nota

capitata Diopma foliis linearibus imbricatis scabris ciliatis, floribus capitato-spicatis Lin.

Mant. 210. * S. V. pag. 239 *

Habitat in Cap. b. sicut

~~superioribus~~ ramis prolixis geminis vel pluribus pedale
caulis erectis, ramis prolixis geminis vel pluribus pedale
superis superis villosis, folia sparsa concava, conferta, octofariam
imbricata ^{ne villosis} ~~extus~~ ^{ne villosis} ~~concreta~~, ^{ne villosis} ~~superiora~~ ^{ne villosis} ~~scabrescunt~~ ad centum villosis
satis ciliata flores ad apices ramorum spicatis in capitulo oblongo polli-
cari. Calyx imbricatus ^{ne villosis} ~~foliis~~ ^{ne villosis} ~~ovatis~~ ^{ne villosis} ~~obtusis~~ ^{ne villosis} ~~carinatis~~ ^{ne villosis} 7-8 margine
tomentosi ^{ne villosis} ~~concreta~~ ^{ne villosis} ~~in~~ ^{ne villosis} ~~aequalibus~~. Calycis foliola: lineari-lanceola-
tis obtusis dorso linea elevata, purpurascantia margine tomentosa
longitudinis unguem corollae. Corolla major quam in reliquis hujus
generis. Lamina subrotunda

— calycibus imbricatis margine tomentoso

~~Lanceolata D. foliis ellipticis obtusis glabris Lin. l. V. p. 239.~~

~~persa agriana satoreja foliis brevioribus Raj. dendr. 41.~~

~~Hadrya lanceolata Lin. Mant. 542~~

Habitat ad Q. b. p. 5 proliferi.

Rami canerei ramuli subverticillati terni vel plures
angulati vix pubescentes. folia prostrata sessilibus, ungui-
culana frequentissima ramulos pro imbricantia glabra
vel basi interdum ad centem subulata, supra plana pubes-
centinata, canna et margine punctata nec disposita
ciliata. flores terminales plures vix pedunculato
camena oblonga unguibus hirsutis primis

D. villosa foliis lanceolatis villosis imbricatis, capituli ter men-
tibus Thurb. prod. p. 43. cap. pag. 43

villosa
subulata

foliis lanceolatis glabris subulatis canna margine punctatis
floribus terminalibus aggregatis sub sessilibus.

Had.

~~an lanceolata Lin. eadem ac Diopma lanceolata speciem
maxime est mea Thymifolia~~

~~Had. lanceolata~~

~~Ciliata 9 foliis lanceolatis ciliatis rugosis Lam. 1. V. p. 234~~

ferrulata f

Intra forte genus africanum, prophylli hispida foliis, fructu opum, flori-
bus albis umbellatis Planch. amalth. 197. t. 411. fig. 3. Seb. mus.
2427. fig. 5. et folia ovata Seb. 2. tab. 96. fig. 6

Hastoya ciliata Berg

Habitat ad C. b. p. t.

Rami teretes, pubescentes sub verticillati e caesp foliorum
scabri. folia reticulata alterna vix unguiculata
interdum minor supra glaberrima ^{nitida} cilia subtilia
sub rugosis punctis plerumque flavescens adpersa
magna aculeoli vel pilis ciliata frequentia.

Pedunculi terminaliter ramulorum umbellati capillares
glabri purpurascens uti calyx. Corolla alba unguis
longitudine calycis longior et basi vix villosa. Nectaria

ut supra ad
coltam sine unguis
congesta

inferne hispida calyce parum longior

ferrulata

— ovato lanceolatis, subtus punctatis rugosis
pedunculis umbellatis

Hastoya ciliata

Rom var. 3. 8. 3.

Cineans D. Folio linearibus obtusis glabris patulis, floribus Vermenatis
Subsolanis Thuab. p. 1000 fl. cap. pag. 47.
Habitat in cap. b. p. 5

non vidi

de ruscifolia foliis linearibus patentibus oppositis, pedunculis axillaribus
festigatis

Habitat in C. b. per subseriellati

Rami seroti glabri, ramuli caeteri ^{rufescentes} subdichotomi. folia remota
revoluta inferna pollicana. Pedunculi in axillis ^{superis}
longi pollicares, medio bracteis binis. Calycis foliola ovata
pedala seplia

an Drosera linearis Thunb

~~an ros oppositifolia~~

Canicollata. D. foliis lanceolatis obtusis subpulchris, floribus axillaribus
geminis Herb. prodr. fl. Cap. pag. 43.

^{africana}
Spreng. fa. Turco foliis brevioribus Ray. denor. 91.

Dioscor. Canicollata. foliis ellipticis obtusis glabris Lin. S. V
pag. 239

Habitat in Cap. b. p. 5

an Canicollata p. 5 plant. et Mantua una eademque planta
mihi hinc nota

^{negosa}
Thymifolia D. foliis oblongis oppositis integerrimis subtus punctatis
floribus umbellatis terminalibus
Habitata in Pap. 6. Julii 5
Rami per intervalla sabaggegato ramuli villosi. Folii
vix petiolata ^{perovo} Thymi Thymi subternata, leviter subtus
villosa acutiuscula patula. Pedunculi et flores ut in
B. copiosi ^{reflexa nigulosa}

^{negosa}. foliis ovatis ^{negosi} villosis reflexis umbellis terminalibus

Synonym. Pluthecti in ciliato ^{prae} forte petri
~~plut~~

variat foliis glabris et pilosis

haec in herbano lin. sub nomine lanicolato asservatur. d. wesi
hinc a lanicolato ^{prae} plantanum

catifolia

D. foliis ovatis crenatis, pedunculis axillaribus solitariis Cauterelle
Sp. Her. Suppl. 155. + P. V. p. 239

Habitat ad Cap. b. p. et

Ramuli a D. pulchella tantum differunt videtur foliis duplo
majoribus pedunculis solitariis

Ramuli ^{sub} tetragoni ^{compositi} ^{punctata} ^{strepida} ^{lora} ^{nitida}
folia ^{opposita} ^{apice} ^{reflexa}
pedunculi ^{axillares} ^{resus} ^{apicem} ^{bibracteati} ^{foliola}
calycina ^{ovata} ^{crenata} ^{petala} ^{subrotunda} ^{conacea}
emarginata ^{intus} ^{alba} ^{extus} ^{purpurea}
corolla parva

Populivus petiolatus

Indetur esse duplex catifolia Thunb

uniiflora δ foliis ovato oblongis, floribus solitariis terminalibus L. b. V.
p. 239 Lin. Spec. p. 2074

Cistus humilis otheopicus; inferioribus foliis rosmarini sylvestris punctatis, Edenis autem serpylli subrotundis, flore carneo Pluk. mant
49. t. 342. fig. 5.

Habitat in Othequa ζ

Rami ultimi filiformes purpurascens pilis raris adpressis glabris
Folia sessilia, opposita oblonga semper unguiculata, supra glabra
in nervis subtus punctata, pilosa praesertim margine. flor.
magnis pediculis subtus villosiscula

foliis oblongis subtus pilosis punctatis fl.

ex b. d. de C. Martini in folio p. 12 L. b. V. in vasis
ulterior

marginata D foliis cordato attenuatis membranaceo marginatis hen Suppl.
pag. 155 & L.V. pag. 239

Habitat ad Cap. b. Spei^{superne}

Frutex erectus, ramulis ~~vix~~ pubescentibus. ^{subsepta cordata, ovata} ^{vel oblongo lanceo} folia ~~remota~~. Flores

lata subtus
pellucida
punctata
suprema fere
crenata

ex summo alii foliorum solitarii aut trii. pedunculis folio
longioribus. Nectaria 5. ex filamentis albis apice glandula
antenna nigra, basi bifida, capitello luteo. L.

bractea duo versus apicem pedunculi lineares calycis lacinae
ovata crenate serrata flores conaei intus albae extus purpureae

~~marginata~~ foliis cordatis inferioribus, superioribus lanceolatis

foliis ovatis lanceolatisque glabris subseptibus. marginatis pedun-
cellularibus solitariis geminisque

~~videtur esse ovata Thunbergii~~

nisi Thunb. sub nomine marginata ad eum ejus marginato non
convenit cum pedunculi axillares

Drosera marginata foliis cordatis, inferioribus ovatis superioribus lanceolatis, umbellis terminalibus Thunb. prod. pag

pulehella ^D foliis ovatis obtusis glanduloso crenatis, floribus axillaribus.

P.V. p. 2397 Lin. Spec. pl. pag. 2004

Hartogia pulehella Berg

Habitat ad C. b. Speitz

Rami teretes purpurascens, pubescentes uti ramuli ramuli
aggregati. Ternis vel quinis folia petiolata alterna ovata
semunquiculana vel minuta subtis in crenis puncto pellucida
do ceterum impunctata utraque glabra interdum ad marginem
opae tantis brevissime pubescentia. Pedunculi axillares, gemini
capillares uniflori folio longiores. Petala oblonga interdum

Pedunculi
bispunctati

uno vel altero ad eandem stylus glaber

Subtus impunctati

gemini

renata ^d foliis lanceolato ovalibus oppositis glanduloso-crenatis, floribus
solitariis Lin. Am. acad. 4. p. 300

Hastoyea betulina Berg. Cap

Habitat ad Cap. b. p. p.

Rami et ramuli subdichotomi glabri ^{superne angulati} teretes. Folia pet. brevi
ter petiolo oblonga ^{vel opposita} glabra, supra ^{superne} laevia subtus punctis ovum
se inaequali. Peduncululi axillares solitarii uni flori longitudine
foliorum ^{superne} bracteis ^{pubescentibus} minutis, filamenta pubescentia
Stylus hirsutus p. p.

subtus punctatis

Drosera betulina Thunbergii forte

Hast. betulina

Betulina D. foliis subovatis crenatis subtus punctatis, floribus axillaribus
bus solitariis Thunb. prod. fl. Cap. pag. 43
Habitat in Cap. b. p. 5

non vidi

umbriata *S. foliis ovatis mucronatis imbricatis ciliatis* ^{fr.} *Len. Mont. 124 (Feb 44)*
Loqua) S. V. p. 239x

Hastoya umbriata foliis ovatis mucronatis imbricatis *Len. Mont*
124x

Habitat ad Q. b. Speitz

Rami et ramuli prolixi hirsuti ramuli filiformes exserti.
Le tibi foliis ovatis acutis parvis ulcatis rugosi impunctati
alternis. Flores terminalibus copiosi in capitulo collo-
ti. Calyces glabri unguis petalorum capillari calyce duplo
longioribus pilosis

Hastoya ulcata Bergii

~~aut refer~~ *Synon: Platan. ad ulcatis et in hinc o allata*

acuta *umbelli terminalibus*
longissimis pilosis *unguibus petalorum*

Bergii H. ciliata ~~*gotte hinc pectus ubi et Platan.*~~
~~*tab. 411. fig. 2.*~~

Tetragona D. foliis cordatis velusis complicato-cannatis ciliatis, ramis unis
non ven. Suppl. p. 155. & L. S. p. 239

Ita abibat ad Cap. b. p. 5

. Inagulan et a reliquis facile distinguendus foliis valde
approximatis, et caulis illi totus obtusus evadit, unde rami
de tetragoni sursum incurvati et flore terminante, magno
folitano. Folia latiora quam longa, ~~complicata~~ can
acumina patente ten

barbiger *L.* foliis cordatis amplexicaulis, petalis barbatis *Lin. Suppl. p.*
155 + L. V. p. 239.

Habitat ad Cap. b. spec. 5

Onites ramis dichotomis oppositis glabris. Foliis opposita
mucronata ^{amplexicauli} arena, nervis glaberrima subtus venatim puncta
in femurquidulana. Pedunculis ex apice ramorum umbellis
5-6. angulatis unifloris bracteis ciliatis parvis involutis. Calycis
pentagonus glaber. Petala supra barbata

acuti glabris umbellis vernalibus