


Liospyros

1. Lotus L. foliis lanceolato-ellipticis attenuatis, subtus villosi carnescentibus
gemmis hirsutis paginis discoloribus
2. virginiana L. foliis ellipticis acutis, paginis concoloribus
3. hirsuta L. ramis folisque subtus villosi, foliis ellipticis obtusi, floribus axilla
ribus congestis sessilibus
4. hirta L. ramis ^{anice} tomentosis, foliis ^{tripartitis} ovatis ^{unicloris} ~~obovatis~~ acuminatis, subtus ^{pub} pubescentibus,
pedunculis solitariis bifloris cernuis
5. Comersonii foliis ovato-oblongis reticulatis, floribus lateralibus sessilibus soli
tariis
6. glutinosa L. foliis lanceolato-ellipticis racemis axillaribus brevissimis
fructibus pulvere levis
7. ebena Pers. foliis ovato-oblongis, floribus solitariis axillaribus sessilibus fructibus
glabris
8. ebenum L. foliis oblongis emarginatis glabris pedunculis axillaribus subtrifloris
~~nectar~~ ^{L.} revolutis

9. *Tetrasperma* D. foliis membranaceis nitidis cuneiformibus; calicis Tetraspermi
10. *buxifolia* D. foliis obovatis glabris, floribus axillaribus seplibus; corollis hirsutis

Embryopteris Gothieri et la marthii Ravanello Rheed. Bot. 3 tab 41.

221
Thouin
Dio. pyros Com. mes.
Stems aculeate, plures sesquialter
compreser.
villosus. Rami compressi, canescentes. Folia ovato-oblonga, subtus canescen-
tia
gemmis imbricatis
capsula truncata ex h. mes.



Euphyros

revoluta Diospyros foliis obovatis nitidis, pedunculis unifloris, laciniis corollae
revolutis

Habitata in Montserrat ab Ryan &

Rami virentes, saepe purpurei, glabri, superne compresso angulati.

Folia petiolata, alterna, tri- vel quadri-polluciana, utrinque glaberrima,
venosa, supra nitida, submarginata, basi acuta integerrima.

Petioles semivngui-ulares.

Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, reflexi, glabri, longitudine petioli

Stemma phroditi flores

Calyx inferus, persistens coriaceus, profunde quadrisfidus: laciniis ovatis
e marginibus reflexis aut rotisum concavis, obtusis.

Corolla coracea, ~~sub~~ superne valde crassa, urceolata, ungui-ulari

Tubo semivngui-ulari, calyce longior, basi tetragono, quadrigibbiter
gibbiter cum laciniis calycinis alternantibus. Limbo quadrisfi

Dui laciniis rotundatis, latioribus quam longioribus, quam longioribus

Tubo dimidio brevioribus, revolutis, marginibus alter altero incumben
~~te~~

Raminae filamenta, nulla breviora in fundo tubi, S. alterna breviora.

Antho ovata

interius in herb

no 15.6. et n: 55 inter spec.

Germe superum, ovatum, in stylo acuminatum. Stigmata 4. acuta
Pericarpium globosum, magnitudine Caropi, & Loculari. Semina parva oblonga

^{ma pili}
Feminae flores in distincto individuo.

Calyx et Corolla ut in hermaphrodito facie angustis pino.

Stamina interdum 14.

Germe superum. Stylus et hemisphaerium, Stylus et Stigma nullum
(Affinis videtur Diop. Tetrasperma Sw. differt, ut cogito, foliis floribusque
majoribus, calycibus, foliis nec baccis & Locularibus

- flos magnitudine natalati. b. corolla c. apex longitudinaliter aperta, e. Stamen.

d. Calyx cum pistillo f. Pistillum. g. Baccis h. eadem transverse secta. 4.

semen

rarefusa
Tetrasperma
Diophas. foliis membranaceis nullis c. majoribus, pedunculis
virescentibus, vix carinis, costis revolutis.
Diophas. foliis membranaceis nullis c. majoribus, pedunculis
virescentibus, vix carinis, costis revolutis.
Tetrasperma Sw. pedic. fog. 62.
L'Herminier in Montserrat ad Oryz. 5.
Hern

Habitat in Guinea 48 et 5.

Rami verdes, fusco-purpureascentes, apice e tomento ^{feruginei} levi. folia petiolata,
alterna lanceolata 3-4 pollicaria, lanceolato-oblonga, integerrima
obtusiuscula, utrinque glabra, tenuiter varosa, supra nitida. Peduncul
li axillares, 2 obtusis, unguiculares, e tomento tenui feruginei uti flores,
bis vel 3 trifidi. Calyx monophyllus tubulosus, quinquefidus; laciniisova
lis. Corolla monopetala, tubulosa. ^{parvis} filamenta 10 brevissima. anthera
longitudine corollae. Pistillum 0.

Disopyneris

Diospyros argentea Koenig.
Folia progerminantia pile-
finitate sunt argentea, adul-
ta multo minus lucida.
Habit. ad pedes montium
latius frequens.

tetrasperma Diopyros foliis membranaceis nitidis cuneiformibus, bacis tetra-
spermis Schw. prodr. p. 62.
Habitat in Jamaica 5

latifolia Droopyros foliis ovatis obtusissimis subtus tomentosis, floribus
axillaribus solitariis.

Habitat Suratta

Prami Verites, superne pallida ferrugineo tomentosi. Folia petiolata,
5-6 polliciana, pollicis 3 vel 4 lata, utraque rotundata, integri-
ma, membranacea, tenuissime venosa, supra glabra, subtus villosa
tomentosa. Pediculi axillares, solitarii, brevissimi, uniflori. Calyx
profunde foveus: laciniis ovatis, acutis, uti corolla tomentosis.

Diospyros

Habitat in America septentr. Richard
Rami alterni, villosi, patentes. Pedunculi axillares, brevissimi, biflori.

Senecio Dufrenoyi

Habitat in St. Domingo. Herb. Desfont. 5
Rami teretes, flexuosi, glabri. Folia petiolata, alterna, pollicaria, oblonga
sub-ovata, glabra, tenuis fere venosa, integerrima, utraque obtusa, interdum
emarginata. Petioli brevissimi. Flores papillati, axillares, solitarii, senecio tomen-
tosi. Calycis laciniis ovatis, corolla laciniolata

nitens Diopyros

Habitata India Orientali herb. Guss.

Rami teretes, quique. Folia petiolata, vix pollicaria, obovata, interdum emarginata, integerrima, supra nitida, subtus venosa. Pedunculi axillares, solitarii, brevissimi, uniflori. Calyx persistens, In tubus: laciniis ovato, acuta. Fructus peso Duplo major, glaber. Semina fusca, nitida, oblonga. Bacca an trilobulata? Dubii generis.

rari emiflori. *Drospyrus*?

Habitat in India orientali herb. La Martini.

Rami pubescentes. Folia petiolata, pollicaria et ultra, ovato-oblonga, glabra, obtusa, integerrima. Cal. urceolatus, persistens, inferus. Cor. monopetala, quadrisida. Sepalamenta 4. epipetala. Stigma, uti Stylus 1. unicurvum forte *Terseola* congener

Polyandra Drospyros

Habitat in Madagascari herb. Fus.

Rami alterni, teretes, glabri, cortice cinereo, juniores purpureo-ferrugineo. Folia petiolata, alterna, sesquipollicaria, lanceolata, integerrima, coriacea, venosa, glabra, acuta. Petioli simpliciter angulares. Flores axillares, solitarii, brevissime pedunculati, ante florescentiam imbricati breviter subrotundis glabris margine villosi. Calyx unicolor, quadrifidus, extus hirsutus. Corolla tubo corollato, quadrilobo. Stamina numerosa, una corolla inserta. Stylus 1. Stigma capitatum Fus.

nitida Diopisus

Habitat in insula francica herb. Guss.

Rami teretes, flexuosi, glabri, cortice cinereo. Folia petiolata, bipollicaria, utraque angustata, apice obtusa, subionacea, supra nitida, asenia, subtus rufo-ventosa, glaberrima, altero latere interdum angustiora, integerrima. Strobili axillares, solitarii, sessiles.

Calyx coriaceus, quinque-dentatus. Corolla tubulosa, quinque-fida, patens: laciniis coriaceis ~~oblongis~~ obliquis. Filamenta 10. Stylus 1. Capsula texta calyce magnitudine Coryli, non fragilis, uniloculari. Semina 2? Guss.

Dodecandra Trochiloides floribus axillaribus Dodecandra, Baccis lenticulari-
bus Lour. fl. Cochin. pag. 228.

Habitat in Cochinchina &

Arbor magna. folia lato-lanceolata, integerrima, alterna.
flores albi. Tubus corollae subglobosus limbus 4 fidus. Stamina
10. in fundo tubi. Baccia compressa lenticulari & prima

221
pertinet uti Paraleuca Aubl. ad Embryopteris Gardneri Turp.

non vid.

Lobata *Diospyros* foliis ovato lanceolatis utraque glabris. Pedunculis 1 floris
axillaribus. Bacis 4 lobis Lour. fl. Cochinch. pag. 227
Habitat in Cochinchina ♀

Arbor octopedalis. Folia parva integerrima, pallida venter
petiolata alterna Stamina 8. antheris brevibus in pagulo. flores
albi hermaphroditi. Corolla tubi tetragona ventricosa. Limbo
4 fido. Massa lutea pollicaris & Coicuntani compressa sperma

hebenaster Lohr. Amph. amb. l. 4. Cap. 5. Tab. 6 *Diospyros* Decand.
Lour. on eadem ac ebenaster nostra folia fultu lanuginosa
tenuis. Loureiro laicinus corolla pilosa

non vidi

bursera folia D. foliis obovatis glabris floribus axillaribus simplicibus corollis hirsutis
Piptia burserifolia Kottb. in nov. act. Hofn. 2. p. 536. Tab. 4. fig. 2.
Habitat in India orientali
Rami teretes glabri folia petiolata alterna sub ovata seu
vix pollicaria, glabra supra avenia subtus venosa integerrima
floris axillaribus 3.4. parvis calyx 4dentatus

vix hujus generis factus Euclea

argentea D. fruticosa foliis oblongis villosis flombus axillaribus subternis
Habitat in India orientali In Kottler ^{principales}
Rami cortice cinereo fraxi flexuosi ramuli villosi canescentia
solia bentes petiolata, alterna pollicaria vel minor, oblonga
integerrima, obtusa villosa, juncea canescentia adulescentia
supra glabrescens. Petiolus canescens. Pedunculis axillaribus
brevissimis ternis unifloris. Flores parvi nutantes calycis villosi
unicano sunt parvis breviter semivincularibus

carolinianum A-folus trilobis ^{subtus} serrulatis glaucis, flentibus mononormis,
paniculis unifloris aggregatis Walt. fl. carol. p. 251.
Habitat in Carolina 5

non vidi

Lotus β foliis lanceolato ellipticis attenuatis ^{vellosi} subtus canescentibus gemmis
herpeticis

Pseudo Lotus Cam. epit. 156

Lotus africana latifolia Bauh. pin. 447.

Diospyros Lotus foliorum paginis discoloribus

β Lotus africana altera Cam. epit. 157.

Lotus africana angustifolia f. feminea Bauh. pin. 447.

Habitat in Europa australi et maunitana &

ramis teretes ramuli junioris pubescentes. Folia petiolata
subtus villosa.

Lotus Dioppyros ^{7 Scopinyros} foliorum paginis in floribus L. S. V. pag 910

Sardylus trapezuntinus Torvaldei flora Constant. nop. pag XXXVI.
no 4 Pl.

virginiana 2 ~~foliis~~ ^{aiuto} ellipticis fraginis concoloribus

Loti africano simili indica Bauh. pin. 44 P

Guajacana loti arbor affinis virginiana Pechumia dicitur Plukn.
alm. 100. v. 244. fig. 3.

Guajacana Pateff. Cor. 2. p. 76. t. 76.

Diospyros Virginianum foliorum fraginis concoloribus. Lin. l. v

Mill. G. t. 126.

Habitat in America septentrionali;

Rami teretes glabri. Folia petiolata, alterna quadrangula
canâ aiuto venâ int. edum emarginata venosa. flore
axillari subsessili

Commespni *D. folio ovato oblongo reticulatis floribus lateralibus sessilibus
foliatis*

Habitat in Insula Francia

Rami teretes glabri cortice cinereo. Folia petiolata alterna
bipolliciana basi subcordata integerrima convexa glaberrima
ma. floes infra folii sessiles remoti.

fructificationem non vidi sub nomine *Diopis* a Thourus
habui

~~Chenopodium~~
~~glutinosa~~
~~glutinosa~~

^{racemus axillaris brevissimus}
Diospyros foliis lanceolatis ellipticis pedunculatis axillaris
trifloris ~~quod~~ ~~floris~~ ~~caeruleis~~ fructibus pulverulentis

~~Habitat in sylvis Zeylone frequens König~~
Habitat in sylvis Zeylone frequens König
Habenstrum Rumph. Amb. Tom. 3. pag. 15. Tab. 6.

~~Diospyros chenopodii foliis ovale oblongis coracis gem-
mas glabris Retz. off. 5. p. 31.~~

~~Diospyros Ebenum L.~~

Habitat in sylvis Zeylone frequens König
Hermapht. Rami teretes glabri cortice flavescente longitudi-
naliter rugos. Folia petiolata alterna glaberrima
coracica venis reticulata integerrima fruticosa
Cuneolatis oblonga ^{angustis} pedunculis axillari unguicula
res. Calycis magni cordato ovati obtusi pollicares
conici cum rudum ^{pernumerantur peris rhombus cineris} gemmiferis ferrugines tomentosis
Semina octo styli 4or. fructus pulverulentis tomentosis
diametro sequi pollicaris globosus
mar. Ramis foliis glaucis calycis minori rotundato corolla
glabra floris in racemo brevissimo folia tenella
tenica
variosa lupis singulari foliis latioribus pedunculis pedicellis
nie atro pulchris.

ebenaster D. foliis ovato oblongis floribus ^{solitariis} axillaribus sessilibus fructibus glabris

Diospyros ebenum glaberrima foliis oblongis utrinque glaberrimis
conacis venoso-reticulatis floribus axillaribus solitariis
sessilibus her. suppl. pag. 440.

Diospyros ebenaster foliis ovali oblongis conacis geminis glabris
Pretz. obs. 5. pag. 31.

Ebenum album Rumph. herb. 3. p. 9. Tab. 3. folia tantum.
non fructus

Habitat in India orientali

Rami teretes cinerei glabri. Folia petiolata ovata ^{cap.} integerrima
bipollicaria acuta variosa vix tamen reticulata

Fructus sessilis magnitudine non pruni

Benardes
~~Glucifera~~

ovali - oblongis
Diospyros foliis ~~lanceolatis~~ ^{ovali - oblongis} utrinque glaberrimis coriaceis vengo
reticulatis

Diospyros benardes foliis ovali - oblongis coriaceis, gemmis glabris Retz. off.
s. p. 31.

Rami rugosi flavescerites apice pallidiori, glabri, cicatrifati.

folia petiolata alterna, Podrantaia.

^{glaberrima si videri}
Pedunculi axillares folitarii ^{ter min} triflori interdum breviflori ^{semin} ~~semin~~ ^{semin}
quiculares cinerei ^{vel utra} villosi ^{et t} ~~per~~ ^{per} ~~pedicelli~~ ^{pedicelli} ~~semin~~ ^{semin}
^{maxilli} Flores terni vel varicosi quini

Calyx perianthium quadripetalum ^{pedic} laciniis rotundatis tomentosis

^{griseis cinereis}
Corolla ^{lineolata} monopetala calycis triflori longior, glabra purpurea coriacea
laciniis quinquefidis laciniis ovatis obtusis ^{marginibus} linea villosa
a basi laciniis ad apicem extensa

Stamina filamenta nulla anthera lineares numerosa longitudine

^{corolla}
Pistillum nullum.

(Koenig)

foemina Pedunculi uniflori ^{crassis} ^{crassis} ^{rigidi} ^{tomentosi} ^{patentes} ^{fimi}
Calyx ^{quadripetalus} ^{laciniis} ^{cordatis} ^{ovatis} ^{obtusis} ^{coriaceis}
pallidioribus. Corolla decidua.

nei Stamina
Ger men ovatum pife major, femineo pulverulento tomentoso. Style
si que glabri, bifidi laciniis reflexis
Pencarium Pomum magnitudine Pomi minoris pulverulento tomentoso
Semina 8. vel 10 glutine obvoluta
Gemma tomentoso-fereca.

Alcam huius simillimaria ad folia ~~ovata~~ ^{ovata} ~~et~~ ^{et} ~~lobatis~~ ^{lobatis} ~~alutibus~~ ^{alutibus} basi ~~ovatis~~
~~truncatis~~ ^{opariis} racemulis axillaribus ~~racemosis~~ ^{brevis simplicibus} terminali com-
posito, racemulis alternis pedunculis pedicellis nigri ~~caulis~~ ^{albis}
hirtis Calycis profundiis diversa ~~stamina~~ ^{stamina} ~~ultra~~ ^{ultra} ~~virginat~~
vix tamen fructu diversa
In ebeo pedunculi ~~bifidi florum~~ ~~florum~~ ~~inflori~~ ~~florum~~ ~~sepales~~

ebenum D. foliis oblongis emarginatis glabris pedunculis axillaribus
subtrifloris

Dioppyros ebenum Koenig in Act. Lund. 1. p. 3. pag. 176.

~~Dioppyros ebenum glaberrima, foliis oblongis utrinque glaberrimis
coriaceis venoso-reticulatis, floribus axillaribus solitariis
sepalibus. Lex. Suppl. pag. 440. S. V. p. 910.~~

~~Dioppyros ebenum Rottb. in ^{nov} Act. Harum. Ten. 2. Tab. 5. (plan
ta malabaria)~~

Habitat in Zeylona et Malabaria

Rami teretes glabri parvi, supi. Folia breviter petiolata
alterna, bipollicaria, subopposita tenuissime venoso
reticulata supra nitida. Pedunculi axillares solitarii
breves ^{br.} triflori ~~et~~ floe sepalis

Dioppyros ebenum foliis ovato lanceolatis acuminatis
gemmae hirsute Petrus off. 5 pag 31

Eben. in Supplement. diversa est planta a Koenig in Act. Lund.

Kathi D ramis tomentosis, foliis ovatis utraque acuminatis subtus pube-
scentibus, pedunculis solitariis bifloris cernuis Lin. Suppl. p. 439.
S. V. p. 918.

Ki f. Kathi Romph. am. ex p. 805.

Dioscor. Dios Kathi; pedunculis tripartitis Theob. fl. jap. pag. 1574

Habitat in Japonia ?

Kathi S. ~~fo~~ ramis superne tomentosis foliis ovatis subtus pubescentibus
pedunculis tripartitis cernuis
ramis terete inferne glabris. Colia petiolata, acuminata
integerrima subtus pallidiora ^{pubescentia} reticulato venosa supra glabra
Pedunculi axillares tomentosi unguiculares pedicelli uniflori
Pomum oblongo ovatis tetragonum. varietas β foliis utraque glabris
oblongo ovatis Flores in ramulis approximatis subsessile
Pomum ovatum Thunberg
varietas β . forte eadem cum hispida Lin.
Pomum coronatum quod non in reliquis

hispidata D. ramis folisque subtus villosis, foliis ellipticis obtusis, floribus
axillaribus congestis sessilibus. Lin. Suppl. 440. t. V. p. 910
Habitat in Zeylona &

Diospyros *hathi* var. *beta* - Thunb. forte

michi ignota

Tetrasperma *Desfontainii* foliis membranaceis nitidis cuneiformibus, basi
Tetrasperma Sw. prodr. pag. 62.
Habitat in Jamaica

michi ignota