

Dodonaea

1. *vejiosa* L. foliis lanceolato-oblongis
2. *angusti* L. foliis linearibus
folia

2 angustifolia Dodonaea foliis linearibus Len-Suppl. p. 210. T.V. pag. 362 P.W. obp.
1557
Habitat in ~~India~~ australi Cap. b. Spei t.
A S. viscosa sic differit nisi foliis multo ~~et~~ angustioribus obtusioribus.
Polygama marci in distincto frutice

1 viscosa Dodonaea foliis lanceolato-oblongis Lin. Suppl. pag. 219. S. V. pag. 362
arborescens viscosa, oleagni foliis hinc vixantibus, americana Vireo cecos Pluk. alm
Phyt. 141. fig. 1.
Ocni-f. Paluro affinis, angusto oblongo ligustri folio, flore tetrapetalo herbaico
Stoan hist. 2. p. 27. t. 162. fig. 3.
Staphyloedenoron foliis lauri angustis Plum. G. 247. fig. 2.
Caryophyllaster littoreus Rumph. amb. 4. p. 110. t. 50.
Carpinus viscosa, foliis integro oblongo Burm. Zeyl. 5. 5. t. 23.
Triopteris erecta fruticosa, foliis oblongis acuminatis ramulis gracilibus Brown
jam. 191. t. 18. fig. 1.
Ptelea viscosa: foliis simplicibus Lin. spec. pl. pag. 173. *

Habitat in hodiis, locis arenosis &

glaber Ramis e linea e costa folii decurrenti ^{uni} angulati; apice antipetes.
Tolia integerrima, basi in petiolum attenuata, bipollicaria ^{ultra} ^{filiformes unipollicaria}
Supra sycamis lucidis, subtus pallida. Pedunculi terminales cum ^{apice}
foliis, subramosi filiformes unguiculati.
Stamina internum 6-8