

Doronicum

1. *paralyticum* L. foliis cordatis obtusis denticulatis: radicalibus petiolatis ovatis, caulinis amplexicaulis
2. *melancholicum* foliis radicalibus petiolatis cordatis dentatis, caulinis sessilibus ovatis
3. *plantagineum* A. foliis ovatis acutis subdentatis, ramis alternis
4. *rotundifolium* A. foliis ^{ovatis} subrotundis dentatis: radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulis
7. *bellidifolium* A. caule nudo simplicis fimo uni floro
acaule
5. *lorifolium*
6. *ramosum*

aurinaium Dor. foliis denticulatis & summis lanceolatis amplexi-
caulibus, inferioribus spatulato-ovatis, radicalibus cordatis
petiolatis Walden: Phytogr. pag. 12.

Poroncium aurinaium Jacq. fl. aust. tab. 130

Habitat in Austria alpibus &
^{superne pilosa pubescente}

Stem radicalia obusa obtuse denticata, ~~superne pilosa pubes-~~
~~pubescentia~~: caulibus inferiora amplexicaulis argute
denticata

describenda ulterius secundum specimen herbarum

nudicaule Torrionium

Habitat in Carolina Herb. Nech.

Caulis herbaceus, simplex, superne in pedunculatos densos, pubescenti. Folia pubescentia:
nuda alia sesqui-polliciana, oblonga, integerrima, obtusa, acuminata, crenata, ex trochlo
obscure denticulata: caulina opposita, remotissima, 4-6 partium, lanceolata. Pedun-
culi superne 3-4, raris unicus, longi, nudi, pubescentes. Calycis foliola villosa
lanceolata. Corolla flava. Pappus simplex

an hujus generi cum folia opposita

1. *Pardalanches* *Doronicum* foliis cordatis obtusis denticulatis: radicalibus petiolatis; caulinis
plexicaulis L. S. V. pag. 760. Mell. Diet. tab. 120 ^{ovatis}

Doronicum auct. 7. sive *Austriacum* 3. Clus. h. 2. pag. 19.

Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus Bauh. Pin. 105.

13. *Doronicum* latifolium

Aconitum *Pardalanches* minus Lenz.

Doronicum latifolium Clus. h. 2. p. 16.

Doronicum radice scorpiae Bauh. Pin. 104.

~~V. *Doronicum* austriacum Jacq. fl. Austr. vol. 2. t. 30.~~

Habitat in Alpibus Helvetiarum, Pannonia, Valleja. 4

Caulis ramosus erectus, sulcatus subpilosus. Folia radicalia, petiolata, elliptica, ovata, obtusa, denticata, pilosa, nervosa. Caulina superiora inferiora panduriformia, superiora ample cordata, amplexicaulia, dentata. Pedunculi nudi. Flores apicem, pubescentes, uniflori. Soliola calycina lanceolata, tubulata pilosa.

~~V. differat maxime quod radix lignifera et parum prolifera sit, in Pardalanches autem radix in omnem ambitum capitulo et longa distantia surculata dividat. Lenz Murray. l. c.~~

2 melastemum *Coronidium* foliis radicalibus petiolatis cordatis dentatis; caulinis sessilibus geminis
alternis.

Coronidium nigra radice, Campoclarense Colum part. 2. pag. 36.

Habitat ad Capoli apenninis Caroleni.

Caule herbaceo erecto, striato glabro uti tota planta. Folia radicalia longe ^{longius petiolata}
petiolata, cordata acuta, dentata, subangulata venis nervis; caulina
^{inferne duo} ovata, alterna, sessilia denticulata, superne duo ^{opposita} remotissima, lanceolata
ciliata sicut unguiculata. Flores terminalis solitarius. ~~Caules~~ Foliole cili-
cui ~~ov~~ lanceolato-pubulati. Flores triplo minor quam pardalicanthis

6 plantagineum Doronicum foliis ovatis acutis subdentatis, cernis a cernis

Doronicum primum Cob. adv.

Doronicum angustifolium Clus. h.

Doronicum minus officinarum Salech. h. 1202.

7. Doronicum plantagineum foliis lustranum Tournef. F. R. H. 488.

Habitat in Lusitania, Hispania, Gallia &
Caulis ramulosus.

retardifolium
21 altanicum Toronicum foliis subrotundis dentatis: radicalibus petiolatis caulinis amplexi-
altanicum caulibus

Habitat in Siberia crassitie pennae cygneae

Caules herbacei, simplex, erectus, sulcatus, glaber uti omnia. Folia subrotunda
dentata, bi polliciana, obovata, frequent approxiamata. Flores terminalis

+ magnitudine Amelae
montani. Receptacul.
interiorum basi gemini pedunculatus. Calyx glaber foliis ovato lanceolatis

Coriifolium ~~et~~ caule subsimplici, foliis glabris. Dentatis. Walt. fl: var
nuy 205
Habitat in Carolina

novi

ramosum

D. caule ramoso, foliis lanceolatis puberulis sessilibus -
Walt. Carol. pag 205

Habitat in Carolina

non vid.

5. *Bellidifastnum* *Doronicum* caule nudo simpliciter apice unifloro L. S. V. p. 769 Jacq. Vind. 285*. *Bl.*
austri. vol. 4. tab 400.

Bellis media Clus. h. 2. p. 44. Hall. opusc. 174*

Bellis sylvestris major sylvestris Lob.

Bellis sylvestris media, caule carente Bauh. Pin. 261.

Bellidifastnum alpinum, foliis brevioribus hirsutis, caule palmari, flore albo Mich.
gen. 32. t. 29.

13. *Bellis* caule pedali s. bipedali nudo, foliis magnis, floribus nigris et albis Mentz. pug.
t. 2.

Habitat in Alpibus Helveticis, Italiae, Tyrolenseibus locis umbrosis &

Folia medicinalia, obovata, petiolata, ^{pedunculata} ~~dentata~~; dentibus utrinque quatuor, periclypifera
obscure triplicinervi avenia. Scapus erectus, digitalis, saepe semipedalis, pubescens
versus, florem tomentosus, cerni floris, apophyllus. *Calicula* calycina lanceolata pu-
bescentia.

Semina reddi in hac etiam papposa sunt. L. Sp. pl. pag. 1248.

caule

D. scopus auct. simplicifloris multifloris Tomentosi Walt Carol.

pag. 208.

Habitat in carolina

non vidi