

# Dorstenia

1. Houstonia D. - f. capis radicatis, foliis cordatis angulatis acutis, receptaculo quadrangularibus
2. cordifolia D. - f. capis radicatis, foliis cordatis ovatis denticulatis, receptaculis orbiculatis
3. contrajerva D. - f. capis radicatis, foliis pennatifido-palmatis serratis, receptaculis quadratis
4. Drakenia D. - f. capis radicatis, foliis pennatifido-palmatis integerrimis, receptaculis ovalebus
5. caulescens D. - pedunculis caulibus, foliis dentatis
6. lucida D. - caulescens, foliis oblique ovatis integris lobatis, pedunculis cymosis axillaribus
7. pubescens D. - caulescens, foliis oblique ovatis serratis-dentatis, subpilosus, capitulis axillaribus pedunculatis

ad monoeciam revertit secundum Sprengel in Schreb. Journ. f. die bot.

cordifolia Docteria

Habitat in Pen herb. Jusf.

Herba palmaris. Caulis villosus. Folia cordata, oblonga, bipollicaria, ob-  
tusè dentato-repanda, supra glabra, subtus in venis majoribus pilosa.  
Petioli longitudine folii, villosi. Receptaculum orbiculatum dentatum.

Fabianus H. Pen

brasilensis *Drosera* foliis cordatis oblongis obtusis, scapi folio brevioris, receptaculo orbiculato.

Habitat in monte video Commeson

Folia radice alba, petiolata, 1-2 pollicaria, supra scabrum, subtus villosa, venis molles, venosa. Petioli folio saepe longiores, villosi. Scapi petiolo breviores, cum foliis in bulbo squamoso collecti, magnitudine Ceryli <sup>avenae</sup>

anfolia *Dioscorea* foliis cordatis sagittatis lato-lanceolatis dentatis subtus scabris  
Habitat in Brasilia Dombey herb. Puz.

*Squamopus*  
Caudex 4 pollicaris, crassitie penna cygneae. Folia ex apice pene semipedalia, un-  
dique dentata, auriculis extrorsum dente lanceolato longiore, venis supra glaber-  
rime, nitida, subtus venis villosis. Petioli foliis longiores. Scapi petiolo brevio-  
res. Stipulae angustiores, angulati. Receptaculum ovale, semipollicare.

*Dorstenia tuberosa* Scapis radicalibus, foliis cordato-oblongis denticulatis  
receptaculis ovalibus basi subcompressis fl. Peruv. t. pag. 65. Tab. 102. fig. 6.

Habitat in sylvis Chinchao.

Radix tuberosa, obovata, dorata. Folia radicalia, prostrata, petiolata, cor-  
dato-oblonga, obtuse serrata, <sup>inæqualiter</sup> venosissima, nigosa, aspera, subtus villo-  
sissima. Scapi 2-3. 4 radicales, longitudine fere petiolorum, curvati  
simplicissimi. Receptaculum tubiforme, in flore violaceum, in fructu  
album, parum carnosum, margine denticulatum. Flores numerosi  
masculi et feminei a distinctis lobis alveoli minimi loco calycis  
Cor. nulla. Stamina 2. a singulo alveolo. Anthera didyma. Germen ovatum  
in alveolo membrana secto. Stylus exsertus. Stigma bifidum. Semen 1. in singulo al-  
veolo, ovatum fl. Peruv.

Similes quam maxime *Dorst. a. tris.*

Chinesis Diffencia pedunculati caulinis petiolis 3-5 phyllis Louren fl.

Cochinch. pag 90

Habitat in provinciis borealibus Chinae

Radix fusiformis. Caulis erectus perennis tuberosus, Vases simplex

Folia laevigata lanceolata cat. eximiam glabra. Petiolus

longus, receptaculum laterale subcarnosum subovale, calyx  
tridentatus Louren & pictura Chinesis

non vid.

2 cordifolia D. Jacq. rad. iatis foliis cordatis ovatis denticulatis, recis  
laculis orbiculatis Sw. prod. pag. 34. obs. pag. 514

Doiffenia cordifolia La Mark. Encycl. 2. p. 317. 2.

Habitat in Jamaica, Domingo &

Floris masculi in d. pio vasis radum, foemineae in medio

~~Planta digitata~~ petioli filiformis glabrisculi bypollisari,  
folia petiolo interdum longiora interdum breviora obtuse  
nervibus obscure venosa obsolete denticulata glabra costa  
subtus villosa Jacq. petio brevior filiformis

brasiliensis D. fraps radicatis foliis cordato-ovalibus obtuse venatis  
receptaculis orbiculatis La Mart. Enc. pag 329.  
Habitat in Brasilia et ad magellanicam

non vid.  
Dorsteniam caulif. Lin. ad proinde refert La Mart. qui  
genere non differt a Boehmeria



an folia *Dorstenia scopuli radicata*; folia cordato-fagittatis undulatis  
subdentatis maximis, receptaculis ovalibus La Mark & E. pag. 329  
<sup>tab. 93. fig. 3</sup>  
Habitat in Brasilia  
variet folia laciniatis

non vid.

2 Contrajerva *Dorstenia scapis radiatis*, foliis pinnatifido-palmatis serratis, receptaculis quadratis  
L. V. p. 161.

*Draheana radix* Cliff. exot. 83.

*Cypripis longus odoratus peruvianus* Bauh. Pin. 14.

*Turpatis* Her. n. Mex. 147.

*Dorstenia sphaerodyli* folio, dentato radice Plum. g. 29. f. 119.

*Dorstenia* Dentato radice, sphaerodyli folio, placenta ovali Houff. Act. Anst. 1721.

fy. 1.

*Dorstenia scapis radiatis* Hort. Cliff. 32.

Habitat in nova Hispania, Mexico, Peru, Tabago insula Vincentii ?

Folia pinnatifida palmata & canis, <sup>serrata</sup> dentata, gl. scabra subtus  
pallidiora laciniis can oblongo angulata.

Drakena Doffenia *Scapulis radiatis, foliis pennatis, fido palmatis integerrimis, ree epistaculis ovali-*  
*bis L. S. V. pag. 163.*  
*Doffenia dentata radice, sphondylii folio, placenta ovali Horst. Act. Acad. n. 421. f. 2*  
*Habitat in vera Cruce 2*

non vidi

4- Caulifera *Dioscorea pedunculata* caulinea Hort. Cliff. 32. L. S. V. 163.

*Panicum racemosum*, foliis ad oras villosis Plum. 4c: 120. f. 1.

Habitat in America meridionali 4

Caulis <sup>erectus</sup> articulatus, articulis ~~superne~~ <sup>intermedias</sup> ~~in~~ <sup>lateralibus</sup> ~~superis~~ foliis ovato petiolata opposita  
acutiuscula <sup>dentata</sup> ~~dentata~~, trinerviâ. Pedunculi ~~axillares~~ <sup>ramosi</sup> Plum.

foliis ovato oblongis, serratis pedunculis axillaribus solitariis

1. Houstoni *Dorstenia scapis radicatis, foliis cordatis angulatis acutis, receptaculis quadrangulis*  
L. S. V. p. 163.

*Dorstenia dentata* radice, folio minus laciniato, placenta quadrangulari et undu-  
lata Hout. Act. Angl. n. 421. f. 2.

Habitat in Campechia ?

~~*Dorstenia cordata* L.~~

non vidi

6 lucida *Doffenia caulepenni*, foliis oblique ovatis integris lobis, pedunculis cymosis  
axillanibus. *Doff. prod. n. 50*  
*Elastostema pedunculatum* *Doff. Gen. 53. n. 1.*  
Habitat in Societatis insula

non vidi

♂ pubescens *Dioscorea caulescens*, foliis oblique ovatis serrato dentatis subpilis pediculis  
axillaribus.

*Elatostema axillaris* Torr. Gen. 53. n. 2.

*Dioscorea pubescens caulescens*, foliis oblique ovatis serratis pubescentibus: pedunculis  
axillaribus capituliferis Torr. Prodr. n. 54.

Habitat in societate in filiis.

Caulis angulatus. <sup>glabris</sup> Folia brevissime petiolata, alterna, ovata, altero latere obliqua  
serrato dentata, supra rora pilosa; pili minuti; subtus pallida. Pedunculus  
axillaris, solitarius, receptaculis glabris