

Gracena

Asparagoides Graciosa

Habitat

herb. Ausp.

Rami teretes, crassitie filii emporctici, remote oblique annulati, glabri, cinerei. Folia lineari lanceolata, pollicana vel ultra, striata, acuta, cuspidata. Racemus terminalis palmari vel panem ultra. Pedicelli parvi, unguiculares.

reflexa. Imione

Habitat                      herb. huj.

Rami, cinerascens; confestim oblique alternatim annulata. Folia oblonga,  
amplexicaulia, pollicaria, serrata, acumine subulato breviterminata. Ac-  
cumer terminalis, palmaris, basi ramo uno alterova. Flores confesti. Brac-  
teae arido, subulato

*Cordylone Terminalis* Commesf.

Habitata in Insula Bourbona Commesf. Herb. Tusc.

Arborescens, erectus. Folia petiolata, sesquipedalia, elliptica, palmam lata  
glabra, acuta. Racemi terminalis dei omphali, patentissimus.

Folia sub ramis lanceolata, bipollicaria, attenuata. Pedicelli solitarii, breves  
vero gemini. Bracteae subulatae, pedicelli breviores. Flores parvi.

1 Draeo Dracono arborea foliis subcarneis apice spinoso Lin S. V. p. 333.

Draeo arbor Clus. hist. 1. p. 1. Bauh. pin. 503.

Palma foliis longissimis pendulis, absque pedunculis a caudice glabro enatis  
Boerh. Leyd. 2. p. 164.

Codylene foliis inermibus intezerrimis flaccidis Boerh. Leyd. 22.

Cyperagus? caudice simpliciter, foliis ensiformibus mucronatis subcarneis  
imbricatis patentibus Lin Spec. p. 456. Vandel. monogr. Ulys. 1768. Behren

D. J. Goeth. 1770  
Oedera Prantzia  
Stoerbea Eys.

Habitat in India Orientali

Ramus alternatim, oblique annulo cauti, post eorum foliorum. Folia spi-  
thamum lanceolata, attenuata, glabra, striata. Rami Vermineales con-  
positi <sup>pedalis romi</sup> ~~pedalis romi~~ inferioribus <sup>et</sup> patentibus, folium 3 est de 10 semipolluce  
sub ramis. Flores solitarii vel gemini, unguiculati. Pedicelli breves  
bracteae membranaceae pedicello, rami longiori hab. fus.  
aliud specimen aderat foliis multo longioribus. Rami enim decompositi  
floribus quadruplo minoribus.

~~memoria~~

2 *Ferrea Dracona* <sup>arborca petiolatis</sup> <sup>p</sup> foliis lanceolatis acutis <sup>p</sup> Lin. S.V. pag 334

Arbor ferrea Off. d. p. 251.

Convallana Indica Lin. S.V. ed. 10. p. 984.

~~Habitat in China~~

~~Terminalis Rumph. Amb. 24. pag. 79. t. 34.~~

~~Cassipouga Terminalis Spec. pl. pag. 450.~~

Habitat in China, Java, India, <sup>Panno</sup>

Caulis arboreus. Folia petiolata, lance pedalia glabro integerrima p<sup>ta</sup>  
<sup>sopra, pumura p<sup>ta</sup> ca</sup>  
terminalia. Racemus terminalis compositus. Flores breves sine pedicella  
si parvi solitarii s<sup>pe</sup> t<sup>er</sup> gemini vel tres. Squama 3 vel quatuor membra  
nata, inaequali ad basin pedicellorum

— elliptico lanceolatis

indurifa S. arborescens, foliis ensiformibus acutis, racemo composito. Forst.  
fl. Austr. pag 24  
Habitat

non vidi

australis D. arborea, foliis ensiformibus acutis, racemo terminali erecto  
supradecomposito Syst. fl. austr. pag 24  
Habitat

non vidi

3 *m. arginata* Draconia Indiae, foliis dentato-spinosis, racemis axillaribus, barbis poly-  
spermis Hort. kew. t. p. 454.  
*Aloe purpurea* La Mart. Encel. t. p. 05.  
Habitat in Insula Bottonis

cordelana Dracona <sup>utrinque attenuatis</sup> fo arborea foliis lanceolatis amplexicaulis

Habitat in Insula Dracis.

angustior

Similis parca at folia breviora triplicia utrinque attenuata  
minime tamen in petiolum vagrantem, sed basi dilatato  
amplexicaulis. In flore presentia eadem at flores duplo  
majores.

5 *astellani Dracona arborea foliis lanceolatis amplexicaulis, Racemis axilla-*  
*ribus* Compositae

Habitat in Insula Traaric <sup>Lenhm</sup>

Folia angusto lanceolata, apice attenuata <sup>in thamo</sup>. Racemi  
ca. pedales. Racemulis alternis <sup>bracteis lanceolatis, velis</sup> patentibus. Pediculi solitarii  
alterni longitudine floris bracteis nonnulla minuto ad basi pedi-  
cellorum corolla perfiteas. Germin ovatum acutum <sup>stigmata 3.</sup>  
sepilea. ger

Terminalis Dracono <sup>fruticoso</sup> herbacea caulescens, folus ensi formibus <sup>lanceolatis</sup> Len. S. V. p. 334  
4000 var. coll. 2. p. 352.  
Terminalis Rumph. Amb. 4. p. 79. t. 34

Habitat in  
Apparagus Terminalis inermis folus lanceolatis alternis petiolatis, racemo ter-  
minali composito Len. Spec. p. 450 \*

Habitat in India  
Folia fere lano. Racemus terminalis ex aliquot racemis ramosi. Pedicelli  
alterni solitarii, floe breviori cincti ad basi quasi gluma obtusa. Arbor  
Dura Len. Spec. l. c.

4000 var. tab. 448

non vidi

3  
descript an terminalis Spec. pl. notus ad penam cum arbore? vel differentia per forma

ensifolia Draconia herbacea subcaulescens, foliis ensiformibus Lin. Mant.  
63. \* L. V. pag. 334

Gladiolus odoratus indicus Rumph. Amb. 5. p. 145. t. 73.

Dianella nemorosa La Mart. eneycl. 2. p. 276.

Habitat in India orientali &

Planta pedalis exae et ultra erecta glaberrima. Folia ensiformia  
longitudine caulis basi vaginantis, margini et costis  
purpurascens. Panicula terminalis. Pedunculis remotis  
subpifidi basi folio lanceolato sesquipollicari. pedicelli versus apicem  
approximati unguiculati

— floribus peniculatis

Anthemium adenanthera Forst. prodr.

Species hujus generis descriptionem ulteriores indigent.

<sup>femur verticillata</sup>  
4 Squamosa

Dracena Scapo squamoso, floribus femiset aggregatis femur verticillatis  
Cornwallana racemosa Torr. Def. p. 73.

~~Solia ignota~~

Habitat in Arabia.

Solia deserti Scapus erectus sulcatus, squamosus. Flores <sup>pauci</sup> brevissime  
pedicellati, aggregati 10-16. alterni. Bractea <sup>pauci</sup> lanceolata mem-  
brana longitudine florum

Racemus pedalis

11 graminifolia Dracena herbacea acaulis, foliis linearibus Lin. S. V. pag. 334.

*Aphanagis graminifolia* foliis linearibus striatis, scapo racemoso Lin.

Speci: pl. pag. 450\*

Habitat in Asia 4

Planta pedalis glabra. Folia radicalia, graminea, <sup>erecta</sup> utrinque attenuata  
valde striata <sup>aequalitate</sup> caulis albicantia. Scapus compressus, lavis. Flores  
racemosi. Pedicelli plures breves, aggregati aequales. ~~Corolla parva~~  
Corolla pa minor quam in reliquis fere hexapetala

herbacea  
12 borealis *Draconis pubicaulefens*, foliis ellipticis Hort. New. 1. p. 454. Tab. 6.

Habitat in Canada, ad fectum *Hudsonis* Newfoundland &

Planta semipedalis, ~~erecta~~, caule simplicissimo basi versus folioso. <sup>opio pubescent</sup> Folii  
basi caule ~~et~~ breviora basi attenuata ~~vaginantia~~ 4-5. Flores tres  
vel quatuor terminalis pedicellati pedicellis villosis

borealis herbario

13 undulata Dracona herbacea caulifera erecta, foliis ovatis acutis multinerviis  
Flores Lin. Suppl. pag. 204. L. V. p. 334  
Habitat in Cap. bono spei

12 non vidi

10 erecta Dracono herbarica caulescens erecta, foliis lanceolatis subulatis sespeli-  
bus Lin. suppl. pag. 204. L.V. p. 334.

Habitat in cap. B. p. 4

Apparatus erectus caulescens erectus foliis lanceolatis acuminatis  
sespeliibus floribus lateralibus Thunb. prod. pag. 65.

Caulis <sup>in horto</sup> omni alternis angulatis folia semipollucina Pedun-  
culi <sup>in horto</sup> gemini subius ad basin folii squama ad basin pedun-  
culi membranacei

*Strata Draconia* frutescens caulescens erecta, foliis lanceolatis oblique plicatis  
Stratis, caule flexuoso Lin. Suppl. pag. 204 S.V. pag. 334  
Habitat in Cap. bono spei

~~Caule ramoso rami alterni angulati folia sessilia  
semipollicina nervosa Pedunculi gemini folia breviora sub folio  
basi squamis membranaceis~~

~~apparatus erectus caulescens erectus foliis lanceolatis  
apparatus stratus Thunb. prodr. pag. 64~~

nonne aparopidei  
non vidi

medeoloides *Dracona volubilis*  
14 a paragoidei *Mescola* foliis ovatis basi subcordatis obliquis Hort. kew. t. p. 489.

*Laurus alexandrina* ramosa, foliis e summitate caulium prodeunte  
Herm. Lugdb. 679. t. 631.

*Mescola a paragoidei* foliis pinnatis folioli alternis Lin. Spec. pl. pag.

404\*  
*Dracona medeoloides*: herbacea, volubilis, foliis ovatis nervosis Lin. Suppl.  
203. S.V. 334.

Habitat in cap. b. p. sui trunci alterni bi pollicares foliosi  
Caulis teres volubilis. Folia sessilia alterna, unguiculata, nervosa  
acuta Parichia ovata, serrata acuminata. Pedunculi axillares  
gemini filiformes breves, uniflori. Flores penduli

*hemichrysa* Dracon? Folus enfi formibus ramis panicula lanatis  
Habitat in Ampela Borbonis

Folia pollicis brevis lata bis. Irpedalis margine, pinnulis man-  
tis remotis pinnis paucis adpressis albidis

Cordylina Commosponi dedit Fusier

an hujus generis

*Sarneria* H. foliis linearibus, corolla laciniis reflexis Thunb. prodr. pag  
50.

*Amaryllis sarneria* corollis revolutis radiatis subhexapetalis linea  
si-lanceolata, genitalibus erectis Len. l. N.  
Habitat in Japonia

non vid.

15

volubilis *Dracono* herbacea volubilis, foliis lanceolatis Lin. Suppl. p. 204. L. V

p. 334.

Habitat in Cap. bonapaei

non vid:

14

an eadem cum *angustifolia*. genus *Medeola* a *Dracono* non diversa nisi stylis  
et basi divisis et corolla revoluta. an nota sufficienti