

# Dracocepalum

1. virginicum D. floribus spicatis congestis, foliis linearibus lanceolatis serratis
2. denticulatum D. floribus spicatis remotis, foliis obovato-lanceolatis pinnatis dentatis
3. canariense D. floribus racemosis, foliis compositis, foliolis ovatis serratis
4. pennatum D. floribus spicatis, foliis cordatis pennatis serratis
5. rugosum D. floribus verticillatis subspicatis, foliis linearibus lanceolatis integerrimis, bracteis ovatis

+ 4. verticillato floribus axillaribus

6. sibiricum D. pedunculis <sup>axillaribus</sup> multifloris bifidis floribus secundis, foliis cordatis oblongis attenuatis glabris
7. peregrinum D. pedunculis axillaribus trifloris, foliis linearibus oblongis basi dentatis integrisque dentibus pinnulosis
8. grande-florum D. foliis crenatis: radicalibus oblongis cordatis, caulinis orbiculatis esplebis, bracteis cuneatis dentatis
9. peltatum D. floribus verticillatis, bracteis orbiculatis serratis, ciliatis foliis oblongis serratis glabris

10. canescens floribus verticillatis, bracteis oblongis <sup>calyce brevioribus</sup> serratis, spinosis, foliis lanceolatis  
oblongis serratis ~~inermibus~~ canescentibus
11. austriacum D. pedunculis axillaribus ternis unifloris, foliis bracteisque impar-  
tis, <sup>vamibus</sup> floralibus indivisi.
12. moldavica D. floribus pedunculis subternis unifloris bracteis lanceolatis calyce  
longioribus serratis capellae ~~ae~~ dentibusque infimis foliorum  
capellae ~~ae~~
13. nutans D. floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis, corollis ma-  
jusculis nutantibus foliis inferioribus ovatis serratis
14. thymiflorum D. floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis,  
corollis calyce vix majoribus foliis inferioribus oblongis  
remote serratis

incarnatum *Tricocephalum*

Waltk.

Habitat in Carolina herb. Desfont.

Caulis herbaceus, sesqui-pedalis, erectus, angulatus, glaber. Folii petiolato,  
sesqui-pollucaria, ovato-oblonga, venosa, avenia, subnervosa, margine illis  
remota serrata. Spica terminalis brevis. Bractea oblonga, integerrima,  
unguiculata, punctata

virginianum D. floribus spicatis confertis, foliis linearibus lanceolatis serratis  
Hort. kew. 2. p. 317.

Pseudodigitalis perfoliata Boiss. p. 12. t. 6. fig. 3.

Dracoccephalus angustifolius, folio glabro serrato Monf. hist. 3.  
p. 407. f. 11. t. 4. fig. 1.

Lysimachia glandulata spicata purpurea canadensis Barret.  
ii: 1152.

Dracoccephalum Breyn. ii: 337. 27.

Dracoccephalum virginianum floribus spicatis, foliis lanceolatis serratis  
lin. t. v.

Habitat in America septentrionali

Caulis glaber folia sessilia trivela quadrilobata glabra <sup>remota</sup>  
sunt a medio ad apicem remote serrata serraturis <sup>apicibus</sup> <sup>glandulosis</sup>  
nervosis venosa, lacinia. Pedunculis axillaribus et termi-  
nales folio brevior. Calycis oppositi pubescentes bractea  
linearis lanceolata longitudine calycis. Flores purpurei

denticulatam D. Clonibus spicatis remotis, foliis obovato lanceolatis superne  
denticulatis Hort. kew. 2 p. 317.  
Habitat in Carolina 24

non vidi

canariense D. floribus spicati, foliis compositis Lin. l. V

*Pedronella canariensis viscosa*, foliis plerumque ex eodem pedicello  
Vernis Com. hort. 2. p. 21. 4. 41.

*Melissa forte canariensis triphyllus*, odorem camphorae spirans, pene  
transissimum Plukn. alm. 401. 4. 325. fig. 5.

*Camphorosma* Monf. hort. 3. p. 366. f. 11. 4. 11. fig. ult.

*Dracontocypthalo affinis americana trifoliata*, Terebinthinae odore  
Volkh. noni. 145. 4. 145

Habitat in America, Canariis? 5.

Rami tetragoni glabri ad articulos pilosi. Folia petiolata

terna, foliola septem ovata attenuata serrata subtus

pallidiora venosa, glabra, flutalia lanceolata simplicia

Racemus terminalis pedicelli oppositi 3-4 florum

Calycis fixati basi uti pedicelli hirti. bractea parva peltata

floribus racemosis.

foliis ternatis foliolo ovato serrato

pediculi pilosi  
panicibus

pinnatum d. floribus spicati, foliis cordatis pinnato pinnatis Lin Sprei pl.  
ney. 1794 Gmel. fib. 3. p. 23<sup>5</sup> tab. 52.

*Dracocepha* cum foliis pinnato-pinnatis obtusi, floralibus spicati villosi  
coloratis Hort. Ups. 1654

Habitat in herb. h. 5

Caules decumbentes. Folia cordata, transverse pinnatifida  
obtusis, lobis remotis, longe petiolata. Spica <sup>amply</sup> Mel. arvensi  
bracteis lanceolatis, dentato-staevii, foete rubri. Corolla  
parva. Styli floribus duplo longiores un.

non vidi

Ruyfchiana D. floribus spicati, foliis bracteisque lanceolatis indivisi muticis  
Linn. J. V. fl. Dan. 4. 121.

Prunella hyssopi foliis virenti, amplo flore coeruleo Monj. hist.  
3. p. 364. J. II. T. 8. fig. 9.

Ruyfchiana glabra foliis integris Amm. ruth. 50.

Pracoccephalum foliis lineantibus indivisi integerrimis, floribus  
spicati Hort. Upf. 1654

Habitat in Sibiria, Suecia & superne villosi

Caulis ascendentes glabri inferne ramosi pedales, ramis  
simplicissimis. Folia semper linearia <sup>vis. mentis</sup> bipolliciana inter-

media glabra aversa fasciatis foliorum ramulorum in  
axillis flores superne verticillati remoti. bractea  
ovata calycis brevioris Calycis purpurei corolla coerulea  
extus pubescentes

floribus verticillatis, foliis lineantibus <sup>lanceolatis</sup> integerrimis  
muticis bracteis ovatis.



Sibiricum D. floribus subrotundatis, pedunculis bifidis secundis, foliis cor-  
dato-oblongis acuminatis nudis. Spei: pl. pag. 0304.

Tricocephalum verticillis pedunculo communi elevato secundis Gmel.  
fib. 3. p. 234. 8. 51.

Casana montana, foliis veronicae proterpsi Buxb. cent. 3. p. 27.  
7. 50. fig. 1.

Habitat in Siberia 7

Caulis laeviter pubescens. Terquipedalis. folia petiolata

Camp. Tracheliferae inaequaliter profusa grosse serrata

bi- & tripollucaria attenuata, remota. ped. glabra,

pedunculi axillares foliis multo brevior. bractea  
parva linearis <sup>ubi</sup> calycis pubescentes

---

pedunculi multiflori bifidis secundis  
attenuati

peregrinum D floribus subspicatis, foliis caulinis ovato-oblongis incis, bracteis  
lineari-lanceolatis denticulato pinnatis

Gmel. p. 13. p. 237.

Trochocephalum floribus oppositis, bracteis lanceolatis integerrimis,  
foliis lanceolatis mucronatis dentatis Am. acad. 4. p. 7104

Trochocephalum foliis ex lanceolato-lineariibus variis dentatis det.  
goett. 3. p. 436

Habitat in Siberia &

Caulis ter umbentes glabri amopi. Venues tetragoni glabri <sup>ad lutea</sup>  
vellopi. Folia <sup>sub</sup> sessilia pollicaria glabra obtusa inferna  
utroque dente unico vel gemino pinnata terminati superiora  
integerrima, trinerviis remota. Pedunculi axillares  
diphylli triflori foliis oblongis mucronatis bracteis  
minuto setaceo calycis vellopi.

pedunculis axillaribus triflori, foliis lineari-oblongis  
dentatis basi denticulatis integrisque dentibus pinnatis

grandiflorum D. foliis crenatis, radicalibus cordatis; caulenis orbiculatis  
sessilibus; bracteis acuminato-dentatis Len Suppl. p. 274. & L.V.  
pag. 544 +

*Draïocephalum altaïense*

Syst. Veget. ed. 13. p. 454 Lam. in Act. petrop. v. 15. p. 555. Vry.

fig. 2.

*Draïocephalum grandiflorum* floribus verticillatis foliis ovatis mucronatis,  
bracteis lanceolatis *altajensis* Len Spec. pl. pag. 030 +  
L.V. ed. 13. p. 454

Habitat in Sibiriâ alpebus

Caulis semipedalis, simplicissimus subpubescentes. Folia  
radicalia betonica petiolata cordato oblonga obtusa  
crenata subrugosa, pubescentia. Caulina subrotunda  
cordata crenato crenata. Bracteo <sup>velosa</sup> cuneato apice acuta  
serrata dentata calyce parum brevioris. bracteola duo  
minuta lanceolata. flores utraque terni. Corolla  
magna conica.

radicalibus oblongo cordatis  
cuneatis

Spec. plant. forte eadem at annua

peltatum L. floribus verticillatis, bracteis orbiculatis serrato-ciliatis Hort. Ups.

1664

moldavia orientalis, foliis folio, parvo flore cauleo Tournef. corol. 11.

D. macrocephalum floribus verticillatis, foliis floralibus auriculatis  
Hort. Cliff. 309+

Habitat in oriente O

caulis caxi vix pubescentes subramosi folia petiolata  
suprema floralia sessilia, oblonga nervosa serrata versus  
basin integerima obtusa glabra. bractea subtriangulari  
calyce brevior dentibus serratis glabra ad basin pubescenti  
flore calyce parum longior corolla laciniis intermediae lobis  
inferiori calycis vix subrotundis

canescens  $\delta$  floribus verticillatis bracteis oblongis: sematibus pinnatis, foliis  
subtomentosis Hort. Upf. 664

Moldavia orientalis, betonica folio, flore magno violaceo Tournef  
Carol. 11. Pom. rar. 20. 4. 20.

Pidentis annua flore luteo, striculis et foliis longioribus Monj. hist.  
3. p. 309. f. 11. 4. P. fig. 10.

Pidentis incana, oleo folio, flosculis ex incarnato candidantibus,  
montis Libani Volk. nonb. 353. 4. 353.

Habitat in oriente  $\odot$

Tota planta  $\delta$  vili minutis pinnis subcanescens. Caules  
ascendentes folia inferora petiolata lanceolata oblonga  
remote serrata sequi pollicaria superiora integerrima  
pinnata. Pediculi axillares brevissimi 2-3. uniflori  
bracteis cuneato dentatisque dentibus pinnatis calyce  
triplo brevioribus lacino calycis subaequali

Serraturis muticis

austriacum D. floribus spicatis; foliis bracteisque linearibus partitis junopsis  
Linn. S. V. Gaerth. coll. 1. p. 119.

Chamopithys austriaca Clus. hist. 2. p. 105.

Chamopithys coerulea austriaca Bauh. pin. 250.

Habitat in Austria 4.

Caulis plures ascendens villosus ramis pedales. rami <sup>partiti</sup> obtusi  
quod <sup>angulati</sup>. Folia et caulina et floralia trifida <sup>fuscula</sup>  
Caecium linear-lanceolatis obtusi arehii pollicibus latera  
liberum panem <sup>membrum</sup> subtus pallidiora glabra margine villo  
fuscula. <sup>membrata marginata</sup> <sup>postquam</sup> <sup>reflexa</sup> <sup>reflexa</sup> <sup>reflexa</sup> <sup>reflexa</sup> <sup>reflexa</sup> <sup>reflexa</sup> <sup>reflexa</sup> <sup>reflexa</sup>  
Pinnula indivisa integerrima linearis. Pedunculi superne  
ultraque <sup>per</sup> <sup>breves</sup> <sup>uniflori</sup> <sup>globosa</sup> <sup>terna</sup> <sup>tripartita</sup> <sup>ultraque</sup> <sup>protera</sup>  
Duo tripartita <sup>minora</sup> ad basin <sup>scapuli</sup> <sup>pedunculi</sup>. Caecium calycis  
et linear-lanceolatis <sup>mucronati</sup> <sup>medio</sup> <sup>linear</sup> <sup>eleva</sup>  
ta <sup>super</sup> <sup>oblonga</sup> <sup>reliqui</sup> <sup>duplo</sup> <sup>latior</sup> <sup>corolla</sup> <sup>magna</sup>  
Duo <sup>cephali</sup> <sup>Ruyshiani</sup> <sup>calyx</sup> <sup>basi</sup> <sup>vel</sup> <sup>pilis</sup> <sup>mollioribus</sup>  
tectus

indivisi

tripartiti rami

moldavica d. floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: serratis capillariis

Flor. Ups. 1664

Melisa moldavica ~~Flor. Ups. 1664~~ Cam. epist. 576.

Melisa peregrina, foliis oblongo Bauh. pin. 229.

Habitat in Moldavia O

Radices pubescentes ascendentes folia petiolata obtusa  
profunda serrata serratis infimis seta terminatis  
In nervis glabra inferioribus subovatis lanceolatis  
superioribus longioribus basi acutis. Bractea calycis  
longiori basi versus serram attenuata serratis utraque  
3-4. Seta seta terminatis pedunculata utraque 3-4.  
uniflori calyces canescentes

Serratis in femis setatis

nudans. *floribus verticillatis, bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis  
majusculis nudantibus* Hort. upf. 167. n. 64 Gmel. sub. 3. p. 231.

N. 49.

Moldaviae Batoris folio, floribus minoribus coenuleis pendulis Anon  
n. 44.

Habitat in Sibiriā O

caulis adscendens basi ramosi <sup>apice velis subarescentes</sup> sesquipedales; glabri. Folia  
petiolata oblonga sesquipolliciana, glabra obtusa medio  
serrata quinque nervia supra secundum nervos lineata. bractea  
utroque gemino oblonga via unguiculari integerrima obtusa  
floris utroque plures calycis purpurascens. Calyx saepe non subrotun-  
do cuppi dato. floris corolla coerulea calyce dimidio longior  
bracteola nonnullae ad basin pedicellorum pedicelli uniflori



*Thymiflorum* D. floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis corollis  
vix calyce majoribus Hort. Ups. 1674 Gmell. Sib. 3. p. 233. t. 50

Moldavia *Betonica* folio, floribus minimis pallide Coeruleis  
Amm. rith. 46.

Habitat in Sibiria O

Caules pubescentes folia lanceolata serrata serraturis  
utroque aliquot remotis floralis sespiter suprae sub  
ciliata. Calyces pubescentes ut bractea. Bractea caly-  
ce breviori nervosa

Pomel. Syn. Dabur

1 Moldaviae cretica saxatilis Lamii folio flore <sup>animo</sup> ~~minimo~~ <sup>Tournef</sup> Cor  
Corolla uncinata, pollicaris labium superius erectum, bifidum laciniis bidentatis  
2 Dni v. aph. folio radi alibus oratis herb. mus.  
Ded. t. Fuscen

uleni  
res ferrato, ciliatis

*Calceolaria* *calceolaria*

Dwarf: cochinchinensis Loureiro