

# Drosera

1. caulis & flore radicali in scapo solitario, foliis oblongis
  2. uniflora
  3. cuneifolia scapi radiati, foliis cuneato-orbitatis, pedunculis calycibusque pubescentibus
  4. rotundifolia D. scapi radiati foliis orbiculatis petiolatis
  5. Burmanni D. scapi radiati calycibusque glabris foliis cuneatis sessilibus
  6. longifolia D. scapi radiati, foliis ovali oblongis
  7. capensis D. scapi radiati, foliis lanceolatis scabriusculis
  8. lusitana D. scapi subradiati, foliis subulatis sessilibus, subtus cuneatis flori  
bus decandris
  9. cistiflora D. caule simpliciter, foliis lanceolatis attenuatis
  10. indica D. caule ramoso folioso, foliis linearibus
- Incerti Drosera non in sch. pour: de bot.

acaulis Drosera flore radicali <sup>caespitosa</sup> ~~caespitosa~~ solitario, foliis lanceiformibus Lin. Synt. p. 108  
Lin. p. 307  
~~caespitosa~~ Drosera acaulis flore radicali <sup>caespitosa</sup> solitario, foliis oblongis Lin. Synt. p. 108. L. V. p. 307

Habitat in Cap. b. frei

Folia radicalia caespitosa oblonga ~~caespitosa~~ basi attenuata ceterum utriusque  
a quibus cognoscitur propter flore solitario absque pedunculo in sinu foliorum  
folia calycina oblonga obtusa

Seneca Daphne Symbol. Botan. 1. pag. 28.

Daphne collina floribus fasciculatis terminalibus sessilibus; foliis obovatis  
obtusis supra glaberrimis subtus villosis Smith. Spec. leg. Bot. n. 2.  
pag. 16. tab. 18.

*Cuneifolia* Drosera scapo radicata, foliis cum caelo rotundatis hinc Suppl. p. 108. t. 5. v

p. 304.

Habitat ad C. bono frui

Similis *D. rotundifolia*, sed major: differt foliis peltatis, summitate rotundatis,  
versus basin lente attenuatis hinc *h.c.*

uniflora Drosera Scapis radicatis uniflori, foliis sub spatulatis

Habitat ad Tera del fuego Tushen

Panta pupilla via polliciani, Solcia ~~radicatis~~ ~~fol~~ fructura congenerum, Contava  
foliola calycina obtusa.

biflora Prosem foliorum oblongis, scapis subbifloris  
Habitat in Brasilia herb. Guss.

Burmanni Drosera <sup>Drosera</sup> fiapis radiatis calycibusque glabris, foliis spatulatis  
 sessilibus

res folis zeylanica, foliis rotundis in orbem expansis vellosis  
 Herm. mus. zeyl. 18.

res folis foliis circa radicem in orbem dispositis Burton zeyl.  
 n. 207. t. 94. fig. 2.

Drosera rotundifolia Less. fl. zeylan. 7 120.

Habitat in zeylona

(a. Drosera rotundifolia distingui meretur. Folia enim subsessi-  
 lia; basi attenuata, semper unguis ciliata; ciliis venis  
 aequalibus. a Dros. cuneifolia dignoscitur glabritate fiapis  
 pedicellorum, denique triplo minor

viminata. *Ahus foliolis linear lanceolatis integerrimis glabris basi attenuatis*  
*intermedio subpetiolato Hort. Pers. 1. p. 368.*

Habitat in <sup>Cap. d. p. 1. t.</sup> ~~Cap. d. p. 1. t.~~

Tota glabra. <sup>rami p. 1. t.</sup> ~~foliola mucronata, pollicaria subtus pallidiora lateralibus~~  
~~minoribus. Panicula terminalis patens. Flores parvi affinis angustis~~  
~~foliis.~~

anglica Drosera foliis oblongis obtusis radicalibus, floribus octogynis  
capsulis quadricapitulis Smith. fl. Brit. pag. 347  
Pur. solis major longiore folio et aetate Mon. her. Sect. 15. Tab  
4. fig. 1.

Drosera anglica foliis oblongis, scapis radiatis, floribus octogynis  
Huds. fl. Angl. 1. pag. 135  
Habitat in paludibus &

Duplo major quam longifolia. Solea plerumque linearis obovata

longifolia Drosera scapis radicatis, foliis ovali-oblongis Lin. S. V. pag.

Salpigrofa f. spongia folis f. ros folis f. rorella Thal. hercyn 116. t. 9. fig. 2.

Ros folis folis oblongo Bauh. Pin. 357.

Habitat ubique in paludosis Europe cum rotundifolia. et

Folia petiolata lanceolata cuneiformia, polliciana. Petiolus longitudine  
folii nudus. Scapus Digitalis erectus ciliiformis. flores ut in

— folio obovato

Drosera anglica Hoffm. pra. nisi varietas distincta solummodo  
varietate variabili peltatum

+ Specimen vidi in herb. Vall. et commun. a Gussone an diversa specie

rotundifolia Gouan. Scapis radicatis, foliis orbiculatis Lin. S. V. pag. 304

Salpigrosa f. Ros folis Thal. herb. S. 9. fig. 1.

Ros folis foliis rotundo Bauh. Pin. 357.

Habitat in Europa ~~et~~ America meridionalibus.

Botia radicalia petiolata. Petiol. gemmangitulosi basi punctata margineque pectato  
ciliata ciliis purpureis glandulosis. Petiolus sesquipollicaris planus. Ciliatiss.  
Scapus erectus simplicissimus, teres, palmatis. Racemus terminalis secundus  
ante florentiam apice reflexus

umbellata Trofera scapis radiatis, foliis cratis, floribus umbellatis Lour fl.

Cochinch-poz. 1 Pl.

Habitat in China

scapi nudi, 5 pollicares. - folia longe petiolata - flores squa

De genere incertus et auctor  
non videtur

acaulis D. flore radicali sessili foliis solitono, foliis oblongi Len Suppl. pag

108

Habitat in Cap. b. p. c.

Planta ut pollicaris folia unguiculantes capaxsa ciliata  
adspersa Flos solitanus sessilis

peltata Druzen caule subramoso, foliis triangularibus longe petiolatis peltatis  
Walden: spec. pl. pag. 1548  
Habitat in nova Hollandia

uniflora S. Scapo uniflora foliis spatulato subrotunda

Habitat ad litum magellanicum

Planta vix pollicari folia <sup>utrinque glabra</sup> semunquiculata subrotunda petiolo  
plano lato ciliata. Scapus foliis parum altior terminatur flore  
solitario

*cuneifolia* Profera *scapis radiatis foliis cuneato-obcordatis* <sup>pedicelli calycibusque pubescentibus</sup> Lin. suppl. 13 P. 1. v. 304

Habitat in Cap. b. p. r.

Similis *rodusoniifolia* sed duplo major et foliis non petiolatis sed superne rotundatis  
inferne velut semper attenuata sessilibus.

Pedicelli et calyces pubescentes.

*Caperis* *Dioscorea* *capensis* radicata, foliis lanceolatis <sup>siapo fibrosculo</sup> ~~pubescentibus~~ <sup>len</sup> I. V. p. 304. Mant. 360.

*Ros* *capensis*

*Ros* foliis africanis, foliis prolongis, caule nudo altissimo Raij suppl. 515.

*Ros* foliis africanis, foliis lato et longo Herm. afr. 14.

*Dioscorea* foliis ad radicem congestis, floribus spicatis Burma afr. 209 t. 75 fig. 1.

Habitat in Otheopua

Folii radicalis petiolata, palmata <sup>multa</sup> *Sanella* *circinata*, angusta, bipollicaria <sup>nervosa</sup>  
basi sensim in petiolum folio longiore attenuata, frequentissime ciliata  
scapus erectus, pilosus ~~pubescens~~ <sup>pubescens</sup> prope stem superne racemus secundus  
Foliola calycina oblonga

*D. capensis* caule erecto bifido, foliis lanceolatis Thunb prod. pag. 57

Lusitanica Drosera scapis subsiliatis foliis subulatis sessilibus subtus crenatis, floribus decandris  
Ros foliis lusitanicus, foliis apthoceli minoris Mont. hist. 3. p. 620. fig. 15. & 4.  
fig. 4. Peth. alm. 323. t. 117. fig. 2. Ray suppl. 551.

Drosera lusitanica scapis radiatis, foliis subulatis subtus convexis, floribus  
decandris her. spec. pl. p. 403 & P. V. p. 304

Habitat in Lusitania 4

Radix sufformis sphaemosa crispis perno asperis multiceps. Folia radicalia  
bi-pollicaria usque pili aequalibus brevibus capitatis. Venella terminata.

+

*C. p. fl. Drosera*

5

*estiflora* Drosera caule simplici, foliis lanceolatis Lin. Am. acad. b. pag. n. 7\* L.V. pag. 304\*

Ros foliis africanis, *estiflora* albo, caule foliis Raj. suppl. 515.

Ros foliis foliis angustis, flore amplo Breyn. prodr. 3. t. 22. fig. 2.

Drosera foliis ad caulem oblongis alternis, flore amplo purpureo Burm. afr. 210.  
t. 75. fig. 2.

Habitat in Cap. b. pra.

Caulis digitalis ~~caespitosus~~, ~~sex pubescens~~, ~~in fine foliis uno vel altera~~. Folio plurima ~~radicalia~~  
vel 2 ~~infera~~ in caule, <sup>sepalia</sup> lanceolato-cuneiformia pollicina nervosa, ciliata more  
generis ~~mayuaria~~ <sup>versus b. pra.</sup> ~~ferre~~ nuda. Flor terminalis plitarius magnitudine Pyrola uniflora  
et lonum ~~ferendi~~ ater. Stamina nigra longitudine calycis. Anthera luteo cordata. Pistillum  
nigrum: germen ovatum, cui circum apicem, nec in ipso apice, insident stili 5. nigri longi  
tadine corollae, apice dichotomi usque in capillos.

— caule unifloro

indica. Trofera caule ramoso folioso, foliis linearibus Lin. L.V. pag 304

Araco-puda Rheid. Mal. 10p. 120

Prosp. ramosus, caule folioso Burm. zeyl. 207. t. 94. fig. 1

Habitat in India

Caulis pubescenti-spicatus. Folia petiolata, spatha unguiculari, petiolo <sup>angustissima et vit. a petiolo</sup> <sup>et pinguentur</sup> <sup>per latera</sup>  
in voute, ciliata et his parvis frequentibus petiolis nudu. Racemi laterales  
simplicis formi ramos alterius pedunculo pedicellisque pilosus glab. pilis apice  
glandulosis. foliola Calycina oblonga

*Drof. peltata*  
*Dichotoma*