

Duranta

1. Plumieri D. calycibus fructibus ^{glabris} cinctis foliis oblongis obovatisve subter-
2. Elliptica D. foliis ~~concedata~~ ovatis serratis calycibus villosis ^{terrenis}
3. multifida D. foliis ellipticis integerrimis

Plumieria Duranta calycibus frutescentibus contortis, foliis elliptico-ovatis crenatis integrisque.
Duranta Plumieria calycibus frutescentibus contortis lin S.V. pag. 577

In Montserrat Leyt de Ryan 5

Rami inermes, glabri, cortice cinereo, inferne venetis sculi, superne altero lateri compressi.

Folia petiolata, opposita, remota, elliptica tri-pollicia aut, sursum versus sensim minor, elliptico-ovata, integerrima, vel a medio ad apicem crenata, obtusiuscula, subnervosa, basi acuta, utrinque glabra, venosa, subtus pallidiora.

Petioles unguiculares.

Tracemi ex axillis superioribus et apicibus simplicissimi, oppositi, folio duplo longiores; pedicelli alterni vel oppositi, uniflori. Bractea minuta fetacea ad basin pedicellorum.

Calyx ^{supernus} ~~inferus~~ tubulosus, quinqueangulatus, quinque-dentatus: dentibus minutis

Corolla monopetala, hypocrateriformis; tubo calycis dimidio longior, paucum curvatus; limbus quinquefidus: laciniis oblongis, integerrimis, subaequalibus

Stamina filamenta quatuor, superne in tubo, duo longiora, tubo bre-

rosa. Anthera globosa

Pistillum: ^{sum}germen globosum, parvum. Stylus filiformis, tubo brevior. Stigma capita

Pericarpium baccis oblongo subglobosa, magnitudinis pisi majoris, mucronata, mucro
ne quinque sulcato.

Semina quatuor, ossa.

(an a Duranta Plumier diversa? an Dur. multifida?)

Elle-fa Duranta

Triaenanthus Duranta

Habitat in Pém herb. Guaf. 5

Rami obscure tetragoni, superne pubescentes. Spina 3. axillares. Folia terna
vel ut illata, cum rudimento ramuli in axillis, petiolata, vix semipollicaria
oblonga cum acumine brevifloro, integerrima, glabra, supra nitidiuscula,
pubescentia, pubes obsolete nervosa, facie D. Elliptici Flores superiores gemini
in singula axilla, sessiles. Calyx canescens. D. Elliptici, dentes acuti; Flores superiores
vix subsessile

Agrostis Dumata foliis ovato-sublanicollatis attenuatis integerrimis glabris.

Habitat in America herb. Junoni

Rami teretes, glabri, cortice flexo. Folia petiolata, opposita, bi- / 3 pollicaria,
subtus pallidiora venosa, supra avenia. Paniculae axillares elongati, oppositi.
Flores nutantes, remoti. Palyces quinque dentati, villosi, Corolla estur inana

attenuata Duranta

Habitat in America merid. herb. Surinam

Præmi teretes, glabri. Folia petiolata, opposita, 4-5 pollicaria, elliptico-lanceolata, utrinque attenuata et acuta, ex utroque crenata, basi apiceque intensissime, glabra, venosa. Petioli semipollicari. Spine axillares, pollicares, rigidi. Racemi ut in Dur. Plumieri

Plumieri *S. calycibus fructu escentibus contortis* Lin S. V. p. 747. q.

Castorea repens Pinosa Plum gen. 30

Duranta pinosa Lin Spec. pl. pag. 637

13 *Castanea racemosa* flore coeruleo, fructu croceo Plum. gen. 30. c. 79.

Duranta inermis Lin Spec. pl. 1. pag. 637.

Habitat in America meridionali &

Rami teretes glabri inferne cortice unicoloro superne subtetra
goni ramuli oppositi floriferi in spinam dependentes.

Folia petiolata ~~et~~ oblonga basi acuta mucronata utraque
glabra integerrima obscure venosa unguiculata supra petida

Racemi axillares et terminales ramorum flores nitantes.

Seta ~~est~~ ad basin singuli pedicelli calycibus glaberrimis

pedicelli alterni
folia interdum obovata apice unius 3-4 vel emarginata vix nisi
varietate

obovatisque sub

foliis oblongis integerrimis calycibus glabris

omnes hanc uti et infrequentem foliis serratis describit an igitur mea
Plumieri Syn. potius ad Ellipham amandanda species distincta
contra ad huc fig. Brown

Elliptica D. calycibus frutescentibus erectis Lin. N. Faerqu hirt hort

v. 3. t. 99.

Elliptica frutescens quandoque spinosa, foliis ovatis utraque acutis ad apicem serratis, spicis alatis Brown. jam. 262. t. 29. fig. 1.

Elliptica acuta Lin. Am acad. 5. p. 400 + Loefl. it. 1947

Habitat in Jamaica ^{superior}

bipollicana

Rami tetragonis pubescentes. Folia petiolata, opposita,

Spinosa supra
axillares
utroque!

lanceolato ovata ^{planissime a medio ad apicem} nervobis venosa ad centem villis minutis mucronata serrata basi apiceque integerrima

Racemi ex axillis supremis et terminalibus foliis longioribus

Pedunculis cernentibus pedicelli oppositi interdum terni
calycis villis tenuissimis subcernentibus

foliis vero lanceolato ovatis serratis, calycibus villosiusculis

variat cum et absque spinis

Mutipi D. foliis ellipticis integerrimis Lin. Suppl. pag. 291. t. v. p. 577
Habitat in America meridionali
foliis a reliquis diversa: spinis supra axillares

non vidi