

Echinops

*Echinops*

*Echinops orientalis* acanthi aculeati folio, capite magno, fructu coeruleo  
Tournef. Cor. pag.

Habitat in oriente herb. aust.

Caulis angulatus, fulcatus; angulis superne canescens illos. Dolia inferiora penne  
stipula: lateris dentato-fineata, dentibus spinosis valde armatis. Caulis tan-  
gentea, attenuata. Dentata spinosa, spinae ciliolatae, scabriusculae, orna-  
tibus lomentosa. Capitula terminalia, solitaria. Squame curvatae, acumi-  
natae, basi ciliolatae, et leviores brevior, adumbrare brevi  
a varietas sphacelata, folia latiora

Lanuginosus Echinops

Echinops grossus Venerissime durus et lanuginosus, capite minore coeruleo  
Tournef. Cor.

Habitat in grota herb. Aves.

Praecox erectus, ramosus, angustatus, arachnoides. Tota per se angusta  
pennata, triplicata, margine revoluta, pubescentia, cana, denticuli  
spinosi, minutis, remotissimi: pinno subulata, sive pollicaris, cedidum spinis  
una vel altera armata. Capitulum terminale, magnitudine juglandis  
foliolis cuneatis vix angustulatis, concava, acuminata, acuminata ciliata.

Macromia 40x habet 4 usque 5

*macrocephalus* Echinops

Habitat herb la Marthie

Ramis vellosus, fimbrii crassiflora penne anserina, folia amplexicaulia, penne  
divisa, supra glabra, levia, subfuscicano tomentosa : penne dentata primose  
epigonorum de cunctis habent nat. sed &  
pedunculi uniflori, tomentosi. Capitulum magnitudine nec si corigli

*Phoroccephalus* L. capituli globosi, foliis pinnatis pubescentibus Lin Spec. pl  
pag. 1314.

*Chalcopos* Dalech. hist. 1480

*Caducus phoroccephalus* Lat. foliis vulgari Bauh. jun. 381.

*Echenopus major* Bauh. hist. 3. p. 69.

Habita est in Italia, Austria

Capitulum erexitur, fulcbris purpureis vellosa subranea fuscum.  
Solia sua pila remota pubescentia, saepe et inaequilatera  
dentato pinnata dentibus super his supra vellosa pubescentia tenui  
toto vireno. Capitula sua globosum magnitudine Anglia  
et pluribus capituli basi pilosis compostrum. Squamo calicei  
no cane colato subulato canato superne ciliato serrato

— supra pubescentibus

*Pungifex* L. capitulis latoe foliis, calycibus lateralebus ferilebus, foliis  
superioribus levioribus Spec. pl. p. 1315 & Hocf. 1594

Spina alba Lobel. v. 2. p. 9.

Caudiculus tomentosus, capitulo majore Baeh. p. n. 302.

Scabrofa Caudifolia annua Herm. para. 224. t. 224.

Habitat in Hispania O

Paulis in uno tomentoso erectus Verso simplici. Foliis  
per basi angustata subtilis in uno tomentosa superba strigosa  
se inferiore bipinnatifida superiore pinnatifida  
lanceolata - lanceolatis alterni integerrimis  
frons apice spinosa Capitulum terminalis foli-  
tum e pluribus capitulo oblongo <sup>basi rotundis</sup> compotum magni-  
tudine nivis Englands - Squame calyculis rigide  
lanceolatae, praeangentes apice superne reflexae  
longe ciliatis interioribus superne nudo margine carinatis

Retro Et. capitulo globo, foliis pennatipidis supra globi Lin. Spec. pl. pag

1314 \*

*Procodiolum frunosum monspeliacum* Dalech. hst. 1476.

Retro floribus comuleis Lobb. c. 2. p. 8.

*Candovijs phoroccephalus comulei minor* Bauh. pin. 301.

*Lchinops caule unifloro* Hort. Upf. 240. & Mill. Sect. 8. 130.

B. *Lchinops caule subumbellato, foliis dupliato-pennatipidis: foliolis linearibus remotis* Gmel. Lib. 2. p. 102. t. 46.

Habitat in Sibiro, Gallo, Italia collibus aridis &

~~Paulus erectus foliis suboppositis purpureis vellosis  
folia sessilia remota subtus in aro supero lanceolata  
dentata ex quadratis pennatipida dentibus spinosis  
capitulum globosum magnitudine squamis squamosa  
e planis capitula basi pilosis, summa lanceolata pubulosa  
superne ciliata semite~~

~~Paulus erectus simplicis primis fructibus in aro formentosis ter  
folia sessilia subtus in aro, remota: lanceis alteris in duplo  
subpennatipidis lanceolatis dentibus setaceis spinosis Capitulum  
terminale solitarius squa magnitudine pruni. Squamo pubulosa  
apice patentipulo ciliata~~

*Spiropus E. capitulus in spissis spinis longis Lin. Mant. 119 & L. V. p. 797*

*Carduus phoenicephalus aiutus Dod. pempt. 722.*

*Carduus phoenicephalus, capite longis spinis ar. meto. Bauh. p. 302.*

*Habitat in Barbana, Egypto, Arabia 4*

*Caulis erectus superne ramosus fulvato puberulatus  
per parasitum incisa. folia simpleia angustiora  
quam in reliquo bipinnatifido spiropus latius  
pubulatio in spinam longam flavescentem depresso  
fibris incanis supraq. lebri. capitulum ter minata  
spicula calycis est tectorum unio q. coquuntur flavescentes  
unica spina longior et validior  
interno minus rigida,*