

Lehman a. b. p. l. i. a. 1227
Barral. 1011

Celium

~~causa~~

x caule frutesco ^{erectis} ^{supremis} ^{linearis lanceolatis} ^{racemis terminalibus} ^{compositis}

1. cardians E. foliis lanceolatis nervosi ramisque hispiti, ^{foliis calycibus} ~~oblongis lanceolatisque acutis.~~
2. giganteum E. foliis ^{linearis} lanceolatis basi attenuatis pilosi: pilis brevissimis, bracteis & calycibusque strigosis.
3. fructum E. foliis oblongo-lanceolatis pilosi ^{pedicellatis} scabri, corollis subampulatis ^{racemis terminalibus compositis}
4. longatum E. caule glabro, foliis lanceolatis ^{glabris punctulosis ciliatis} ~~in~~ ^{marginibus apicibusque} ~~fractis.~~
5. fructuosum E. foliis lanceolatis basi attenuatis villosis strigosis, floribus ^{fructibus} ~~fructibus~~ ^{fructibus alternis}
6. argenteum E. foliis linearis lanceolatis albedo hispiti, apice patulis ^{floribus lateralibus alternis} ~~extrorsum.~~
7. glabrum E. foliis linearis lanceolatis supra glabris ^{subtus callosis} ~~subtus callosis~~ ^{floribus racemosis} ~~fructibus alternis~~

M
in caner
+ nichetomen

8. rosmarinifolium L. foliis linearibus lanceolatis margine serratis, subtus
peloso incanis petiolatis.

9. hispidum L. foliis lanceolatis strigosis scapulis, racemis compositis, ramis

^{paniculatis}
^{longis} ^{caudatis} 10. capitatum L. caule peloso, ramis ^{capitis} capitato-corymbosis ^{abermis} aequalibus foliis
^{ramis glabris} strigosis, calycibus incanis.

11. sphaerocephalum L. foliis lanceolatis strigosis, capitulis solitariis terminalibus

12. setosum L. foliis linearibus lanceolatis cauleque suffruticoso prostrato
^{ramis glabris} vel repidis incanis.

13. sericeum L. foliis linearibus lanceolatis extusum dilatatis cauleque suffru-
tuoso canis.

xx caule herbaceo.

14. spicatum L. caulebus ascendentibus simplicissimis, racemo cylindraceo
terminali, calycibus incanis.

15. plantagineum L. foliis radicalibus ovatis linearibus petiolatis, caulinis
lanceolatis, caulebus prostratis, genitalibus congestione corda-
ta

16. *hemisphaerum* E. foliis radicalibus, oblongo basi attenuatis petiolatis scabris
caule procumbente, genitalibus corolla brevioribus
17. *hemile* E. foliis lanceolato cuneatis, ^{strepis} caule adscendente speciebusque
hirsutissimis, staminibus longioribus corollae.
18. *coelicum* E. caule procumbente, foliis caulinis ovatis, calycibus fructu
sistentibus distantibus
19. *lufitanicum* E. foliis caulinis lanceolatis, speciebus lateralibus, corollae
austriale stamine longioribus
20. *scolacium* E. foliis
calyce brevioribus. Stamina corollae aequantia, tubo
21. *nigrum* E. foliis hirsutis, caule ex racematis longe speciatissimis; corollae
subaequalibus.
22. *italicum* E. angustifolium inferioribus nervosis, staminibus corollae sub
aequalibus longioribus, racematis lateralibus.
23. *vulgare* E. hirsutum, staminibus corollae irregulari aequantibus,
speciebus lateralibus
24. *orientale* E. foliis caulinis ovatis floribus lateralibus solitariis

angustifolium
elongatum

trichotomum E. caule glabro subtrichotomo, ramis tomentosis, foliis lanceo-
latis imbricatis tomentosis Thunb. prod. fl. Cap. pag. 33
Habitat in Cap. b. ppe.

non vidi

incanum E caule villosa, foliis linearibus ensiformibus laniceo-tomentosi,
radice perennante linearibus Thumb: prodr fl. cap. per. 3. 3.
A habitat in cap. b. frei

67 glabrum Echium ^{Echium} foliis linearibus lanceolatis ^{extremum} supra glabris ^{extremum} subtus calloso
punctatis, ^{racemis} racemis alternis.

Habitat ad Cap. b. p. i. t.

Racemi ~~parvi pubescentes~~ ^{longissimi subinervi, pappi rufescentes} superne papum compressi, e villis adpressis
Solia ^{longiora} sespilia, germa, pollicana, avenia, scaba, ~~glabra, rufi~~
subtus versus apicem subtus puncta nonnulla albida.

Racemi ex axillis ^{superioribus} supremis, erecti, pauciflori, bipollicares

Bractea ovato-lanceolata, longitudine calycis.

Calycis pelosi: laciniis lanceolatis, longitudine tubi corollae

Stamina corollae longiora.

(Diversa ab E. longato ramis villosiusculis, foliis angustioribus, margine
minime calloso, calycibus pelosis, floribus minoribus)

Echium glabrum Thurbergi

Echium ~~foliolatum~~ caule fruticuloso foliis linearibus lanceo-
latis falcatis canopeli subnervis supremis calycibus
villosis La Mark. voy. 413

Ἰοσθάλοϊ Ἐ. foliis radicalibus pennatis pennis incisae caulibus pennatis pedis
summis indivisis, fructibus subdymis hinc gibbosis
Lepidium sativum Hoffm. fl. Arab.
Habitat in Arabia

Caulis erectus pedalis ramosus glaber, ^{palmaria} rami lati ramulosi, ramuli
floriferi. Folia radicalia petiolata, pennata, pennis oblon-
gatis alternis decurrentibus antice ~~exte~~ incisae postice
int. serratis, vel raris dente uno versus apicem basi acuta.
Caulina pennata ^{et inferiora, rymonum} fida laciniis lineari-integerimis vel inti-
fura una vel altera suprema lineari ^{vel ang. semunquiu}
lana. Rademuli ex apice ramulorum ^{infer} copiosi. Fructus pari-
vis magnitudine seminis lineares altero latere cavi altero
gibbosi ~~vel emarginati~~
semel sativo diversim fructu

2 giganteum L caule fruticoso, foliis lanceolatis basi attenuatis pilosis: pilis brevis-
simis, bracteis calycibusque frigidis, staminibus corolla longioribus. Hort. Kew. 1. p. 106
Echium giganteum caule fruticoso ramis canis glabris, foliis lineari-lanceolatis
scabriusculis sessilibus, thyso terminali: spicis simplicissimis Lin. Suppl. p. 131.
S. V. p. 189.

Habitat in rupibus Teneriffae

altissimum. Rami teretes canis, glabris. Folia spithamea, lati-
tudine ungti, scabra venosa. Thyso terminali maximum
pyramidali consistens ex pedunculis longis spicatis. flores-
centi. Corolla alba subaequali Lin.

Echium

Habitat in Borussia Comnes. herb. Jusf

Caulis herbaceus, hirsutus, scabri. Sulca caulinea semiamplexicaulis, basi cordata, lac-
cosolata, acuta, utrinque pilosa, scabriuscula. Spica terminalis, solitaria. Caly-
cis laciniis lanceolatis, hirsutis. Corolla magna, L. cretici, glabra. Stamina 5:
2 cum pistillo corolla longiora

Echium grandiflorum; foliis nitidis, lanceolatis, hispida; caule fruticoso, corollis
maximis, aequalibus rubris Andor. repos. t. 20
Habitat in Pop. l. spec. 5

Rami ex axillis supremis nudi flori. corolla 3 esquipollis anis

~~Julicatus gladiolus hirsutus, foliis linearibus ensiformibus, floribus nigris
adscendentibus in spica sicca, staminibus exsertis La Mark
F. En. pag. 119.
Antholyza hirsuta Det. Enc. no 2.
Habitat in Cap. b. per.~~

musficum E. caule erecto piloso punctato, foliis lanceolatis pilosis, spica
terminali corolla inaequali staminibus brevior tubo calycem superante
Gmel. ~~1~~ pag 119

non vidi

67 rosmarinifolium lehuum ^{petiolatis} foliis linear-lanceolatis margine reflexis, subtus
pilos^{is} ^{americanis} ^{ascendentibus}

Habitat in Cap. b. spec. Dr. Buler 5

Rami teretes, cicatricati, pilos^{is} canescentes.

folia ^{brevis, pubescentia} ^{parva} ^{parva}, pollicaria, sere rosmarini, supra pilosa vincta,
medio pilis exarata, sic brevifolia, ~~parva~~

Petiolus brevissimus.

Racemus terminalis, brevis.

Calycis foliola linearia, pilosa

Corolla subregulari calycis dimidio longior

emarginata Viola foliis ciliatis suffruticoso ramoso foliis oblongis intermedium
glabri emarginato

Natu - Vistna - cladi Rheed. Mat. p. 119. Tab. 61.

Habitat in India orientali Madagafar

Caulis ramosi debiles teretes basi fuscescentes. Folia alterna subsessilia basi acuta in quicquid glaberrima subtus pallidiora
diffantia versus apicem conferta ovata emarginata. Squala
omnibus petalis. Pedunculi axillares solitarii sessiformes
uniflori (sed in omni nota sex) versus apicem breviteri bris
petalis calycis foliola ovata canaliculata margine membranacea
glabra corolla sex viol. suffrut.

paniculatum & caule pubescente, ramis angulatis, foliis pelosissimi
di Herb. prodr. fe. cap. pag 33.
Habitat in Cap. b. pres.

non vidi

tingorum E. caule villoso, foliis oblongis ~~staccis hispida~~, ~~fructu~~ ~~con~~ canali
culati piloso-hispida Thunb. prodr. fl. Cap. pag. 33
Habitat in Cap. b. pei

non vid

caudatum & caule villosa, foliis oblongis fetaces-hispidis; spica composita ovata-
oblonga Thunb. prodr. fl. Cap. pag. 33
Habitat in Cap. b. p. ei

non vidi

10 Capitatum E caule piloso, floribus capitato-corymbofis squalibus, stamini-
bus corolla longioribus, foliis hispida Lin. Mant. 42. & S. V. p. 189

Habitat ad P. b. sprety

Rami ^{inferne} sparsi. Petales glabri superne angulati pilosi. Folii in
ramis sessilibus frequentia ~~pubescentia~~ ^{reticulata} unguiculata lanicolata
obtusifolia. ~~floribus in axillis cernentibus. Flores in capitulis collecti~~
~~se collecti hispido collecti parvis.~~ corolla fere regulari. Calyx
& pili densi incanis. Stamina & stylus corolla longior

capitatum ^{corymbofis} ramis superne pilosis, floribus capitatis, staminibus corolla
longioribus, foliis ^{hispidis} ~~sessilibus~~ calycibus incanis

Echium ^{hispidum} caule scabro, foliis lanceolatis, pili albis antibus
hispidis, capitulo terminali corymbofo Burm. prodr. pag. 5.

7-0 Sphaerocephalum Echium ^{Encasi} foliis lanceolatis, ^{hispidi} longis, capitulis solitariis Verminalibus, ramis glabris

Echium capitatum Comarh. &

Habitat in Cap. b. p. 5

Affinis E. capitato. Rami inferne teretes, parsi glabri, superne angulati, & apicem villosi, a caelo foliorum denticulati

Folia lanceolata, brevia, ut unguicularia, sessilia, frequentia, subimbricata, ^{et marginata} punctata, supra ^{et marginata} ~~caelo~~ ^{frigidioribus} absque

Capitula terminalia, solitaria, brevia pedunculata, globosa, villosa, flores parvi subregulari.

Stamina corolla longiora

Echium capitatum differt foliis tri- & ramis pelosporibus, foliis 3plo vel quaduplo longioribus, capitulis in ramis brevibus in corymbo fere collecti nec solitarii in ramis elongatis patentibus ut in Sphaerocephalo, denique calycibus pilis copiosissimis totis & incanis in Sphaerocephalo vero paucioribus magis distincti. Echium capitatum dicitur optimus Murmanni sub nomine

an Echium
~~hispidum~~
~~Thunbergii~~

Echium capitatum adde sequens synonymum fide herbarii optimi Murmanni

Echium hispidum caule scabro, foliis lanceolatis, pilis allicantibus hispidis, capitula terminali corymbosa Murmanni prodr. par. 5.

7 velutina T. foliis ovatis subangulatis acuminatis, subtus tomentoso-
nis.

Habitat in Iffe de France

Caulis molliter villosus, teres. Folia petiolata alterna
tri-
bi-
f. tripollic'aria subquaque nervia, inaequaliter serrata
supra molliter villosa, & pilis minutis substellatis subtus
unicane. Sepala lanceolata attenuata ciliata femi-
gines.

Pterosum Echium caulibus foliis linear-lanceolatis cauleque suffruticoso procumbente
6-7 hispidis incanis.

12 Echium rubrum flore rubro; foliis tuberculato-Pteros Fosph. descr. pag. 41.

Caules palmari inferne ramosi, procumbentes, uti tota planta textus
Tuberculi ^{conspicui, in hinc} parvi albidis apice setis albis rigidis, incanis

Folia linear-lanceolata, sessilia, unguicularia, serpm. minora, rigida.
Spica terminalis solitaria; primam flore primam confecti, demum remoti.

Corolla unguiculari, canescens
Stamina corolla longiora.

Nuclei semina parva ovata, acuminata, mucicata

(ab Lafericeo differt caulibus procumbentibus uti tota planta pelis lon-
gioribus ^{rigidis} hispidis hinc nec cauli adpressis, foliis apice non angus-
tiora

104
quomodo serpm
in textu

tenellus *Convolutus* foliis linearibus ~~glabris~~^{subprostratis}, floribus solitariis ^{sub} sessilibus caule depresso.
Convolutus prostratus; caule prostrato; foliis sessilibus, linearibus cuneiformibus,
pilosis; pedunculis axillaribus unisporis di-bracteatis *Cosm.* Desf. p. 203.

Habitat in Arabia

^{herbacei}
Caulis plurimi simplicis digitalis vel ultra prostrati inferne glabri
versus apicem raris pilosis. Folia angusta parva inferiora apice dilatata
glabra obtusissima superiora linearia acuta sessilia subpilosa remota
Flores a basi caulis ad apicem inferiori ~~ped~~ brevis pedunculati superior
res sessiles. Pedunculi versus basi bracteati. Siliola calycis oblonga, apice
acuta parvula villosa corolla calyce duplo longior
Caulibus tenellis, foliis angustis, parvis a reliquis diversis

grandiflorum Echinum foliis pubescentibus: caulibus inferioribus ovato-ob
longis, caule piloso puberulo, corollis calyce quadruplo longio
ribus Desfont. fl. mont. Atl. pag 166. tab. 48
Habitat in Barbana ☉

affine plantagineo

floarum *Lichum foliis lanceolatis hirsutis spicis, framinibus corolla*
subregulari duplo longioribus ^{capite simpliciter} Desfont. fl. Atl. 165. tab. 45
Habitat in monte Atlas ♂

non vidi

E. leonardus *radialis* Defeat fl. coll. pag. 764

mantanum Echeum foliis spatulato lanceolatis villosis - strigosis, staminibus
brevis corolla breviter Wed. spec. pl. pag. 700.

Lycopersi spatulata foliis hispida et scabra Boiss. mus.
2. p. 04. tab. 70.

Echeum mantanum insularum procerum flore maris
coeruleo Tournef. Guss. 136.

Habitat in mantanis Sicilia, Italia C.

platystachus. C. umbello univesali ⁴triphylla partiali aphylla species
aeternis distantibus comparatis obfus squamis ~~que~~ oblongis obtusi
Habitat in India Orientali
Culmi anguli acuti exstantibus. Involucris foliorum 3. unicum
umbella longius ~~est~~ idem ~~apertis~~ ^{utrum b. in.} panem longius tertium squamis
angusta margine ~~est~~ ^{est} umbella ampla radii si que
compositi ~~totidem~~ longior si que folliculari ~~reliqui~~ ^{reliqui} totidem
fere simplices breviores. Radii partiali ^{inter} ~~inter~~ si que, ~~et~~ ^{et} or
patenti sumi inter medius erectus bipollucari vel panem ultra
pedicelli infimi compositi ~~reliqui~~ ^{reliqui} simplices brevissimi aeterni
distantes monostachyi. ^{patenti, imo} ~~angustulari~~ vel pollicari
obtusis vel acutis. ~~folioli~~ ^{folioli} ultra ^{rigenti} ~~rigenti~~ squamis oblongis rubris
canina margineque pallida. ~~Obtusis~~ ^{Obtusis} pollicari ^{superio} ~~superio~~ femur
truncata ~~laxa~~

austriale. E foliis caulinis ovatis, utrinque acuminatis attenuatis, staminibus
corolla inaequantibus Ca. Mark
Habitat in Europa australi. ①

pag 413

Echium lusitanicum?
mihi ignotum

humile Echinum foliis angustis lanceolatis pilosis scabris in petroleum de
currentibus, calycibus hirsutissimis De font. fl. Atl. pag 165
Habitat in deserto Barbana

nunc ignotum

9 *hippidium* E. foliis lanceolatis pinguis, racemis racemosis, ramis scaberrimis
Habitat in Cap. b. Spreng. ~~in p. Thunberg.~~

affinis capitato ad flores moni capitulo collecti sed in ramis
pallidioribus diffractis, ramis scaberrimis folia ^{subtus & alioq. hispida} supra ovata
racemi axillares. Calycis valde hirti. genitalia corolla reque
tari longiora.

Eichium hippidium : caule glabro, ramis apice foliosque
lanceolatis pilosis hippidio Thunb. prod. fl. cap. pag. 33

16 humifusum E. foliis radicalibus petiolatis lanceolatis cuneatis, caule
prostrato pilosissimo corolla brevibus. Rabris

Habitat in Babano cultis
affinis E. plantagineo. et folia radicalia lanceolata lanceolata
basi in petiolum attenuata uti caulina inferiora, puncta
et sicabra nec pilosa mollia. flores minores angustiores
radicalium supra callos punctata

add. Bank sign.

Herbarium ferri & pimum; Echium caule fruticoso; ramis folisque aculeatis;
floribus spicatis, violaceis; corollis subaequalibus Andr. repos. t. 39
Habitat in Cap. b. p. p. 24

10 *Erechtium* E. caule pro-cumbente, calycibus fructiferentibus distantibus lin. 1. v

p. 190x

Erechtium *erectum* t. 2. Planch. 2. p. 165.

Erechtium *erectum* *latifolium* *rubrum* Bauh. pin. 254.

~~*Erechtium* *erectum* *angustifolium* *rubrum* Bauh. pin. 254.~~

Habitat in Preta, oriente O

Caules teretes calli albi adpressi frangosi uti folia ramorum
Folia superiora (reliqua inferiora non prospicio) sessilia lata ovata
obscure trinervia, quadripartita scaberrima, floralia
ovato-lanceolata. Calycis frangosi lacina lanceolata
lobis vellosis linearibus s. tubo calycis breviora
filamenta apice parva pilosa lobis breviora

erectum E. caule pro-cumbente, calycibus fructiferentibus distantibus
fructu foliosi

culta

~~habitat in Preta Planch. 2.~~

orientale L. caule ramoso, foliis caulinis ovatis, floribus solitariis lateralibus Lin.

24

J. V. pag

Echium orientale, vestigiis foliis, flore maximo campanulato Tournef. cool.

6. An. 2. p. 107. & 107.

Habitat in Oriente

folia superiora in fagum Tournefortii potius
lanceolata

Tournefort non vidit

angustifolium caulibus simplicibus hispido, foliis lineariibus, corollis
calycis duplo longioribus - La Mart. pag. 412.
Habitat in Hispania
confer. Baubl. c. n. 1011.

elongatum & caule erecto piloso longissime spicato, corollis vix caly-
cem superantibus, staminibus exsertis La Mart. p. 413

Habitat

flores parvi, albi

23 vulgare, E caule tuberculato hispido, foliis caulinis lanceolatis hirsutis, flori-
bus spicatis lateralibus Lin. L.V. Fl-Dan. 445

Echium vulgare Clus. hist. 2. p. 143. Bauh pin 254.

Habitat in Europa ad vici et agros &

Caulis erectus bipedalis simplex e punctis elevatis
~~sed est pili fistulae munitus sicut pilosus. foliis~~
~~nerviis & punctis albis conspicuis utraque fistula~~
superiora bipollicaria. Racemi fere per totam longi-
tudinem caulis alterni simplices patens. Antheri-
corollo conules, genitalia corollae longiora. Semina
nigra

Corollae irregularibus.

15 plantagineum & foliis radicalibus ovatis lineatis petiolatis Lin. Mont. 202 p. v
p. 109.

Echium lato plantaginis folio italicum Banel. Ge. 445 1026.

13. Echium foliis radicalibus lanceolatis longe petiolatis Gaigu. hort. Vind.
1. 7. 45.

Habitat in Europa australi et Barbaria &

Caulis ^{pedalis} plures. Textes ^{pedalis} petis ^{pedalis} copiosi, ut tota planta, inferne molliora super
ne patiora. folia ^{integerrima} radicalia plura petiolata, ovato oblonga
bipollicaria et ultra obtusissima, integerrima, ^{capnifolia} petiolus
foliis longior se planis caulina inferiora ^{capnifolia} suprema, subinaer
ta obtusa, ^{capnifolia} sequipollicaria suprema lanceolata
acuta. ^{capnifolia} spicae terminales et ex axillis ultimis. calyces
^{capnifolia} tubulati ^{capnifolia} cuneati lanceolata acuta corolla duplo breviora
incomi corolla in quatuor vidi coemba primum quidem violacei

plant. - foliis _____ ovatis lineatis petiolatis, caulinis lanceolatis,
caulebus prostratis, genitalibus longitudine corolla.

14 *Spicatum* E caulebus descendibus simplicifloris, floribus ^{racematis} *spicatis* Len. Suppl. p. 132. &
P. v. p. 189

q. adit ad C. b. p. vii

Caules ^{pelosi} pedales vel ultra ^{herb. simplicifloris, non scabri} ~~herb. simplicifloris~~, non scabri
Folia ^{radicalia plura valde villosa} adurna remota, pauca linear-^{iniformis} lanceolata ceterum
magis, hirta, obtusa bipolliciana. Spixa terminalis, cylindrica
attenuata tri vel quadripolliciana densa. Calycis albedo
hirsutissimi. bractea pubulata longitudine calycis. Corolla
parva ff genitalibus brevior stylis hirsutis.

Spicatum caulebus
calycibus incanis

villosis ^{herb.} foliis linearis capiformibus
racemo cylindrico terminali

Eichw. spicatum caule villosis, foliis lanceolatis scabriusculis, spicis umbriatis
terminalibus Burm. prodr. pag. 5.

22 Italicum & caule herbaeico piloso, foliis linear-lanceolatis frigidis: inferioribus
nervosis, corollis subaequalibus, staminibus corolla longioribus Hort. Kew. t. p. 187
Echium flore albo Cam. epit. 252 730

Echium majus & apertum flore albo Bauh. pin. 254.
Echium Italicum: caule erecto piloso, spicis hirsutis, corollis subaequalibus
staminibus longioribus Lin. S. V. p. 140. Mus. fl. goth. 143. Hoffm. fl. Ang.

Habita in Anglia & Europa Australi in collibus sicis

Caulis interdum bipedalis, vel pedalis erectus simplex, habitus
Echii vulgari, per totam secundum totam longitudinem racemis
alternis. Colia radicalia copiosa. basi attenuata interdum
palmaria, acuta uti caulis pilis copiosissimis frigidis usens
interdum glabris tum folia supra punctata ab foliorum in parte
na superiora evidentiora. Caulina simplicia sub singulis racemis
radicis spissidissimi. corolla minoris quam in vulgari
conleli stamina corolla multo longis duplo longiora

15. Echium majus & apertum, flore dilute purpureo Tournef.
coroll. 7. R. H. 135 Bauh. pin.

Huffm. merr. vid. S. V. Echium pyrenaicum Lin. Mant. 334
Echium albus: forte hujus varietas varietas 13 forte distincta species

21 rubrum & caule ex racemulis brevibus longe spicato, corollis subaequalibus,
foliis hispida saepe fl. auctis. app. t. 3. L. C. p. 190

Facies *E. vulgari* hirsutum. Folia frequentissima, pollicaria, lineam lanceola-
ta, acuta. Thyrsus ter mesalis, pedalis. Corolla minoris quam in vulgari,
herb. Thonin

non vidi

5- *Andropogon* l. caule fruticoso, foliis lanceolatis basi attenuatis velloso-striatis
Arenis, folioli calycinis lanceolatis acutis Hort. kew. 1. p. 108
Echinum africanum fruticans, foliis pilosis Commet. hort 2. pag. 107. t. 54
Echinum fruticifolium caule fruticoso, ramis folisque pilosis Ken. l. v. p. 109.
Buzelosium africanum, echii folio, flore purpureo Plukh. mant. 33. t. 341.

Fig. 4.

Habitat ad Cap. b. spitz

Rami teretes ciliati vellosi canescentes, inferne striati. Solca supra
lanceolata obtusifolia rigida, arenis, enervis, basi inf. esp. panum an
gestura ut nique e tuberculis minutis numerosissimis cui in fidit pili
adpressi, scabra, squipolluciani. Spica lateraliter superne laterales et
terminaliter tripollucari. Bractea structura foliorum longitudine
calycis lacinis ^{ciliatis} corolla rotundata, magis regulari quam in reliquis
Calyx corolla dimidius brevior.

glaucophyllum Echuin

Echium glaucophyllum Jacq. coll. 2. p. 325, plant. rar. Ic. Cent. 2. tab 51.

Habitat in Cap. b. p. 5

Caulis fruticosus erectus, bipedalis teres glaber, supra medium ramosus. folia prostrata sessilia, lanicolata, acuta carnosula utraque glauca, glaberrima, spinulose ciliata patentia, rigidula bipollicaria. Pedunculi supremi in caule axilla rei folitarii, teretes, glabri bracteati, secundi, quoad inflorem longitudine foliorum. Bractea foliis similes. flores breviter pedicellati. Calyces glabri laciniis lanceolatis. corolla corubea laciniis ovatis subaequalibus Jacq.

naudi

om eadem cum *Echio longato*

1 Candicans: caule fruticoso foliis lanceolatis nervoso ramisque hirsutis, folio-
li calycinis oblongis lanceolatisque acutis stylis hirsutis Hort. Kew. 1. p.

186
Cichum candicans caule fruticoso, hirsutum albicans, foliis lanceola-
tis utrinque acuminatis venoso-nervosis, panicula terminali, pedi-
cellis spicatis Lin. Suppl. pag. 131. t. 5. p. 109. Jacq. Coll. 1. p. 42
Habitat in Madera rupibus altis

^{foliis}
Folia inferius, pithamea integerrima, nervi oppositi
ramorum elliptico-lanceolata pabra, ramorum angustio-
ra bipollicaria. Genitalia corolla duplon longiora stylis
basi pilosus

Tota planta albicat, quasi argentea: hirsutis albedu appro-
ximata mollior omni parte, vix a corolla excepta tegente
Pae ramis cicutatis. Folia approximata ad insertionem
oblatata. Folia versus paniculam imbricata, basi angustiora
Panicula ramum terminans, concia multispicata. Spica
pedicellata, simplicis, foeniculata Lin

Cichum Candicans Ca Math. pag. 414. Tab. 94. fig. 2

~~Finis~~ in tomentopitatem cultura exuit

