

# Ecdiptea

1. erecta L. caule erecto, foliis lanceolatis basi deflexis sessilibus
2. punctata L. caule erecto punctato, foliis planis
3. glabrata L. caule erecto, foliis petiolatis ovalibus trinerviis subintegerrimis  
glabris
4. repens L. caule repente, foliis cordato-ovatis crenatis
5. prostrata L. caule prostrato, foliis subundulatis subpetiolatis
- ~~6. latifolia L. caule erecto, foliis ovatis petiolatis pubescentibus lobatis~~
7. sessilis L. caule erecto, foliis subamplexicaulis ovatis dentatis  
floribus axillaribus sessilibus difformibus.

caudex  
cum  
lobis  
dentatis

procumbens. dedit Rich

elongata Eripta

Habitat Cayenna herb. Rourei

Caules herbacei, erectus, villosus, scabriusculus, ramosus, pedalis et ultra. Rami  
oppositi, elongati, simplices. Folia sessilia, pollicaria, lanceolata, remote serrata  
scabra, villosa, acuta. Pedunculi terminalis, elongati, gemini, uniflori



1 erecta *Eclypta* caule erecto foliis lanceolatis basi deflexis sessilibus Lin Man. 28 6. 475\* S.V. p.

778.

*Eclypta Rumphii* Amb. 6. 7. 10. fig. 1.

7 Habitat in India Orientali, Madagascar, Arabia &c.

Caulis herbaceus, erectus, simplex, scabriusculus pilis albis adpressis tuberculis minutis in  
dentibus. Folia sessilia basi opposita, lanceolata, serrata, integerrima, triplicinervia  
punctata, pilis adpressis adspersa. Pedunculi axillares, gemini ex altero axilla, foliis  
breviora pilosi, uniflori, aphylli, sub flore inopore alter brevior. Semina subtriquetra  
municata, obovata, <sup>et</sup> palea fitacea. Siliola calycina ovata, acuta  
Variat foliis brevioribus magis elongatis.

♀ microlium Hoffm. Descrip. pag. 152. n. 96.

creta Eclipta <sup>Eclipta</sup> caule erecto, foliis basi deflexis / esplebus L. S. V. pag. 770.

Micrelum Cosk. deser. pag. 152. n. 96.

Nullum dubium mihi foret, quin Micrelum et Eclipta ejusdem generis sunt, Character enim Micrelii ~~exactly~~ <sup>exactly</sup> Cosk. ~~exactly~~ <sup>exactly</sup> respondet characteri Ecliptae Mantisa Lin. pag. 157. ut conferenti patebit. Adde, quod Micrelis Cosk. in omnibus conveniunt cum speciminibus Ecliptae Cosk. et prostat in herbo applicati sepi est ex India misit.

Folia hujus utroque attenuata, utroque albo punctata, <sup>ut</sup> punctis albis adpressis punctis infidentia, serrata: serraturis utroque 6.7. remotis



*Pseudocimella* Eclipta folis lanceolatis sessilibus serratis atten-  
nuatis, caule erecto.

Veterna folis lanceolatis subserratis, pedunculis  
florae longioribus in fl. deyl pag 308 x

Habitat in India orientali. vli ad prespo ad prespo  
Caulis herbaceus erectus subramosus. Folia utrinque  
attenuata obtusa vel emissa serrata longae 3-4 pollice  
nascitur nervosa venosa. Pedunculi axillares  
et terminales uniflori alternaria alter longior  
calycis foliolo orot semina 3quetra rugosa liberulata  
nec planta cum Trimum Verbesina cimella herbam  
Hormari ne optime convenit fuffi minime vero cum defuyit  
most in fuffulor quod Linnous prorem obtitus alteram  
eandem credidit et sic plantas duas diverse conjunxit

2 punctata Celipta Caule erecto punctato, foliis planis L. Mant. 206. Jacq. pl. Am. sel. pag. 270 \*  
Bellis ramosa, caule ramoso Jacq. amer. 216. tab. 124  
Habitat in prateriis humidis inundatis, que orantimis Domingo, martinique &  
Caule erectus, uno ramus scaber, sesqui pedalis, rubescens, adpressis punctis albis.  
+ sessile, opposita, folia lanceolata oblonga, acuta, serrata, scabra, bipollicaria. Pedunculi uniflori  
subterminales. Flores albi Jacq. t. c.





4 Sesplis E. ? caule erecto, foliis subamplexicaulis ovatis dentatis; floribus axillari-  
bus sesplibus discoides Sw. prodr. pag. 114.

Habitat in Jamaica O

michi igne



nodiflora Eiot. foliis oblongis scabris integerrimis floribus  
terminalibus axillaribusque sessilibus

Habitat in Brasilia

Subanom.

folia ovata <sup>ve</sup> oblonga vix peltata. Caulis ut folia  
adpresso vel pilis albis adpresso. Folium scaberrime  
solido calycis ovato. Semine tuberculato palea  
Hinc semina calva

4 repens *Eclipta* Caule repente, foliis cordato cordato-ovatis crenatis

Habitat in Madagascaria Thourin, Commerson.

<sup>Herminedales, tripartita</sup>  
Caules repentes, teretes, vix pilosi. Folia petiolata, congesta vel in aequalibus  
apicem remota, alterna, sessil cordata, glabra, obtusa, crenata, ungui-  
cularia, subtus pallidiora. Petiolus longitudine folii. Pedunculi oppositi  
folii solitarii, ascendentes, longitudine calicis, teretes glabri, uniflori  
supra medium foliolo setosus in fruitu. Elos glabrus. Soliola calycinaria  
oblonga. Pappus magis minutissimus, ceterum nullus. Paleo setosus.



5 prostrata *Eclipta* caule prostrato, foliis subundulatis subpetiolatis Lin. M. 120  
*Chrysanthemum oradenaphatanum*; mentha arvensis folio et facie, floribus bigemellis  
ad alas, pediculis curvis Pluk. alm. 100. t. 110. f. 5.  
*Eupatorium ophalassoni* mentha arvensis folio Vaill. art. 590. Dell. Elth. 139. t. 113. f. 130.  
*Verbena prostrata* foliis lanceolatis serratis, floribus alternis geminis subsessilibus  
Lin. Sp. pl. pag. 1272.  
*Micrelum Tolak* Ersk. desc. p. 157.  
Habitat in India et Arabia felice.  
Caulis prostratus, ramis superne hirsutis, cuncta hirsutis minoribus. Ramis oppositis. Folia  
sessilia, opposita, lanceolata, subserrata, punctata, pilis albis adpressis adpressa.  
Pedunculis axillares gemini foliis brevibus, in fronte sua flores subsessiles. Semina  
quadrifariam mucronata, Calycis foliola lanceolata

prostrata Eclipta caule prostrato foliis subundulatis subpetiolatis

lin. T. V. pag. 728

Miscelium Solan. Hoffm. Deser. pag. 152. no. 96.

Caules depressi, pilosi, prostrati versus apicem

Folia lanceolata, triplo breviora quam in prostrata,  
sed magis pilosa, se ab inflexula.

Flores pedunculati; peduncululi breves.