

Chretia

Barmaea Pavan. Labbe et omnia semel retusa eundemque generis
vixit Dubium

Diffusa Ehretia foliis oblongo-ovatis integerrimis acuminatis glabris lobatis, pa-
niculas dichotomas diffusas.

Habitat in Guinea 98 et 5

Tota glabra, lavis. Rami teretes, purpurascetes. Folia petiolatis, distan-
tia, 3-4 pollicaria, ^{lata,} membranacea, obscure venosa, acuta. Petiolus
semi-pollicaris. Panicula terminalis, plures dichotome divisa.
Glomeri parvi. Palyx squedentatus. Stylus bifidus, corolla parum lon-
gor.

nona trifoliam collocatus

Erechtia

Habitat in St. Domingo herb. Desfont.

Species E. Beurenii. Rami teretes; cortice griseo, superne villosa-subtomentosi. Folia petiolata, alterna, bi-3 pollicaria, oblonga, obtusa, integerrima, tenera, venosa, supra glabra, subtus puberula. Panicula terminalis, foliis brevior. Pedicelli; uti calycis, inani. Calyx lacinae 5que ovata. Corolla glabra

tomentosa Ehretia

Habitat herb. La Martini 5

Folia oblonga, pollicaria, basi attenuata, acuta, subtus villosa tomentosa
affinis tenuifolia

Beurroera L. foliis ovatis integerrimis coriatis, floribus subcorymbofis calycibus
glabris Lin. Spec. pl. pag. 275 Jacq. Am.

Mespilus americana laurifolia glabra, fructu rubro mucagenoso Com
bert. 1. p. 153. t. 79

Tasmenum penicillatum folio, flore albo, fructu flavo rotundo Vetryay
veno Sloan. hist. 2. p. 96. t. 264. fig. 1.

Bouneria arborea, foliis ovatis alternis, racemis racemosis termi
nalibus Brown. Jam. 160. t. 15. fig. 2.

Pittonio simili laurifolia foliis, floribus albis, bacis rubris Catesb.
Carol. 2. p. 79. t. 79.

Malpighia
Cubi, fructu
torollano
Plum. fig

Cordici Bouneria Lin. Am. acad. 5. p. 395*

Habitat in Jamaica

Rami glabri superne angulati folia petiolata spar
sa lanceolata elliptica utroque acuta apice in
ferdum obtusa glabra in pollicaria mucroni minuto
terminata ~~parvula~~ ~~terminalis~~ flores corymbofi panicu
lata Calyx glaber

petiolari E. foliis ovatis integris longe petiolatis corymbis pedunculatis
caullantibus, corollis campanulatis La Mart. pag. 425

Christia internodi. L'Heritier. Sup. 3. V. 24.

Habitat in Inf. Franco 5

Calyx monophyllus, 5que partitus: laciniis subaequalibus. Corolla unicolata
campanulata. Tubus ventricosus, calycis parum longior. Limbus brevissi-
mus, quinque dentatus, dentibus revolutis. Germen ovatum. Stylus ter-
staminibus longior. Stigmata duo capitata Richard

aspera Erechtii foliis lanceolato-oratis scabris, cymbo micanti secundis
dichotomis

Erechtia aspera foliis ovatis scaberrimis, flentibus cymbois pinnatis
secundis Weder phytogr. fasc. 1. pag. 4. tab. 2. fig. 1.

Habitat in India orientali

cons. Erechtia foliis ovatis glabris, floribus lateralibus corymbose spicatis
secundis divaricatis Wed. spec. pl. pag. 1077.

Erechtia laevis Roxb. corom. 1. 42. tab. 56

Habitat in montibus Circarensibus India Orientali 5

non vidi

Senecio *Ehretii* foliis obovatis integerrimis, floribus sesquialteris calycibus peltatis W. & A.
phyt. p. 4. t. 2. fig. 2.
Habitat in Malabar.

an *Diospyros* foliis floribusque parvis

opere Erechtia folus ovatis pinnatis, floribus corymbose pinnatis secundis Willden
phys. pag. 14. tab. 2. fig. 1.
Habitat in Malabaribus

Dubia E. folio oblongo lanceolatis integerrimis, retunicatis unifloris aggregatis
gatis laevi. off. 1. pag. 14

Medi. cymata

~~apera~~ ~~Enroter~~

Spinosa Erechtia spinosa Lin. S. V. p. 230. Gaigu. Amer 46 t. 00 fig. 10.

Habitat in America?

Rami teretibus cortice cinereo, glabr alterni saepe dichotomi
~~Dichotomi~~ sursum flexuosi divaricati. Spinae seminae
in ulcere patenti apice folia saepe in axillis spinarum plura
unguiculata obtusata breviter petiolata glabra, supra
si ab oculo armato punctata subtus pilula pubescente
pallidiora.

virgata Eket foliis oblongis integris superne scabris, ramis filiformibus, floribus termi-
nalibus parvis, calycibus hispidis Sw. prodr. pag. 47.
Habitat in Hispaniola

non vid.

Tinifolia *Chretia* foliis oblongo ovatis integerrimis glabris, floribus paniculatis
Emon. acad. 5. p. 395. L. V. pag. 230. Trew Chret. t. 24

Cenop affinis arbor baccifera racemosa, flore albo pentapetalo, fructu flavo
monopyreno Dulci Dulci Sloum hist. 2. p. 94. t. 203. fig. 1. Raii Dendr. 45.

Chretia arbores, foliis oblongo ovatis alternis, racemis terminalibus Brown
jam. 160. t. 16. fig. 1.

Habitat in Jamaica

Coris Elaeagni foliis ovalebus, pinnis dichotomis

Roxburgh. pl. Coromand. pag. 42. t. 56.

Habitat in India orientali.

Coris

opera ib. pag. 41. tab 55

exsucca Ebre^{ca} foliis cuneiformi lanceolatis margine reflexis Lin S. V. pag. 230.

Perhamensis cumanaensis Loe fl. et. 184

Baurrenia exsucca fructibus exsuccis quadripartitis Jacq. Amer. 45: t. 173. f. 17

Habitat in America meridionali.

non vidi

tomentosa E. foliis ovatis, superiore siculis subtus tomentosi, tubo corollarem
calycis duplo longiore. Ha. Marsh. pag. 425;

Maxi foliis majore acuminate arbor baccafera fructu minore Esc. C. C.
Dilleni Sloan herb. 2. p. 4. 209. fig. 1

Asmenum perilymeni foliis, flore albo fructu flavo rotundo
tetapyren Sloan herb. 2. p. 4. 204. fig. 1

Habitat in Domingo 5

n

Sarronia parviflora foliis ovato-oblongis serratis, pedunculis oppositifolius alter-
nantibus, spicis globosis Ord. Decid. pag 86

Habitat in nova hispania 5

Emittit bipedales, scaber. Caulis erectus, tenax, ramosus. Folia ^{petiolata, patenti-} praesens, oblongo-ovata
canaliculataque, a medio ad apicem serrata, lineata, petio. Pedunculi rami, foliola
ni folio paulo breviora, inque alternantis, ramis oppositi. Flores in capitulis
globosis aggregati, sessiles parvi. Calyx squidentatus. Corolla alba calycis duplo lon-
gor. Stylus dichotomus. Stigmata quatuor