

# Elaeagnus

+ inermis

1. angustifolia E. foliis lanceolatis argenteo-nitidis
2. orientalis E. foliis oblongis ovatis tomentosis opacis
3. latifolia E. foliis ovatis; pedunculis axillaribus aggregatis flore  
minoribus brevioribus
4. multiflora E. foliis obovatis obtusis, floribus pedunculis axillaribus aggregatis  
flore longioribus
5. umbellata E. foliis obovatis obtusis, pedunculis axillaribus aggregatis  
flore brevioribus
6. glabra E. foliis ovato-oblongis acuminatis, pedunculis axillaribus  
subsolanis
7. coccinea E. foliis lanceolatis-oblongis obtusis undulatis, pedunculis  
maris solitariis lateralibus  
++ spunosa
8. spunosa E. foliis ellipticis ramulorum basi spunosa
9. pungens E. foliis oblongis undulatis, floribus axillaribus brevibus, ramulis  
truncatis

1. angustifolia L. inermis foliis lanceolatis nitidis ut argenteo nitidis

Elegans Cam. Epit. 106.

Olea sylvestris, folio molli iniano Bauh. pin. 472.

Habitat in Bohemia, Hispania, Mauritania, Syria, Cappadocia, inque  
aquis fectis locis subhumidis &

Arbor medicinis ramis gl. senonibus glabris purpureis nudis  
veretibus alternis, pinnonibus fectis uti folia et calycis squamis  
argenteis nitidis. Folia alterna petiolata obtusiuscula bi  
pollyana. Peduncululi axillares terni <sup>petiolo brevior</sup> indermedis longior unifo  
ri latius ovatis

Diff. pedunculis solitani foliis latioribus, supra squamis distan  
tibus differ  
<sup>floribus duplo majoribus</sup>

2 orientalis *E. inermis*, foliis oblongis ovatis <sup>tomentosis</sup> *opalis* *den. Mart. 41. \* LV. p. 163*

Habitat in Oriente.

Folia duplo latiora quam in angusti. folia fere ovato-lanceolata, obtusis pinnis, utroque mollia tomentosa uti rami, supra  
frondis minime nitida vel argentea

3 *Catifolia* E. inermis foliis ovatis Fl. zeyl. 50.  
Eleaehnus foliis obtundis maculatis Burm. zeyl. 92. V. 39. fig. 2.

Habitat in Zeylonis

Species angustifolia, at folia tripla lateria, vel ovalia supra  
nisi superiora ovata, <sup>nuda</sup> <sup>obtusis</sup> basi acuta

glabra nunquam argentea, subtus nitida. Pedunculi axillares  
#

petiolo triplo brevior <sup>in</sup> <sup>ter</sup> <sup>quaque</sup> <sup>obtusis</sup> calycis oblongi  
bus

vel oblongis subtus argenteis

*Zizyphus zeylanicus* argentea species casari hinc Paris. secundum herb  
Tournef

4 multiflora L. inermis foliis obovatis obtusis, floribus axillaribus aggregatis,  
pedunculis flore longioribus Thunb. fl. jap 664 t. V. p 163

Habitat in Japonia &

Trux ramum ramosus. rami et ramuli alterni, vertes, supro-ferugini, pa-  
tentes, punctato scabri. folia e singula gemma plura alterna, petiolo  
ta, integra, exita; supra fere nulla puncti squamosi argentei; subta  
tota squamoso-argentea; inaequalia, subpollicaria. Petioli pollicari-  
bra capillares, brevissimi. Flores e gemma inter flores folia, plures  
pedunculis capillares, caeteri argentei, pollicares. Calyx clavatus  
oblongus Thunb.

5 umbellata. E inermis foliis obovatis obtusis floribus axillaribus aggregatis, pedun-  
culis flor. brevibus Thunb. fl. jap. 66. t. <sup>14</sup> S. V. p. 164

Habitat in Japonia +

Fructus. Rami alterni, teretes, ferrugineo pubescentes, punctato-scabri.

Folia e gemmis alternis; plura, petiolata, patula; supra rubidiuscula  
nervis argenteis; subtus argentea tota. unguiculata. Petioli capil-  
lari, brevissimi. Flores e gemma inter folia plures, subumbellati  
carni. Calyx cratus

6 glabra & inermis foliis ovato-oblongis acuminatis, floribus axillaribus subsplenda  
nis Thunb. fl. jap. pag. 67 & S. V. pag. 164

Habitatio Japonia

arborescens. Rami subtecti nudiusculi, lutei. Ramuli angulati, cinereo  
rufescentes, punctato-scabri, alterni, erecto-patuli. Folia alterna  
petiolata, integra; supra viridia, glabra, subtus rufescenti-squamo  
sa interphasibus punctis ferrugineis, sesqui-pollicaria. Petioli lingu  
culares, supra canali culati. Flores solitarii vel bini, peduncu  
latis erecti. Pedunculus capillaris, flore brevior Thunb.

o *Crippa* E. folus lanceolato - oblongis obtusis undulatis, floribus solitariis Thurb.  
fl. Goy. p. 66 & S.V. p. 163.

Habitat in Japonia 5

Rami et ramuli alterni teretes, di-panicati, erecti cinesii, puncta-  
to-scabri, ultimi angulati albidii. Stipula alterna petiolata  
supra nuda, suscipientia, punctata sulco medio longitudi-  
nali: subtus argentea, sesqui-pollicaria. Flores in ultimi  
ramuli sparsi non axillares.



maxima P. foliis ovatis subdenticulatis pubescentibus novemnerviis; spicae  
cylindrica imbricata, Linn. Vart. Hort. Kew. 1. p. 151.

Plantago Gmel. Feb. 4. p. 71. t. 35.

Plantago maxima Jacq. Coll. 1. p. 82.

Habitat in Sibiria 4

Spinosa. E ramulorum basi spinosa, foliis ellipticis <sup>Ly. acad. 4. p. 305 ±</sup> ~~Thunb. fl. jap. p.~~ L.V. p. 164  
Eloagnus Matth., in foliis seu seipsum Rauw. it. 112. 276.

Habitat in Egypto;

Differt ab <sup>El.</sup> angustifolio. Foliis dimidio brevioribus, sed non angustioribus ellipticis, figura et magnitudine Vaccinii uliginosi, supra magis nudis et raris. Flores quadruplo minus et acutiores. Spina valida et singulam ramum exortum. Cortex in caudice niger glaber, in herba argenteus his.

pergens & ramulis frutescentibus; foliis oblongis undulatis, floribus axillaribus  
binis Thunb. fl. jap. pag. 604 L.V. p. 164

Sinu Vietai Kumpf Am. bot. pag. v. p. 709.

Arborescens; oxygala, fuscescens. Rami teretes, cauli similes, flexuosi  
aphylli. Ramuli alterni, foliosi, rigidi, apice frutescentes; ultimi  
ramuli axillares, frutescentes, brevissimi, aphylli. Tota albescens,  
petiolata, obtusifolia, integra; supra glabra, vixida; subtus qua  
moso argentea interspersis punctis ferrugineis, pollicum à 1/2 in  
petiolo unguiculatis. Pedicelli floe breves

Differt ab E. sp. ramulis frutescentibus; foliis oblongis latis  
nibus, floribus subternis majoribus Thunb.