

Cloucarpus

1. *serotus* E. foliis lanceolato-ellipticis serratis, racemis axillaribus
2. *obovatus* E. foliis obovatis serratis, racemis axillaribus
3. *copallinus* E. foliis integerrimis, panicula terminali
4. ~~*monogynus*~~^{*dentatus*} E. foliis oblongis superne dentato-serratis racemis axillaribus
5. *diversa* E. foliis oppositis ovatis duplicato-serratis, racemis compositis

2 obovatus E. foliis obovatis

Elaeocarpus serrata Retz. *obj. 4. pag 27.*

Habitat in India orientali

Rami teretes, ciliatissimi, glabri superne vix pubescentia alternata
Folia ad apices ramorum, approximata, petiolata, remota
serrata, tripollicaria, glaberrima obscure venosa
Calycis laciniis lanceolata attenuata

forte nil nisi varietas serrata

obovatus Elovoarpus foliis subovatis venosis integerrimis subtus scabris
sculis, raris terminalibus flexuosis
Habitat in Guinea 93 et 5

Rami teretes, fusco-purpurascens; laxes, glabri, flexuosi. Solia petiolata,
alternata, per petiolum ramum decurrantia, bis tripollicaria, venis sine
venoso, venis exstantibus, supra levia, subtus scabriuscula, obliqua nervosa
ramum acuminata. Petiolus subtus carinatus. ^{Peduncul.} Petiole nullis uno altero
se adspersi. pariales et pedicelli sparsi. Calycis foleda subrotun-
da, margine ore latis subulata.

fimbriata Elaeo carpus

Habitat in Ampela Borbonia Commeson herb. Guaf.

Rami teretes, glabri. Folia versus apicem ramorum, ^{alterna,} pithamea, elliptico lanceola
ta, integerrima, glabra, venosa, obtusa, basi subovata. Petioli pollicares: ho-
cemi infra folia, bi-f. tri-pollicares, simplicis. Pedicelli penduli, medio bractea
ti. Calyx siphylleus: foliola ovato lanceolata. Petala sive minime, fimbriata. Stamina 10.

integerrimus Escarpus.

Habitat

Roma glabris

Vedit la manna

glanduliferi Elaeocarpeus

Habitat in herb. Guaf.

Rami teretes, glabri, fusci. Folia petiolata, opposita, tripollicaria, basi cordata, oblonga, venosa, coriacea, supra longitudinaliter ad insertionem venarum in costa glandulosa-inflata, glandula nigra (an ab insectis) inque angulis venarum densi, utrinque y labra, supra nitida. Racemi axillares, solitarii, 5-6 pollicares. Pedicelli parvi. Calycis foliola lanicolata, canescentia. Petala 4 fimbriata, extus cineriscentia. Germen sessile.

Elooiarpus lancolato-ellipticus

ferratus Elooiarpus gatus alternis oblongis ferratis, racemis axillaribus len

Elooiarpus ferratus len. Speci: pl: pag. 734. non Supplem:

Rami teretes, ciliati, glabri.

Folia petiolata, tripollicaria, obtuse ferrata, glabra, nervosa venosa

Racemi axillares, flores diffracti.

3 Dicera Eloocarpus foliis oppositis ovatis duplicato serratis, racemis
compactis, floribus tetragynis

Dicera serrata tetragyna, bacca quadriculata, loculis
monospermis Forst. nov. gen. pag. 80

Eloocarpus dicera tetragynus, foliis oppositis ovatis duplicato
serratis, racemis lateralibus oppositis Lin. Suppl. pag. 266

Rami teretes, superne compressi, scabuli.

Folia petiolata, glabra, subtus venosa, bipolliciana, at-
racemi ^{nyctagyni} tripollicares, erecti.

Subnervosa ascensu racemi
infra foliacea herb. Forst.

186

~~175~~

Subbiflora A. foliis ternatis bipartitis multifidis involucri foliis tripartitis
ternatis trifida caule subbiflora.

Habitat ad f. e. h. m. magellanicum

Planta palmaris pilosa

Folia radicalia ternata foliola lateralia bipartita intermedium
tripartitum lobis trifidis denique subbifidis linearibus. Capus
foliis triplo altior glabro involucrium foliis ternatis petiolatis
tripartitis trifidis laciniis saepe subbifidis. Pedunculus florum
tomentosus. Corolla magnitudinis A. nemorosae eius villosa
intus flavis petala petalis alternis angustioribus Pedunculi
interdum gemini

Copalliferus Elaeoarpus foliis integer rimis, panicula terminalis

4 India Vatena Lin. Fl. Zeyl. 204.

Ponoe Rheed. Bot. Malab. 4. p. 33. Tab. 15.

Eleoarpus copalliferus, foliis integris Retz 4. pag. 27.

Arbor et cetera.

Rami Verdes, superne pulverulento-tomentosi, ferruginei

Solia petiolata, alterna, lanceolata semipedalis et ultra,

lanceolata, acuminata, basi rotundata, pollices per tres

Vatena India Lin. S. V.
lata, ^{subsonata} utrinque glabra, supra secundum nervos venis fine lineari-
bus, lineis obsequionibus obliquis inter nervos, subtus nervi
protuberantibus, alternis.

Petala bipollicaria, verdes, super versus folium craspedi, pul-
verulento-vellosi.

Panicula terminalis, pedalis, patens, pulverulento-tomentosa, acuminata, ramis, pedunculi partialiter veretibus ultra. Flores in
ultimis ramis panicula racemosa, nudantes.

Calyx. Perianthium 5 que partitum, persistens, tomentosum,
in anum. laciniis lanceolatis, linguicularibus, ob-
tusis intus villosis, carinis, subseriatis

Corolla. Petala 5 que, oblonga, glabra, coriacea, integri-
ma, calycis dimidio vel longiora, glabra

187

176

2 Dentatus
Monogyne Eloocarpus ^{alternis} foliis oblongis superne dentato-ferocatis, racemis axilla-
ribus, floribus monogyne

Dicera dentata monogyne Torr. n. gen. pag. 80

Eloocarpus ferratus monogyne, foliis alternis oblongis ferratis,
racemis axillaribus Den. Suppl. pag. 266. non spec. plant.
et Syst. Veg. Ed. 13

Habitat in insulis maris pacifici;

Rami teretes, punctati, glabri: ramuli pubescentes.

Folii petiolato, alterna, bi pollicaria, superne remote
dentato-ferata, basi ^{utrinque} acuta, utrinque glabri, excepto
in costa, supra nervosa, subtus ^{pubescentia} ~~nervosa~~

Petioles villosi.

Racemi quoque terminales, simplices

185

174

3 Lami F. foliis oblongis ~~ovatis~~ serratis ^{sub} ~~na~~ ^{floribus} terminalibus

Habitat in India orientali

Ramuli flexuosi; cortice cinereo glabri; subangulati

Folia petiolata, alterna basi attenuata, apice acuminata
superne dentibus nonnullis obtusis serrata bis. In pollicianis
v. infra utrinque glabra.

Petiolus brevissimus

Pedunculus terminalis solitarius ^{vel} gemini pollicares; pedicellis
uni flori vel bi flori. Capsula unguiculata 4. subtota
deventriosa mucronata, glaberrima nitida

Calyx tetraphyllus

obovatus

E. foliis obovatis serratis, racemis axillaribus.

Elodi corpus ferratis. Bot. 2. obf. fasc. 4. pag. 27

Habitat in India orientali.

in modo varietas ferratis. Differt foliis majoribus latioribus obtusis.
petioli utraque illo basi apice utroque glandula minuta

Sylvestris Adenodis Lour. fl. Cochinch. pag 294

Habitat in sylvis Cochinchinae

arbor mediocri. Folia ovato-lanceolata, serrata, 9 loba, alterna

Spica subterminalis. floris albo rubropue variegati. foliola
calycis lanceolata, decidua. Petala ovata sabereeta calycis

aequalia cal multifida lacinis linear filiformibus. Necta
num glanduloseque magna. filamenta 15: receptaculo infertur.

anthera tetrazona apice hiantia reflexo. Germen longiusculum.

stylus subulatus. Higma acutum. Drupa ovato-oblonga
muru.

Sylvestris Elaeagnus

non vidi

flexuosus Elocos aqua foliis lanceolatis integerrimis glabris racemus termi-
natis ramis flexuosus

Vatena flexuosa Lour. fl. Cochinch. pag. 334.

Habitat in sylvis Cochinchinae.

Pernanth. 5 fl. sum, petala 5que alba. folia alterna Pappula 3loba
Involucris perma. Semen 1. subtendua anellatum pedicellatum

non vid.

Integerrima Elaeagni folis lanceolatis integerrimis floribus congestis
axillaribus Lour. fl. Cochinch. pag. 338.

Habitat in Cochinchina &

arbor. Folia glabra petiolato altera. Flores saepe celesti, pedunculati
in axillaribus congesti. Cal. 5 phyllis. Corolla 5 petala laevia
germ Stylus 1. Germena 10 nuda Intra 1 monosperma.
pauca nigra

non vidi

ca. hujus generis