

Elegia

Calyx sex glumis inaequalis. Corolla 0. Capsula triloculari.

1. *vaginata* E. culmo inferiore tereti superiore subtriangulo, ^{vaginae articuli longioribus} spathis lanceolatis acuminatis, squamis florum acuminatis
2. *juncica* E. culmo tereti vaginae articuli brevioribus, spathis ovato-lanceolatis acutis, squamis florum acuminatis
3. *obtusata* E. culmo tereti, spathis ovato-lanceolatis attenuatis, squamis florum obtusis
4. *filiformis* E. culmo tereti filiformi, spathis oblongis squamis $\frac{2}{3}$ florum obtusis

2 juncea C. culmo tereti vaginis articulis brevioribus, spathis ovato-lanceo-
latis acutis spicis alternis spatulosis squamis florum acuminatis

Elegia juncea Ten. Mart.

Restio thyrsifer: culmo nudo tereti, thyso oblongo terminali, spa-
this alternis maximis in lobos diviso. Rothb. gram. pag. 8.

no 9. Tab. 3. fig. 4.

Habitat ad C. b. sp.

Culmus crassius penno columbina quadrifidus; simplicis-
mus; articuli pithamoi, Corbus. Vaginis decidua
panicula thyrsus terminali, pedunculi alternis, spathis
alternis subpollinibus alternis ferrugineis flori teretes
spicula conglomerata ovata imbricata squamis con-
cavi ovatis, acuminatis.

3 obtusata E. Culmo tereti, spathis ovato lanceolatis attenuatis squamis
florum obtusis.

Hab. Ital. ad Cap. b. p. n.

Similis reliquis. Vaginis laxis ferrugineis oblongis. Spica
3. 4 in ala singulae spathae. Squamae ovato ferrugineae obtu-
sa breves inter nodis compressae

4 filiformis. E. calmo Veneti filiformi, ~~specie simpliciter albarum~~, spatha
oblongis obtusis.

Habitat in Cap. b. per

Calmo pedalis, erectus, glaber. Differt a reliquis Veneticis
calmo veneti, spathis semper unguisculantibus; ~~in modis~~
~~longioribus.~~