

47 Elytraria

Cal. 4-partitus. Cor. 5-fida, subequalis. Stam. 4: 2. 8 sterilia
Caps. 2-valvis, 2-locales. Sem. dispergimento contrario ~~ad~~
inferne annexa. Micraux.

crenata
repanda 1. *Elytraria squamiflora* ovalis integrimis, scapo lanuginosum marginis nudis,
foliis oblongis crenatis.

Plantaginio facie in India orientalis, Nella Cunumbee Malabarorum. Bluthn.

aem. 175. t. 438. f. 1.

Fuscia acaulis Lin. Suppl. 84.

Habitat in India orientali 2

Radix pubescent, superne canalis. folia radicilia, plura, interdum spathulata,
basin versus parum angustiora, subsessilia, grosse crenata, venosa;
venis supra glabris, subtus villosis. Scapo pluris, crenatis, simplicistimis, foliis
dimidio longioris; squamis acutis, apice imbricatis. Spica terminalis cylindrica,
simpliciter imbricata; squamis aliis, crenatis. Bracteas duas linearis
ad basin calycis. Calyx ^{carunculatus} 4quaque partita: lacinia superior oblonga, reliquis
et quadripartitus calix, brach inferioris crenata, villosa.

Lyrata 2. Elytraria squamis floriferis
scapi lanceolatis, foliis lyra-
do pinnae fidae lacinies terminalibus integriformis
Habitat in India orientali 4
folia raddi calicea, petiolata, pellucida vel parum ultra, glabra lacia.
Lacinia obtusa, terminalis obvata. Petoli hirsuti. Scapi tripliollares
Allego ut in Erenata.

4-5 foliolum ex
mucro rugoso unguiculato in rufis exsertis longioribus
lacinia terminalis integriformis foliis latis
petiolis hirsutis ex parte apicis et terminali
mucrone rugoso unguiculato in rufis exsertis longioribus
lacinia terminalis integriformis foliis latis
petiolis hirsutis ex parte apicis et terminali

ovata 2. *Sanchezia* foliis ovatis petiolatis subtilis pubescentibus, bracteis often
glo emarginatis

Sanchezia ovata; foliis ovatis acuminatis, petiolis semi cylindricis

D. Cor. ^{operus.} L. p. T. D. f. C.

Habitat in Peru. stagnatis et umbrosis. Ex museo Gustodi.

Caulis ~~ver~~ divisus. Folia patentia, ^{crenata,} venosa, supra nitida, crenata. In
volucis foliola concava, acuta, apice reflecta, punicea. Calyx tubu-
losus; inferne angustatus, ^{quin} que pars altius, purpureus. D. Peruv. L. C. T

Corv. Spec: Caule herboeo, ergali Tetragonio, glabro, erecto; foliis
oppositis, petiolatis; floribus in spicis verticillatis involucratis.
involucris ovatis, diphyllis, ovatis, persistentibus; bracteis puniceis
Cerullis luteis; filamentis hisutis. Anthera

virgata 3 Elytraria & squamis floriferae ovatis margine villosis, & capi foliis que lanceolatis
integerrimis glabris
Anemone carolinensis; foliis radicalibus ovato-oblongis; Stems undique imbricatis,
& squamis cuneiformibus; spica conferta bracteata bracteata, terminalis
Walt. fl. car. 60.

Tubiflora carolinensis Gmel. ad. Syst. Lin. 2. p. 1. p. 27.

Elytraria virgata; foliis superne integris; nervis subtus glabellis; staminis longioribus: capsula obtusiuscula. Michaux fl. bor. Am. 1. p. 9. t. 1.

Habitat in humidiis Caroline inferioris Borc. 4

Solia subsessilia, plura, bipinnicaria, acuta, utrinque glabra, vix oblique
nervosa, avenia. Scapus pedalis ultra; Squamo alterna, subvaginantes,
unguiculares, ovato-lanceolata, attenuata, glabra, nitida, apice patente.
Spicæ utræ pinnicaræ, interdum solitariae, interdum quinque pedunculatae,
& squamo acuminate, margine membranaceo villosa. Stems unicus sub
binaria squama. Bractæ ad basin calycis linearis. Calyx profunde qua
tri-partitus: lacinia villosa, duo opposita oblonga, latiora, inferior bidentata;
duo interiora lineares, angustiores. Corollo lacinia crenata.

56 *Elytraria*
marginata ~~Littoralis~~ squamis
marginie membranaceo ciliato; foliis cuneatis integrerimis

Habitat ad Senegal.

47 ^{ad} Senegal. 4

Dacryodes affinum. Solia radicalia, 2-3 pollicaria, in petiolatum alterna-
tuata, extorrisum dilatata, obtusiloba, avenia, remote subnervosa, lobi-
que glabri, ut caput radicis. Scapi plures, digitales et ultra, glabri;
a basi ad apicem imbricati squam & lovi, marginie and membranaceo
ciliato. Polyg. ~~racemosus~~, linear-lanceolata, dorso vindex; glabre
excepto apice mucronato, apicem versus ciliata, subequalis.

Petioli et scapi basi interdum vellosi.
Habitus solia ~~radicale~~ imbricatae. Scapi eructi, simplices, toti verti squamis
et pectinis. Spica terminalis, plenumque solitaria, raro plures, capo binie-
ti, modo parum crassiora.

Corporoides Gutierrezia species at illaribus recurvatis, bracteis cuneiformibus;
foliis lanceolato-ovatis hispido-lepidi

Habitat in America Gutierrezia Corporoides fructuosa foliis lanceolato-ovatis hispido-
mentosulis Rami teretes, cortice cinereo, superne villosi
folia subtilis pilosa Tab. 1

Speco at illas terminalesque, erecto apice recurvato.

folio secundum. Bracteas minutas

Polyx parvus

Corolla pollicarii labii integris

Capsula ut in Gutierrezia bivalvi

Fusticaria foliis oblongo ovatis hispido-pilebus, floribus spicatis
alioribus laete fructuosa Mill. Det. n. 1.

non ord.

92

tridentata 4 Clypearia
imbricata partita aculeata, Squamos floriferis tridentatis, foliis lanceolatis late
geminis stevi subulatis, foliis lanceolatis in tegumenis, Squamos floriferis tridentatis tt
Astelia imbricata; aculeata, foliis lanceolatis in tegumenis, Squamos floriferis tridentatis tt
Habitat in Brasilia Mastagrav, ad H. Martha Amer Meridionalis non

H. El. Amer. Rohr 4

I. p. I.

Radix globosa, apice divisa. Folia radicantis, plura, pétiolata, Squame
pollicaria, per pétiolem parum decurrentia, glabra, subtus costata et
nervis subvillosa. Steui plures, ex tri spithamoides, intervium superiora
versus apicem divisi in ramos duo tri i, umbellati et quam adpresso subulata, carinata.
At margine nufo carina pallida. Squama terminalis, resupini pollicans vel panum ultra,
simplex, intervium subiorum ramuli ad basis, imbricata, Vesic,
dimidiata de modo crassior; Squamo lanceolata, glabros, convexa
verso caro, superne et inferne aucto margine membrana angusta, apie
Tridentata: Dens intermedius muco rigidiuscula, lateralibus panum con
gris. foliis pollicariis sub singula Squama. Bracteas duas detinend ad basis
cotyleis. Calyx quadripartitus, confundit in ter Squame. Lacinia lineares, margine
panum membranaceas, dqueales apice subtiliter, duo opposito panum latrona.
Capsula ovalis magnitudine calycis, ovata, acutea, glabra, parva. Valvula petula.
Dissepimentum velutinis extrarum. Petrum et laeviorum intacta
Semina pollicaria minuta. estigiosum angustum imp oblongum
vestimentum

~~Lyrato~~ ^{acaulis} ~~Tuticaria~~ foliis lyrato-pennatifidis Scapo imbricato.

Habitat in India 4.

~~Radix~~ seborosa. Dolia radicalia, ^{retorta} lyrato-pennatifida. Laciniis obtusis, glabris, utrūc
natae pipolliana. Petiolas heteras. Si quis ereditus Tripollianis imbricatus squa
mis oblongis acuminatis. Spica terminalis solitaria brevis. Bracteae imbricatis ovatis
aluminalis. Calyxis basi bicarinatætes. Laciniis Calyxis 5. lunculariis superiori magore
ovato, ciliatis.

veneris forte acaulis

Elytraria Pal. 4-partitis. Cor. 5-fida, subequalis. Stam. 4: 2. Stellis
sterile. Capp. 2-loularis, ^{2-valvis}, Stam. dissepimento inferne
adneta. Michaux