

Emenis

grandiflora O caule arboreo, floribus maximis, leguminibus siliiformibus

Lin. Spec. pl. pag. 10604

Agaly Rheed. Mal. 1. p. 95. v. 51.

Tunã Rumph. amb. 1. p. 108. v. 76.

Habitat in India

Dolichos arbores, floribus ferrugineis, caudice arboreo Forst
depr. pag 134.

Habitat in India Orientali

grandiflorus C. memo

Rami junioribus tomentosi incani folia semipedalia 10 jugum foliola
pelticaria interna et externa minora obtusa mucronata
pediculis ^{in India glabra} venarum emarginata, alterna vndicosa pedicelli geni-
culati Calyx vix dentatus. Linguiuli calycis duplo longior.
Lamina basi bifida Corolla hypolluciana

obseruatis huius pertinentis vide sub *Opizynom arbores*

Sesban Ophionomene caule herbaeico lori, leguminibus cylindricis subaequalibus
foliis obtusis. Lin. S. v. p. 671 Jacqu. coll. 2. p. 203
Dolichos Ophionomene Sesban Dolich. def. r. pag. 134

Caulis glaber angulatus Flora na racemosa. Racemi foliis brevioris. Pedicelli geniculati, remoti.
Calyx oph. grandifloro sed quinque dentatus: dentibus squalibus.
Alis minus falcatis quam grandifloro: unquiculi calycis parum
torquos: alliculo binis, subulatis, bas vexilli infixo, ad apicem unquis.
Legumina articulata

Stigma obtusiusculum, minime pubescens.

Legumina articulata: articuli oblongi, utraq angustati.

Hoc et grandifloro a reliquis Ophionom. differunt calycis campanulato,
dentato, nec profundat apice. Alis longitudine vexilli, legu minibus intra
calycem sessilibus non vero pedicellatis, articulis leguminum utraque
angustatis, in reliquis vero ubique eadem latitudinis ferè, altero latere
tandem modo torosi. Hinc forte ^{alio est enim si non profunde} generum distinctionem constituere debet,

ad Dolichos vero illa amandare natura repugnat, cum Habita sit
leguminibus diverse sunt. Conveniunt cum Coronilla ^{Eme 10} Calycis, petalis.
septula inter femina ut in Coronilla

in herb. Quis vide similia est infula franco an specie diversa e
Vexilla extus purpureo leguminibus compressis

Emericus flequis & *longispinus* Burm

Galega aegyptiaca flequis articulati Bauh. pin. 372

Rhed. mal. 6. p. 49. v. 27

Seban. alp. aegypt. 01. v. 82.

Habitat in Aegypto et India orientali

Seban Emerico

pubescens Emens

Descript. inter Amer. habetur

grandiflora Aphynomena Aphynomena caule arboreo, floribus maximis, leguminibus
liliiformibus An. s. V. pag. 671

Solcho arboreus; floribus ferrugineis; caudice arboreo Boiss.
de ser. pag. 134. ~~134.~~

Soliola emarginata, alterna.

Peduncululi ^{rebi oppositum} bi- sive triflori, geniculati.

Calyx campanulatus: dentibus viridibus.

unguiculi petalorum calyce duplo longiore. Carina ^{bois} bifida
stamen unicum liberum

Longifolia *Aphynomene* foliis pinnatis pinnulis lanceolatis: calycis
limbo inflexo, caule fruticoso Cavan. Ic. vol. 4. pag. 8. tab.

315

Habitat in nova hispania 5

Emenis

non vidi

1 emeris *C. Indica* *pedunculis subtrifloris*, corollarum unguibus - calycis
trijlo longioribus, ^{ramis pediculis} caule angulato. Len. N

Colubea scorpioides Lam. epit. 541.

Colubea filiquosa f. *scorpioides* major Bauh. pin. 397.

13. *Colubea filiquosa* minor. Bauh. pin. 397.

Habitat in Europa australi &

Caulis teretis glaber uti tota planta. Rami sparsi, angulati ~~serides~~
Folia trif. quadrifuga. Foliola oblonga sessile opposita, basi acuta
nerviata unguiculata, interiora minoria subtus pallidiora. Stipula
minuta subulata. Pedunculi axillares solitarii, folio longiores
apice bi- / triflori. Flores breviter pedicellati calyce campanu
latus quinque dentatus. Legumen lineare angustissimum bipolli
care

biflora *Ophipomene* caule herbaceo. lavi, pedunculis axillaribus bifloris, leguminibus
Cylindricis aequalibus

Habitat in India orientali Honig.

affinis *Oph. sesban* differt quod omnibus partibus triplo vel quadruplo minor
pedunculis bifloris nec racemis multifloris longitudine foliorum

bifloris *Emerus*

Propus