


Epidendrum



Epilobium parviflorum

humilatum
parviflorum

Epidendrum foliis lanceolatis, pinnis alternis secundis, floribus triangularibus
Helleborine umbosa; floribus minimis luteis. Plum. Cat. 9. Ic. Tab. 185.

Fig 1

Epidendrum minutum: foliis radicalibus lanceolatis trinerviis, racemo
composito; floribus minutis Burm. Aubl. fl. Gu. pag. 224.

— Habitat in Montserrat in Rijk

Folia radicalia, 3-4, seta vel septem pollicaria, pollicem lata, integerrima
acuta, basi inferne versus subtus carinata, nervi decem proster costa
sem, tenuissimi, basi vaginantis. Vagina compressa sub anisipitibus.
Scapus basi bulbosus, erectus, compressus vaginis pertheceis compres-
sus textus.

Racemi a basi ad apicem, inferiores remoti, superiores magis appro-
ximati, simplicissimi, secundis, sesqui pollicares. Vagina perthe-
cea ad basi singuli, lanceolata, membranacea, ^{excisa} canaliulata
extus carinata, per se versus sensim minor. Peduncululi alter
radem dentati. Bractea ovata, ^{acuminata} patens, brevis, sub pangulo flore.

Corolla resupinata. Petala 5 que. Duo inter exteriora, lateralia, reliqua uno cum nectario
labio inferiore includentia, triangularia ^{apice} inferne versus inferiore
transversa divaricata, superiora obtusa convergentia. Duo inte-
riora ad ascendentia, altitudine laterali linearia ad apicem
lateralem lateraliem, quintum ovatum, acutum, aperturam inter

petala lateralia inf. claudens.

Labium nectarii ^{apice} sursum ex columnae genitalium arcuata enascenti, reflexum de
clinatum inter petala lateralia, genitalia ^{apice dependens parum ex tra petala, reflexum} tegens, cuneatum trilobum:

Lobo intermedio oblongo subrotundo-emarginato, lateribus undulato: laterales
subovato breviori acuto.

Capitula pollicares

a) flori magnit. naturali b) auctus c) petalum laterale d) flori petali la-
teralibus ablati cum reliquis petalis et labio nectarii e) nectarium
cum staminibus



a. flor
b. sepalica

Epidendrum fimbriatum

Limbratum Epidendrum foliis oblongis, racemo terminali simplici: floribus secundis, ^{natis in tubis} labio trifido ciliato ~~folio~~

Habitat in Montserrat & Ryan.

Caulis erectus, sesquipedalis, raris inferne foliosis, et vixtus vaginis foliorum, superne aphyllus vaginatus: Vaginae inferiores semipollicares, striati, compressi; superiores bipollicares.

Solia ^{semiamplexicaucera} sessilia, ^{amplexicaucera} disticha, oblonga, lancea bipollicaria, vix pollicem lata, obtusa, enervia.

Racemus terminalis, erectus, tripollicaris. Pedunculus post caput florum dentatus & bracteis persistentibus. Bractea brevis, lanceolata, patentis. Pedicelli breves. Flora nutantes, secundi

Corolla petala 5. lanceolata, acuta, unguiculata, patentia, duo intermedia parum angustiora uninervia: tertia parum latiora trinervia

Nectaritubium: tubo parvi sursum reflexi, petalis breviori; labio trifido ^{apice columna inserto}: lacinae rotundatis, ciliatis inaequaliter incisae ciliatis intermedio majore bifido

Capsula ^{triloculari} ~~triloculari~~ basi apiceque attenuata

Epidendrum elongatum ~~longum~~ ~~longum~~



Epidendrum canaliculatum.

canaliculatum Epidendrum foliis subulatis canaliculatis, nectarii labio tripartito
lobis ovatis integris.

Habitat in Montserrat & Ryan

Folia radicalia, carnosae, ^{rigida} subulata, acuta, tri vel quadri pollicaria
subtus convexa, supra canaliculata.

Caput interdem sesquipedale, erectum, simplicis formae, teres, glaber
tenuis purpureo; articulatus: articuli inferiores pollicares
superiores sensim longiores. Vagina unguiculata, altero latere sub
bifida, papam acute cingens, ad singulum geniculum

Racemus terminalis, simplicis formae, subsperthamocis, Flores alterni,
remoti. Spatha ^{minuta} parva.

Corolla petala quinque, ^{nerviata} linear-lanceolata, unguiculata, duo parum
angustiora,

Nectarii labium tripartitum: lobis ovatis, petalis parum longioribus
et triplo latioribus, longitudine subaequalibus, lateralibus parum
angustioribus, integris, nervosis, albidis

Simile Hellebore foliis rigidis Plum. ic. tab. 101. fig. 1. nisi angustis
et canaliculatis, nisi Plum. ic. tab. 101. fig. 1. nisi quod flores

a) Corolla magnit. nat: b) nectarium absque labio antice visum



Epidendrum reflexum

Loei unum
resupinatum

Epidendrum foliis conduplicatis ensiformibus, bulbo medio solitario
monophyllo, racemis simplicibus secundis, floribus resupinatis

Habitat in Trinidad in Ryan.

Radices longi, tenues, albi

Folia radicealia, ^{inter sive} vaginantia, 4 vel 5 pollicaria patentia, basi attenuata, conduplicata, ensiformia, acuta, nervosa: intermedium a bulbo pollicari, oblongo, lani, nitido, flavo-purpureo. Vagina pollicares, margini membranacea, striata

Scapi a fino foliorum, saepe oppositi, 6 pollicares vel parum ultra, ^{inter sive} tenues, superne pauculum recurvo, tri vel quadriarticulati: articuli

superne inter flores
parum flexuosus

culi sesqui pollicares, ultimis longioribus & vagina membranacea ad articulum, unguis clausi, lanicolato, arido & in pedunculatum

Depressi, ^{super}

Racemi a medio scapi Racemi secundis, longitudine scapi, simplicibus simis. Flores frequentes, ^{inter sive} purpurei, nutantes: pedicelli

distantes, filiformes, ^{patentes} in tenues pollicares, patentes Spatha lanicolata arido, pedicello duplo brevior

Corolla tetra petala: petala tria ^{in fenora} (superiora) oblonga obtusa, una superioris (inferior) deflexum, lanicolatum, conduplicatum, reliquis angustior.

Nectanium cylindricum antica transversum semiobscuro, bicorne: Labium
cunei forme emarginatum, basi & lateribus erectis canaliculatum.

Caupilla oblonga, subtriangula, pollicaris

a Flo. b. nectanum magnitudine naturali cum petalo superiore
i magnitudine auctum o Labium nectani magnitudine natura
li

Speciosum Eridodum

bracteata Vand. ? foliis oblongis subsessilibus, caule erecto bracteato.

Matourea praderis Aubl. fl. Gu. pag. 642. tab. 259.

Habitat in pratis Cayennae et Guayanae

caulis herbaceus bipedalis tetragonus. Rami oppositi pubescentes

subramosi. Folia opposita basi parum attenuata acuta subsessilibus
pubescentia ^{caulis} ut angustata floribus axillaribus

semples

Stratifolium Epid.

Taquara ~~Mabea folia oblonga~~

~~Mabea Taquara folia obtusa Aubl. fl. Gu. 1, 107, 070. Tab. 334~~

fig. 2

Habitat in Guiana

pubescens

E. foliis cordatis indegenis subtili ramisque pubescentibus
cotylibus decompofitis

Habitat in Angula St. crucis West.

ducheton

melofum

melastom

atenuate

fructus

ruant

trunc

nyofum

mesanthon E. foliis cordatis integerrimis cymulis

Infte & foliis teretibus inanis, vaginis fistulosis, pedunculis oppo-
sitifolius lymbofis vaginam perforantibus Forst. prodr. p. 60
Habitat in nova Caledonia
Nectarii labio spatulato integro cordiformi Forst

non vid.

compositum & foliis caulinis teretibus siliiformibus subincanis inanis
sespilibus: racemo simplicissimo, nectarii labio calicinis media
revoluta, undulato crenata *Boiss. prodr. pag. 60.*
Habitat in nova Caledonia

linear E foliis oblongis avenis, nec an. labio ^{bi} bipartito ciliato: intermedia
linear, caule bifolio Lin. f. V. p. 618

Helleborine graminea, foliis rigidis canatis Plum. Gen. Pl. 179. fig. 2.
Habitat in America. v

Caulis inferne vaginatus compressus glaber inferne foliatus. Folia
lato linear lanceolata sive spithamea subtus nervosa obtusa
supra nitida approximata vagina angustior. Vagina superiores
sesquipedaliter ensiformes complicata carinata obtusa
bracteis terminalis 5-6 floris bracteis membra ensiformes
pedunculo parviori brevior. Pedunculi bipollicares et ultra
Flores nutantes petala ^{clausa parviora impunctata} ensiformia valde subulata nec
infundibuliformia labium bifidum figura petala lorum extus longitudinaliter
fusi ramenti filiformibus.

nocturnum & foliis oblongis arenis, nectarii labio tripartito integerrimo: inter
media linearis, caule multifolia Lin. N. pag. 818 Jacq. Am.

+ 139. N. Am. pag. 209. +

Vitisum Caryophylloides, foliis longis in apice incisus, floris labio
albo trifido: petalis luteis longis angustis Catef. Carol. 2. p. 68.

+ 68.

Habitatio americana ?

Jacquinus forte diversa a Catef.
Caulis teres simplex glaber, cineriter quinquefolius. Folia oblonga
obtusa, integerrima coriacea nitida vixnantiâ alterna subdi-
sticha fere tripollicaria. Flores tripollicares sessiles in pedunc
brevissimo, spatheque paucissimis vestito, bini plerumque rari
sunt tres, nocte odori. Petala viridi lutea, lacina nectarii
absque ciliis

Myosuros - E. foliis basi vaginantibus oblique divaricatis linea
ribus obtusis canaliculatis, scapo nudo, racemo spicato
mutante filiformi Forst. prodr. fl. austr. pag 60
Habitat

non vidi

autumnale & foliis linearibus lanceolatis, floribus racemosis paniculatis
pedunculis squamosis

Epidendrum autumnale foliis caulinis lanceolatis nervosis
confertis vaginantibus, pedunculis terminalibus squamatis
paniculatis, pedicellis erecto retusis. Forst. prodr. p. 60

Habitat in nova Zelandia

Caulis pedalis rectus vixinis foliorum inferne nudus
folia sesquipolliciana, striata basi parum latiora obtusa
flores parvi squamis pedunculorum orato depressi.

truncatum Epidendrum

Canbasi Boeckh.

Caulis basi foliatus. Superne squamis membranaceis cancellatis ^{perenni} tectis
obtus racemosis parvis ^{positis} in cornu obtuso brevi depresso. pedicelli
inferiores subramosi

affinis Gaigu. Tab. 157. ~~11~~

cucullatum E foliis subulatis scapo unifloro, nectarii labio ovato ciliato ac-
uminato, petalis elongatis Lin. H. V. p. 810

Helleboni floribus albis cucullatis Plum. spec. 9. 7c. 179. fig. 1.

Habitat in Clemencia

Caules ^{supra radicem} vaginis longis griseis. Eolia ^{infera} gymthamoa acuta
petala lanceolata bif 3 pollicana.

umbellatum & caule simplici, foliis ovatis emarginatis amplexicaulibus ovatis;
floribus terminalibus umbellatis. Sw. prod. p. 121.
Epidendrum difforme? Gaigr. am. t. 136.
Habitat in Jamaica?

non vidi

aniceps L. foliis cordato lanceolatis anglicis caulis horizontalibus, racemo termi-
nali compresso arcuato. sub flexuoso, floribus d. striatis, petalis intinoribus
capellatis, labio trilobo L. prodr. p. 121.

Habitat in Jamaica

Caulis vertus vaginis tuberculatis inferne semiunguiculatis
superne sensim parum longioribus. folia linearia bipollicana
basi subcordata

rigidum L. foliis oblongis obtusis vaginantibus, racemo terminali compresso
anagyri, floribus distichis spatiosis majoribus; labio integro cordato-
ovato acuto Sw. prodr. p. 121.

Epidendrum rigidum Jacq. Amer. 222. t. 134.
Habitat in Jamaica 4

non vid.

diffusum. L. foliis oblongis amplexicaulis, caule acripiti, panicula terminali
ramosissima diffusa; labio integro acuminato Sw. prod. pag. 11.
Habitat in Jamaica 4

Caulis compressus ruginis Unguicula vobis vertis, folia
polluciana vel ultra pedunculus terminalis alternatim ramo
sus

montanum L. foliis lanceolatis planis recurvis patentibus submembranaceis,
racemo terminali simpliciter, floribus secundis; latice trifido lvs. prodr.

pag. 121.

Habitat in Jamaica v.

non vidi

serulatum & caulibus aggregatis sub-phyllis, foliis lanceolatis carinatis serrula-
tis, racemo terminali, floribus distinctis, bot. prod. p. 121.

Habitat in Jamaica. 2

planta humilis folia conduplicata extorsum ^{aristat} ~~curvata~~ serrulata
vix inollivaria

teretifolium E foliis semiteretibus, caule unifloro, labio apice triquetro sup. prod.

p. 121.

Habitat in Jamaica.

Caulis compressus, striatus palmatis foliis sesquipollicari

Globosum & foliis teretibus canaliculatis, floribus terminalibus subsolitariis
labio ovato acuto, gappulo globoso. Sw. prodr. p. 121

Epidendrum globosum Jacq. Amer. 22. t. 133. fig. 1.

Habitat in Jamaica

Caulis plures digitalis. folia semipollicaria extensa
annua

Teres & caule vaginato decumbente, foliis teretibus Linn. Thunb. fl. jap. 30
S.V. pag 010.

Habitat in Japonia 7

Radices plures filiformes, flexuosi repentis. Caulis nudimentis
foliorum vaginatus, folia alterna, carnosae, acuta, glabra, digi-
talis. Thunb

non vidi

Caule repente

Sedulanoides L. caule filiformi articulato, foliis lanceolatis, pedunculis a vixi-
nis unifloris Sw. prodr. p. 122.

Habitat in Jamaica.

Radix tenuis folia semipollicaria obtusa

Asplenium E foliis emicumbentibus ellipticis convexo-concavis cernatis, floribus
sub foliis sessilibus Sw. prodr. p. 122.

Habitat in Jamaica &

caules albi. 1 et hinc folia ovata minus ornata

polybulbon & caule repente bulbifero, bulbis dyphyllis unifloris, flore pedunculato, labio cordato.

Habitat in Jamaica 4

bulbi oblongi. Radicula teretis filiformis glabri simpliciter. folia lanceolata pollicaria

Echinocarpus

~~factus~~

caule decumbente unifloro, foliis distichis ovatis; capsulis mun-

icatis Sw. prod 124

Limodorum pendulum Aubl. fl. Gu.

Habitat in Jamaica

Caulis compressus foliis undique umbicatus

Caulis pedalis tectus vaginis foliorum. Lolia cuspidata, unguem
lana approximata versus basi minor, patentissima. Peduncu-
li uniflori axillares folio brevior. Thectus oblongus squamis
cuspidatis emittis mucronatus

In hoc arbor & caule tereti radicante, foliis distichis lanceatis, capsulis tomentosis

Sw. prod. 124

Habitat in Jamaica &

Caulis compressus undique imbricatus foliis

Rami 3 parti folio frequentia patentissima unguiculata

Кемерово 2008 г.

umbellatum & stolonibus repentibus, foliis ovalibus carnosis petiolatis,
petiolis in fixis apophyibus ovatis angulosis - cernatis, scapo radice
& umbella simpliciter unilaterali, petalis inferius elongatis Foss. p. 61.
Habitat in locis etatis insula

apophyses vero petiolis cum quo stolonem articulat
non vidi

^{no} 207
Dofum & folio unico, radice subquadronflos Kan. t. V. p. 810. Taiqu. Am.
t. 140. Pl. Am. p. 291.
Epidendrum curusanicum Michx. affine, folio crasso sulcato Herm.
parad. 107. t. 107.

Sisium arboreum f. Epidendrum, flore albo speciosum americanum, folio
forma sulcatum Neri Pl. alm. 3904. 917. fig. 6.

Vasium delphinii flore minus, petali angustioribus, radice fibro
sa Sloan hist. 1. p. 251. t. 129. fig. 3.

Habitat in America

Petalis. Folium lineari-subulatum, acutum semiglanduloso, inter
ne sulco acuto exaratum, glabrum crispum, plus minus semi
pedale, basi spatula longa cinerea vaginata, in petiolum
teretiufilum et caule formem. Depressa ex tuberculo vel
nodulo. Spadix simplex teres, brevis, glaber, erectus, e sum
folii. Flores sessiles magni noctu odori. Labium nec tamen superius
profunde trifidum, minimum recurvatum cum in basi labii
superius recurvatum tubum coronans: laciniis erectis acutis
lineari-bus. superiore duplo latiore apiceque bifido. duabus reliquis
non vid. opposita. La inter haec cucullus quadronlocularis. Labium inferius
cordatum acuminatum basi infundibuliformis

Totius bulbis innatis

angustifolium L

foliis lineari, spapo paniculato Sw. prodr. 123.

Habitat in Jamaica 2

non vid:

Fragras & folio lato lanceolato nervi, fcapo multifloro abbreviato, labio cordato

Sw. prodr. 123.

Habitat in Germania 4

Stam. vaginis lanceolatis sepi folia pedalia sesquipedali
sem fere lata strata basi versus parum angusta
ta petala lanceolata

nervosa O. *Papilio nudo angulato, foliis ovatis nervosis, nectariis lobis integro
reflexo* Thunb. fl. Jap. p. 277 + S. V. pag. 814
Habitat in Japonia

Folia radicalia, vaginantis vaginae sulcata multangulata; ovato
oblonga, acuta, undulata, concava, sulcata, finata, integra, gla-
bra, erecta, palmata, duos pollices lata, una vel quinque. *Papuli*
basi foliis cinctus, angulis acutis, glabris erectis, foliis longior.
Spica elongata. ^{sub, sub, magna} Olores cernui. Petala duo aequalia linearia
marginibus apicibusque reflexis, unguiculares verticem hori-
zontale. Petalum 4 ovatum, medio geniculato inflexum, basi bre-
vifurca, sulcatum, emarginatum, galeam formans reliquis duplo
latius. Duo superiora basi deflexa lateralia, inde reflexa linearia
figura extensorum. bractea ovata brevissima, purpurea Thunb.

non vid. *Epidendri species*

Clypeolum E folio subrotundo - cordato basi emarginato, apice reflexo
acuto, sicapo erecto inflo racemoso, nec tamen labio inferiore
obtusato emarginato maximo & oppos. prodr. p. 61.
Habitat in societatis in sila 4

non vidi

Saprola

Epidendrum *Saprola* foliis radice etibus parasiticis *Saprola* culatae bre-
vibus undulatis, staminibus pluribus racemosis, necitanti labio cal-
ceiformi calceolato dist. prodr. pag. 60.
Habitata Societate *Saprola* 4

non vidi.

Languineum & foliis geminis oblongis, scapo multifloro subflexuoso, labio subrotundo undulato emarginato, cornu adnato Sw. prodr. 124.

Viscum radice bulbosa major Sloan h. 1. p. 250 t. 12 fig. 2.

Satyrum 3. Brown jam. 325

Habitat in Jamaica 4

flor. pedicellati ^{superni} Scapo ramoso. floriferi

Palms folium & foliis lato lanceolatis nervosis membranaceis, pedunculis radicalibus
sagittatis multifloris, nectario cymbiformi integro reflexo Sw. prodr. p. 123.
Habitat in Jamaica. 4

non vidi.

altissimum L. foliis lanceolatis, sicapo ramosissimo fermentos, petalis oblongo lanceo
latis acutis, labio obovato, petalis brevioribus. Prodr. p. 123.
Epidendrum altissimum Jacq. Am. 229. t. 141.
Habitat in Jamaica.

non vid.

labratum E foliis radicalibus oblongis, bulbo medio solitario monophyllo, scapis
paucifloris, labio oblongo corpufculo carnofo superiore adnato Sw. prod. 124
Habitat in Tamauco Hispaniola 2

Scapus filiformis digitalis folca pollicana

undulatum L.

Alcaulia foliis radicalibus

foliis ellipticis acutis, capsae sarmentosa ramosissima, petalis ovatis
unguiculatis obtusis, labio dilatato emarginato undulato Sw. p. 122.

Hellebonne maculosa, foliis albis maculatis Plum. i. 170. fig. 2.

Viperam radice major et elatius delphinii flore sanguineo ^{femineo} et guttato Roux.
hist. 1. 250. t. 148. fig. 1.

Epidendrum carthagenense ? Jacq. Am. 220. t. 133. 4.

Satyrium 15 Brown. p. 326.

Habitat in Jamaica.

non vidi

guyanensis O. bulbis filiformibus, petalis ternis majoribus reniformibus
lobis undatis

Plum. ic. p. 177. V. 182. fig. 2.

Habitat in America.

Epidendrum spec.

variegatum & foliis lanceolatis carinatis canaliculatis, margine castilagineo serratis,
vaginis imbricatis, scapis vaginalibus racemosis simplicibus; labio emarginato bilobo
Lw. prodr. p. 122.

Epidendrum tetrapetalum? Gay. Ann. t. 132

Helleborus foliis carnosis cannatis? Plum. ex. 177. t. 102. 2.

Habitat in Hispaniola?

Descript. vide inter amur.

Atricularioides E foliis lanceolatis lineatis planis, scapo paniculato, labio magno
cordato, cornu brevissimo Bot. prodr. p. 124.

Habitat in Jamaica, Hispaniola.

Folia radicalia lanceolata bipollicaria et ultra scapi
spithamei tenues squamis ovatis remotis, superae
ramosae flores saepe; petala obcordata laciniis
divaricatis

tetrapetalum. foliis exsiformibus complicatis subundulatis. Scapo subnudo
nectario labio concavo inferius retuso
Epidendrum tetrapetalum. foliis radicalibus subulatis canalicatis; racemo
simplici. corolla subtetrapetala. Jacq. hort. pag. 230. Tab. 142

Habitat in Cambai Pflanz.

Radix fibrosa. Folia bipollicaria incurva angusta acuta tenuissimis
scapus ascendens ^{gnata}. Scapus erectus glaber articulis bi- & tripollicaribus tenti-
bus squama membranacea evanescente ad articulos. Racemus flexuo-
sus simplex petala quatuor oblongata inferum parum majus
bracteis ovatis perispermatis ^{membranatis} emarginatis nectario labio basi angustato linearibus utrinque
lobulo rotundato acuto superne dilatato subisrenata retu-
margine subinoquali retusa pollicem lata

Epidendrum

India occidentali.

Caulis ensiformis, radicalis bipollicaris. Scapi plures. Heres
heres superne ramosi, spithamici. Flores racemosi. Bractea
minuta ovata: labium obcordatum, lobis bifidum calicis ovatis.
Capsula oblonga acuminata.

an Anacardioides Lk.

Inquetrum & foliis Inquetris cultroatis apice compressis lanceolatis acutis, basi simpli-
ca; labio cordato-ovato, lateribus emarginatis Sw. prodr. p. 112.
Habitat in Jamaica 4

non vidi

Sesela E foliis basi compressis supremo latioribus lanceolato-linearibus obtusis acuminatis
pedunculis radicalibus unifloris brevissimis Sw. prod. p. 122
Habitat in Jamaica?

Sesela non vid.

flabelliforme & foliis basi compressis superne dilatatis, ovato-lanceolatis acutis, ple-
nis nervosis, pedunculis unifloris elongatis. W. prodr. p. 123.
Habitat in jamaica 4

non vidi

Fubulatum E foliis subulatis fimbriatis, pedunculis vaginatis nodis axillaribus multifloris

Sw. prodr. p. 123

Habitat in Jamaica

Folia spithamea basi articulata crassitie penna colum-
bina

Latyroides E foliis subulato-teretibus scapo paucifloro, corollis antica basi ^{stri-}verrucifera
Sw: 1742. p. 173

Habitat in Hispaniola 2

Tolia digitalis scapo altiora curvata. Scapus filiformis

Tribuloides ϵ foliis pedicellatis lanceolatis obtusis emarginatis, pedunculis brevis
simis, capsulis globosis echinatis Sw. prod. 123.

Habitat in Jamaica

folia 1-2 pollicaria basi in petiolum attenuata, obtusa

quinque nerve Epid.

Habitat in Cantibus Tofetis

Colis lanceolata obtusa polliciana stultia quinquevernia basi canali-
culata amplexitaulia radicalia. Scapus folis parum longior
saginis membranaceis lanceolatis. Flo. unice terminalis

an eadem ac tribulorde

Alysiodes
Deumont Ged.

Habitat in Isle de France

Folia lanceola bipolliciana in petiolum desinentia acuta

Stipulus foliis vix altior compressifolia membranula utrinque minima decur-
rentibus. racemus pollicaris bracteis laevibus virides longitudine pedicellorum
bracteis capitulo trigono marginato facie lepidi si miserabili

Corniculatum l. foliis pedicellatis cuneatis oblongis, pedunculis radicalibus unifloris
Corollis acuminatis curvis Sw-prodr. 123.

Habitat in Tamauco y

Planta pusilla vix, pollicaris. *Solia unguiculata* petiolata.

Lanceola ^{l.} foliis petiolatis lanceolatis acutis, pedunculis et vaginis radicalibus biplo-
nis Sw. prodr. p. 123.

Habitat in Jamaica 4

folia pollicaria linearis lanceolata angusta. Scapi capillares

bp

myoforus E. foliis basi vaginantibus oblique divaricatis linearibus obtusis
canaliculatis, racemopulvato nutante filiformi. *Foster. prodr.*
pag. 60.

Habitat in Nova Caledonia
siccis nudis

non vidi

ensifolium L. Caule tereti lani, foliis ensiformibus striatis, petalis lanceolatis
glabris: labio recurvato latiore Lin. spec. pl. pag 1352* S. V. p. 819
Habitat in China Terrestis nec per nautica.

equitans E foliis ensiformibus complicatis carinatis, specie nutante
filiiformi

Epid ~~equitans~~ foliis equitantibus ensiformi compressis carinatis
acuminatis, racemo spicato nutante filiiformi 80 fl. pro d
pag. 60.

Habitat in nova Caledonia

Planta six palmari. Folia, radicalia plura usque pollicaria
glabra. Scapus foliis dimidio altior. Flores copiosi parvi

Venuiflorum E. Polia confiformia Scapo squamato floribus plicatis

Habitat in India Orientali

Folia complicata radicalia obtusiuscula bipollicaria. Scapus fili-
formis foliis duplo longior adpressis squamis ^{minuti} ~~membranaceis~~ ^{lubrescentibus} apertis
habui hinc quasi frangosa. Flori copiosi. Spica caud. 3 p. 4 pollicaria.

multiflorum
Epidendrum

basi repens. Folia lanceolata 4 pollicaria basi in petiolum depressa
Sia. Scapus floriferus basi vaginatus fileiformis foliis parvis breviori-
bus folium unicum ad singulum scapum. Flores racemosi a basi pen-
taules scapi. Thalamus tubulato floris parvis

affinis ophioglossoides at habitat in Tava Thoun