

Epidendrum

globosum Epidendrum Jacq. hist. pag. 221. Tab. 133. fig. 1.

Caulis plures, degr. vix digitales, si ligiformes, simplicissimi, compressi,
ancipites.

Folia linearia, vix pollicaria, distantia, plana, juniora conduplicata
varinata, patentia, apice reflexa. Vagina ancipiti.

Racemus terminalis, pollicaris, anceps. Bractea lanccolata, annata
carina per pedunculum parum decurrente, septem circiter septem
in singulo racemo: pedicelli longitudine bractearum
neglige

(E quadreloupe misit optimus de von Rohr sub titulo inducato, allato,
cum vero in vario ab Epid. a Deseripit: Epid. globosi Jacquinii recedit
Descriptionem addidi ut alii judic differ, caule ancipiti, racemis
multis floris foliisque

In re omnino desert

cucullatum Epidendrum caule bifido, diphyllo unifloro, foliis subulatis, labio nectari
o ovato ciliato attenuato, petalis lanceolatis.

Epidendrum Helleborine floribus albis cucullatis Plum. spec. g. 3. Tab 124
fig. 1.

Epidendrum cucullatum: foliis subulatis, scapo unifloro, nectari labio ovato
ovato ciliato acuminato, petalis elongatis Lin. S. V. pag. 81 P.

Habitat in Montserrat de Ryan.

Caulis infra folia basin versus attenuatus; bractiulatus; articulo in
feriori unguiculari, albescenti pollicari; ketis vaginis membranaceis
lanceolatis, albis, adpressis. Supremo infra folia, sequi pollicaris
part. patent.

Folia duo opposita, sessilia, spithamea, subulata, verticillata, striata

Pedunculus inter folia, uniflorus
lanceolatus.

apice spatula acuta

Petala quinque, lanceolata, fere unipollicaria, valde attenuata,
nervosa, duo parum angustiora.

Nectari labium ovatum valde attenuatum, longitudine petala-
rum, ciliatum, acumine integerrimo.

Germen angulato-cylindricum, utrinque attenuatum.

variegatum. Epidendrum foliis ensiformibus serrulatis, racemo simpliciter secundo,
labio emarginato trilobo.

Epidendrum variegatum. foliis lanceolatis caninatis canaliculatis, margine cili-
laginis serratis, vaginis imbricatis, scapo vaginalibus, racemo simpliciter;
labio emarginato trilobo Sw. prodr. pag. 122.

Habitat in Montserrat In Ryan.

Folia radicalia, basi ^{undata} equitantia, patentia, ensiformia, 4-5 polliciana,
anquam lata, compressa, striata, margine et canina serrata, serraturis
frequentibus minutis, acuta: vaginis pollicares, margine membranacea
equitantes.

Scapus e vaginis foliorum, sesquipedalis, erectus, punctis minutis adpressis,
simplicissimus, teres, articulatus: articuli sesquipollicares: infimi
membris vaginis anodo lanceolato, articulo duplo brevior, scapo anthe
adpressi, ad singulum articulum solitarii.

Racemus terminalis, erectus, secundus. Pedunculus communis flexuosus
pedicelli filiformis, pollicaris. Spatha lanceolata, canaliculata, pedi-
cello triplo brevioris.

Corolla

Nectarium labium filiforme trilobum: lobo terminali subreniformi
anquam longo, duplo latius quam longius, emarginato: lobules

~~my *asplenium* *rupicola* *var. *rupicola**~~

(Synonymum Plum. *asplenium* *rupicola* a Swartzio dubie allatum ad aliam plantam pertinere videtur.
Tacchini quoque dubium cum folia diversa apparent

Erigeron

Ciliare Epidendrum caule diphylo: foliis oblongis obtusis: nectari. Labio tripartito
 lobis lateralibus ciliatis, intermedio linear.

~~no. 179.~~ Helleborine graciliora, foliis rigidis carnatis Reum. spec. p. 9. 4. tab.
 179. fig. 2.

Epidendrum ciliare foliis oblongis acutis, nectari. Labio tripartito ciliato:
 intermedio linear, caule bigolio Lin. l. V. pag. 110.

Habitat in Montserrat & Ryan.

Caulis.

Folia duo sessilia opposita versus

4. vel 5 polliciana, sesqui pollicem lata

oblonga obtusa

amplexicaulis, ^{approximatis} (con duplicatis) erectis, ^{superne vaginis lanceolatis} adnatis, ^{saevius ciliatis} compressis, subtilissime striatis, ^{saevius ciliatis} fusco-punctatis, obtusi apice patulis.

Racemus terminalis simplicis simplex, 6-8 florus, erectus. Pedicelli alterni
 2-3-stantes, sesqui pollicis aere, patentes.

Spathe patente, figura vaginorum cauli modo angustioris.

Petala linear lanceolata, utraq; attenuata aequalia.

Nectarium in fundi buliformi: tubo tenus angulato, apertis ore obliquo

ciliare Epidendrum foliis compressis lanceolatis imbricatis, necitane labio tripartito
ciliato: intermedia linear.

Cateniflorum Epidendrum caulis compressis angustibus imbricatis foliis lanceo-
latis erectis, distichis acutis, racemis laterales
Habitat in insula Trinitatis ad Ryan.

Caulis plures, pedales, erecti, ^{angustis,} simplicibus, compressi, ^{art. basi angustio}
res, ab basi ad apicem usque ^{art.} foliis imbricatis, articulati: arti-
culi inferiores breviores.

Folia polliciana, amplexicaulia, alternis, ^{approximata,} disticha, lanceolata
conduplicata, carinata, dorso acuta, ^{apice superne parum}
apice patentiores

Pedunculi e sinu foliorum superne, filiformes, flexuosi, bipollicia-
res: pedicelli 4. 5. capillares, pollicares, medio gemulati. ^{B.}

Bractea parva, lanceolata sub pedicellis

Flores non vidi.

Differt ab Ep. glaucis Swartzii foliis erectis lanceolatis acutis, rac-
ematis ^{racematis, imbricatis}
natis ^{oblongis obtusis}
ab Ep. trinitarum.

anceps Epidendrum caule ^{anceps} simpliciter, foliis oblongo-lanceolatis, racemis terminalibus geminis,
nectarii labio trilobo intermedio bidentato

Epidendrum anceps foliis caulinis oblongis; spicis laxis; nectarii labio inferiori
semilobato; caule anceps Hayden. Am: pag. Tab.

Habitat in Montserrat ad Ryan.

Caulis erectus simpliciter spinosus, sesquipedalis, compressus, anceps; a basi ad me-
dium foliosus et vaginis foliorum tectus.

Folia sessilia, basi tripollicaria, inferiora minora, cunctis 12 in caule, oblon-
go-lanceolata, acutiuscula, glabra, integerrima, nervos multifida

Vagina tubulosa, unguiculari vel parum ultra.

Racemi terminalis, gemini, nutantes, pollicares. Pedunculi filiformes,
5-7 flori, glabri: pedicelli unguiculari, uniflori. Bractea parva
lanceolata, membranacea.

Petala 3 oblonga, acuta, trinervia, sem unguicularia: duo angustiora
et parum breviora. Labium nectarii trilobum: lobi subaequalibus latera-
libus exterioribus rotundatis, integris, intermedio porrectis, oblongis, emar-
gnatis

(An eodem cum Epid. anceps Sw. descript. foliorum cura nostra
non convenit

biflorum Epidendrum foliis linear lanceolatis planis obtusis basi, caule an-
nati, pedunculis terminalibus geminis

Habitat in Montserrat Dr. Ryan.

Caulis altitudine digiti intermedi, anceps, vaginis foliorum textus, sim-
plicissimus, basi ascendens, versus florem aphyllus, vaginis cineris
obtusus.

Folia sesquialtera, alterna, bis. tripolliciana, infima polliciana, semina quatuor
lata, integerrima, glabra, striata, obtusissima

Lamina compressa

longa.

Capitula ovata, linearis quinque elevatis costata, semina quatuor
glabra, magnitudine pisi

geminatum

bifidum
papilionaceam

^{crucis} E. foliis lanceolatis, racemo composito, petalis
lanceolatis nectarii labco obtusato bifido.

Helleboris flore papilionaceo Plum. spec. 9. T. tab. 106. fig. 1

Habitat in America

Folia obtusifolia semipedalia a bulbo imbricato
ad aperturam enatis Scapus teres interfolia articulatus
crassitie penno columbina squamis ovato lanceolatis
Pedunculi ramosi ramis simplicibus flexuosis imbricatis
Squamis membranaceis pedicellis pollicaris nectarii
labrum inferne in unguiculam cuneiforme depressam
superne dilatam bifidam laciniis rotundatis integerrimis
petala duo ad basin unguiculi ovata
fructus oblongus magnitudine Jeylandis

minutum E. foliis lanceolatis trinerviis, racemo compo-
sito floribus minutis

Plum. ii: p. 100 & 105 fig. 1.

Habitat in India occidentali

non vid.

maculatum. Folia lanceolata serratis, petalis reniformi-
bus undatis maculatis, nectarii labris glabris

Plum. v. p. 173. t. 178. fig. 2.

Habitat in Aomenia

non vid.

minimum E. foliis lanceolatis & capum sequantibus

Sloan hist. Jan. 1. p. 251. v. 140. fig. 3.

Habitat in america

non vidi

corinatum & foliis oblongis obtusis compressis articulis latis Act. Upf. p. 740. p. 36
S.V. p. 810.

Bontia Luronica, geniculis inferioribus carinulatis. Pet. gar. 44. fig. 10
Habitat in Insulis Luronum &

non vidi

Clorifolium & foliis oblongis obtusis superne latioribus Act. Ups. 1740. p. 36

N. V. p. 210.

Kanjiram - manusara Reed. Mal. 12. p. 17. T. D.

Habitat in Malabaria arboribus &

non vidi

guttatum E. foliis lanceolatis canaliculatis, petalis cuneiformibus
retusis Lin. V. p. 818

Helleborine foliis carnosis cinnatis et sulcatis Plum. spec. 9

Fig. 102. fig. 2.

Viscum delphinii foliis flore albo guttato, minus, radice fibro
sa Sloan. her. 1. p. 251. tab. 140. fig. 2.

Habitat in Gaonacia 4

Radicis fibrosa. Folia lanceolata complicata basi imbricata
absque vaginis. Scapus erectus. Racemus terminalis fluctuosus
flores erecti. Petala variegata dentata nervosa fructus
infructu bilobis Plum

non vid.

punctatum
Habitatum &

foliis lanceolatis nervosis: vaginis imbricatis scapo paniculato
corollis que punctatis Len. L.V. p. 010

Hellebonne ramosissima, cauliculis et floribus maculosis Plum. Amer

Spec. g. 4c. 187.

Habitat in America ?

puncifolium E. foliis subulatis sulcatis, scapo petalisque punctatis: Labio immo-
culato dilatato Lin. S. V. p. 110.

Helleborine maculosa, foliis punciis et sulcatis Plum. spec. 9. ii. 104

Fig. 2.

Habitat in America 4

seuamo lanceolato ad basin. Folio angusto scapo brevem
pedunculus pedicelli et petala punctata. Nectarium impuni-
tatum labium transverse lateribus rotundatis subtrilo-
bium laciniis intermediis mucronata Plum.

scriptum L. foliis ovato oblongis trinerviis, floribus racemosis maculatis

Lin. S. V. p. 019

Angraecum scriptum Rumph. Amb. 6. p. 95. t. 42.

Habitat in India

non vid.

retusum & foliis linearibus apice bifariam retusis, floribus racemosis maie
latis Lin. S. V. p. 119
Cingali - maravaa Rheed. mal. 12. p. 1. & 1.
Habitat in India

non vidi

amabile & foliis late lanceolatis arenis, petalis lateralibus orbiculatis.
Lin. Spec. pl. 1351. * L. V. p. 814.

Angrocum album majus Rumph. Amb. 6. p. 99. t. 43.

Habitat in India.

Radices crasse funiformes. Folia Peani f. scilla officinalis
lata, lanceolata, carnosae, semipedalia. Culmibus bipedalis
nudus ~~erectus~~ cinctus squamis aliquot acutis brevissimis.

Flores nivesi. Ombidi Stefano omulio f. magnitudine raris
si: petala 3. 2. lateralibus orbiculata reliqua ovata. Qui-
bus alter triphyllus: lateralibus oblongis intermedio bipato,
bifido setis duabus subulatis. Lin.

cochleatum & foliis oblongis geminis glabris serratis, scapo multifloro, nectario
cordato. Lin. S. V. p. 219.

Hellebonie cochleato flore Plum. Amer. spec. g. 4. 109. fig. 2

Vifum radice bulbosa minus, delphinii flore rubro speculo Sloan.
herb. 1. p. 250. tab. 121. fig. 2.

Vifum canyophylloides, liliis albis foliis floris labello brevi purpureo,
ceteris petalis & luteo virentibus Cat. herb. Carol. 2. p. 100. Tab. 100.

Habitat in America.

tuberosum & foliis lato-lanceolatis nervosis membranaceis, scapo vaginato
necitano cymbiformi bifido Lin. l. V. p. 019

Helleborine purpurea, tuberosa radice Plum. per. Ic. 106. fig. 2.

Agrostis terrestris primum Rumph. Amb. 6. p. 112. tab. 52. fig. 1

Habitat in Andis

colta bulbo innata.

non vid.

rupellum & ^{Camizolaria} foliis enjiformibus subcarnosis, scapo paucifloro Lin. Sp. pl. p.
1352 * Mant. 497. S. V. p. 814.

Habitat Surinami

longitudine fere scapi
Planta pallidioris. Folia lanceolata. Scapi inter singula folia solitarii
adpressi 2-4 squamis parvis. Flores terminales 1-2. Petala 3 superiora patentia
patentia oblonga supremo minimo. Petala duo interiora dentata
Calyx trifidum lobis lateralibus subcordatis: intermedio majore bifido
do Lin.

capense L foliis imbricatis bifariis linearibus obtusis, flonibus secundis, cornu
Congis primo den - Suppl. pag. 407
Habitat in Cap. b. p. ei

~~opheo~~
~~glossoides~~ & caule unifolio, floribus racemosis secundis Lin. S. V. p. 114

Yacq. Amer. tab. 133. fig. 2. Pl. amer. p. 290

Helleborine ophoglossa similis Plum. spec. 9. t. 176. fig. 3.

Habitat in America

Planta pollicaris. Stolonum caulinum canaliculatum, ciliatum
integerrimum, coriaceum rigidum, planum, nitidum, 2-3 polli-
cari. & ex apice pauci spadicis tres vel quatuor sulci super prodeunt
foliis paulo longioribus, decemflori, basi spatheis paucis. Flores
minuti

longiflorum Schw

rufifolium & caule unifolio, floribus & sinu folii aggregatis Lin. l. V. p. 214
Jacqu. Amer. 133. fig. 3. Pl. Am. p. 240.

Helleborae rufi majoris folio Plum. prec. 9. t. 17 6. fig. 2.

Habitat in America 2

Caulis simplex terminatus folio unico ovali, ^{canalicolato} acuminato
coriaceo, rigido nitido, quod non pollicari, leviter conniventi
avenio. In cupis sunt tuberculum & quos pedunculati Jacq.

Geminifolium & caule unifolio, floribus e sinu folii geminis Lin. S. V.

p. 219

Helleborus graminea repens biflora Plum. Jac. 9. Ic. 176. fig. 1.

Habitat in America

~~Reliqua species sequi addendo~~

non vid.

Caules unifolcati
Miconanthum L. folio lato lanceolato, racemo longissimo feli formi, floribus subro
Andis hexagonis Sw. prod. p. 125

Habitat in Jamaica 74

Caulis vaginatus foliorum superne sessile subpithamum

racemiflorum & foliis ^{ellectis} ovatis, racemo foliis longiore, floribus secundis, petalis inta
rioribus ovatis W. prod. 125.

Habitat in Jamaica?

Pedunculis filiformis foliis bi sive tripollicari

alpestre E. folio ^{oblongo} ovato lanceolato, racemis laxis, capfulanum carinis mucronatis

Sw. prodr. p. 125.

Habitat in Hispaniolarum

filiformi

Planta pusilla folium pollicare racemo brevior

Latum & folio oblongo, racemo longitudine foliorum, interioribus petalis subulatis,
labio ovato, capsulis nudis Sw. Prodr. p. 125

Habitat in Jamaica

Caules 3-4 pollicares folia interdum geminata sed un-
tuli gemini filiformes

ovale ϵ folio ovato acuminato, racemo adpresso multifloro, petalis subrotundis, in
venis antice basi remotis, capsulis pedicellatis Sw. prodr. p. 125.

Habitat in Jamaica?

folia pollicaria attenuata glauca. Caulis filiformis
pedunculi capillares 2-3-4.

pulehellum & folio subrotundo acuto, racemo laxo paucifloro, petalis acumina-
tis ciliatis, interioribus apice emarginatis Sw. prod p. 125.

Habitat in Jamaica 2

planta pusilla

Cochlearifolium L folio orbiculato convexo concavo, racemo paucifloro in pro
pag. 126.

Habitat in Jamaica.

Planta pusilla pollicaris caulis pilosi vagina ovata

Aphylla

funale & filiforme radicans: pedunculo bifloro, labio bilobo, corne longis
fimo tubulato, Sw. prod. 126

Habitat in Jamaica?

non vid.

Liliiforme E. liliiforme radicans; pedunculis sub 3 floris, labio ovato, cornu
brevissimo, apice capitato Sw. prod. 126
Habitat in Hispaniola 4

Ensatium L. *scapotecti* Levi, foliis ensiformibus striatis, petalis lanceolatis
glabris. labio recurvo latiore Thurb. fl. japon. pag. 29 &
Ran. Kumpf. Am. ex p. 263.

Epipendium ensifolium caule tereti Levi, foliis ensiformibus
striatis, petalis lanceolatis glabris, labio recurvato latiore
Lun. Spec. pl. pag. 1352 & P. V. p. 219

Habitat in Japonia

Solia canaliculata striata erecta. ^{bipedatis} Scapus inferne geniculatus
longitudinem bracteae inferiores vaginantes gemmulae superas
res lineares concavo ferrugineo saepe minores. *Solia* calycis
trineae aequalia viridi lutea oblonga plana intus rubro striata
Corolla tripetala inaequalis. duae superiores calycis prothalamium
aequalia erecta. infernum oblongum: margine a basi
ad medium exstante cum lacuna media longitudinali.
apice deflexum obtusissimum purpureo maculato lon-
gitudine calycis. Antherae duo sub stigmatibus apice insertae
stylus curvus. dorso convexus flavus antice concavus un-
guiculari. Capsula cylindrica tota longitudine calycis
Thurb. l.

Epipendium

corollae imperibus racemosis foliis ensiformibus complicatis

Stratum cum floribus imberbibus racemosis, foliis ensiformibus
Do-Ran Kumpf. Am. p. 063. 064.

Habitat in
Lemodorum *Stratum* scapo angulato glabro, foliis ensiformibus nervosis
petalis lanceolatis: lobis oblongo plano Thunb. fl. Jap. pag. 204
L. V. pag. 016.

Habitat in Japonia

Folia radicalia, 4. 5. nervosa glabra inaequalia spithamea pollicem
lata. Scapus angulatus glaber longitudine foliorum. Flores cer
anei. Folia calycina ovata, concava aequalia. Petala 2 superio
ra ovata aequalia longitudine calycis lutea linea purpurea.
inferius tripedum laciniis laterales rotundatis albo stris pur
pureis. media longior, concava, alba basi purpurea.

Epidendrum