


Epidendrum[?]

Epidendrum a Pyanis ex insula Trinitad floribus secundis, bulbi uniflori
est rospum Rich.



2
min- Epidendrum

Epidendrum moschatum

pag. 92. Tab. 26.

Habitat in arboribus Rangoon.

Caulis fruticosus, crassitie digiti minori, radicans, scandens; foliatus; vaginatus, articulatus; ramosus: rami strictius cauli, foliati, eximie fructu, oxygales. Folia ramosa plura, alterna, bifaria, patentia, vaginantia, lanceolata, in tegemina, nitida, subtus fusca maculata, venis longitudinalibus striata plana, carnosae, internodius multo longiora. Vaginae adpressae, striatae. Racemi oppositifolii, simpliciter, rami foliosae breviores. Flores flavi; odoratissimi maxime periparva utroque. Bractea ad basin singuli germinis. Petala 5, parva venosa: una exteriora lanceolata, obtusa, duo inferiora basi gibba, coeacta. Duo interiora, latera, longiora, ovata. Neitaniun apice breviora, ad basin acuminata, carnata, desuensi in laminam asurgentem, unguellatam, intus pilosam. Scleranth brevissimus subulatum, a parte summa neitani portice inter cornua, anatum, umbraculum supra gibba, subtus bifoveatum per antheras 2, parvas, in foris umbraculi. Germin longissimum teres. Stigma foeca subrotunda mellifera, antea inter cornua superiora neitani extarata densius in canalum ad germin penetrantem, a curvatura antheris vel ^{obtusae} vili separatum.

difforme Epidendrum

Habitat *sub La Mantia*
Caulis plures, erecti, pedales

Habitat in Zeylona König in fylis cinnamomeis subuliginos, minus frequen-
Cal: superior, 4-partitus; lacinia dorsalis major, apice bifida. Corolla monopetala irregularis
tubus vix ullus: limbus 4-partitus; lacinis duo anteriores obcordata, plano, patentes, majores,
duo laterales obcordata, plano, patentes, dimidio breviores, omnes nervosae. Tuba
dorsalis corollae glandula oblonga viridis unita. Stamen cum stylo unitum veluti
claudens; recurvatum intra fessuram corollae, planiusculum, versus apicem articulo
notatum, glabrum. Anthera plana, utrinque obtusa, filamentum duplo latior, pagina
superiori fertilis. Pericarpium capsula lineans, obtusa, vix sulculis notata, bala-
culans. Semina numerosa, angulosa, ferruginea König

Lobelioides Gynandron

rapens Epidendrum

Habitat herb. Guaf

E. Trichocarpis affine. Caules saepe sesquipedales, compressi, vaginati foliorum ter-
ti, umbicati. Vagina truncata, margine inferne saepe fusco striata. ^{sup}superne in-
terdum ramo uno alterove brevi. Folia brevissime petiolata, vix pollicaria,
lineana, basi subcordata, obtusissima, emarginata. Flores non vidi
aliud specimen (habeo feta) folius oblongis in unguiculis caulis aggregati
et 4ava

rigidum Epidendrum

Habitat

herb. Guaf.

repens. Caulis compressi, simplicis, flexuosi, vaginati. Folia semipolluciana, oblonga. Flores laterales.

Spathulatum Epidendrum.

Habitat herb. Guaf.

Caulis inferne vaginatus. Vagina arcta. Folia tripolliciana, lineari-lanceolata, vel oblonga, emarginata, crassa, striata, obtusa. Pedunculi laterales, simpliciter teretes, adpressi squamis ovatis, remotis, aridis. Flores secundi. Fructus turbinatus pollicari, sespiter.

menutum Epedendrum

Aubl.

Habitat in Guiana Aubl. in Antillis herb. Surinam. apud Turf.

Planta semipedalis -

Tomentellum Epidendrum

Habitat in Tava Reddimerf. herb. Gussf.

Caulis erectus, simplex, vaginis vestitus. Folia sessilia, quadrifollicularia, lanceolata, acuta,
glabra, subtilissime striata. Vagina tubulosa, truncata. Pedunculus terminalis, 5 polli-
cari, tomentoso incanescens, uti pedicelli. Bractea parva, lanceolata. Flores minu-
si, extus villosi.

oppositifolium Epidendrum

Habitat in insula Bostonia Commerson herb Thourii

Caules teretes. Folia alterna, disticha, bipollicaria, lineari-lanceolata, emarginata, dente altero parum longiore, unguem lata, striata. Scapi oppositi foliis semipedales, ascendentes, teretes, glabri. Spatha brevis, truncata, membranacea. Flores distantes, breviter pedicellatae.

Epidendrum

Habitat in America Herb. Desfont.

Caulis compressus, superne vaginatus. Folia sessilia lanceolata, pithamora
multinerviâ, glabra, acuta; Squama lanceolata, superna, albida, distincta.
Folia feminea lanceolata. Racemus terminalis simplex, sive floris
pedicelli bractea longiore. Petala sive lanceolata, aequalia

Epidendrum

Habitat in Tava Comerson Herb. Mus.

Caulis plures, erecti, simplicis, fere pedales, sulcati a folio ad solum flexuosi,
vaginae secti. Folia sespilia, sesquipolliana, lanceolata, acuta, striata, glabra. Vaginae
truncatae. Racemi terminales, 7-8 flori, an simpliciter? pedunculi filiformes: pe-
dicelli remoti, pollicares. Bractea subulata, brevissima. Corolla dilute purpurea,
postice callosa. Calicis obtusissimum breve, falcatum. Petala oblonga. Nectaria
lobium bipartitum: lacina oblonga, crenata.

biornatum Epidendrum

Habitat in insula Francia Comerson herb. Fus.

Radices crassitie pennis asperas, albae, simpliciter, longae. Folia radicalia, petio-
lata, bipollicaria, oblonga, striata, acuta, glabra. Petiolus squamis lanceolatis
vaginatus. Scapus spithameus, simplex. vaginis duo vel 3. remotissimis, vagini-
cularibus, lanceolatis, acuta. Racemi terminaliter, gemini. Flores distantes,
bracteas subulatas. Corolla postice cornu brevi obtuso, utraque cornu brevi
setaceo.

Triflorum Epidendrum

Habitat in America herb. fus.

Solca radicalia, ovata, acuta, subtilissima striata, margine membranacea, pollicaria.
Scapus simplicissimus, pediculis erectis, vaginatus squamis nonnullis, remotis
lanceolatis, inferne 4 ser. Flores ^{pedunculati} 4 ser, tri-pollicares; dispersos. Petala 5 que, lanceo-
lata, pollicaria, utrinque attenuata, aequalia. Labium oblongum crenulatum,
petalis peris brevia.
in Plumero non invenio

Cauda muni Epidendrum

Habitat in Madagasco Com meson herb. Guss.

Caules plures, digitales, secti foliis, varminati spica spithamon. Folia lanceolata,
pollyciana, obtusiuscula, compressa, inferne conduplicata. Racemus tenax, tri
pollyciani, varminati. Flores conferti. Bractea subulata, hinc racemus apparet
fatis adhaerens. Flores minuti.

credo quod habes

bulbifolium Epidendrum

Habitat in insula Trinitate Commes. herb. Mus.

Radices longae, repentes, emittentes bulbi, remoti, pentagoni, oblongi, perispermici.
Folia gemina, lanceolata, sessilia, obtusa, emarginata
cuneata, pollicaria. Flores non vidi.

Filicula Epidendrum

Habitat in terra Comens. herb. Guis.

Bulbi plures, aggregati, cylindrici, attenuati, angusti. Folium unicum
ex apice bulbi, tri-pollicare, spatulatum, lanceolatum, nervosum, striatum
acutum. Scapus solitarius, ex apice, basi cum folii vagina 2-3 oblique
truncatus, ardis cinctus, filiformis, simplex, pedalis, nudus. Racemus
terminalis, elongatus, flores frequentes, parum distantes. Bractea lan-
ceolata, parva, longitudine pedicelli. Flores parvi. Petala lanceolata
lobum spatulatum, acuminatum

Epidendrum.

Habitat in insula Trinitate Commes herb. Guaf.

Bulbi plures, contigui, ovati, pessi duplo majores. Folia solitaria, lanceo-
lata, in petiolum attenuata, acuta, glabra, aserrata. Scapi ex apice
bulbi, solitarii, ex eodem bulbo ac folio, ancapites, altitudine folii. Racem-
mus terminalis, floris plures. Bracteae subulatae, longitudine floris
Capsula obcordata marginata.

Epidendrum

Habitat in Madagascar Commes-herb. Huof.

Bulbi plures, vixi flavescentes, aggregati, magnitudine pruni. Solum
unicum, subsessile, vix pollicare, lanceolatum, obtusum, crassum. Scapus
lateralis, semipedalis, erectus, solitarius, simplicissimus. Squama vaginantes,
tubulosa, remota, oblique ^{obtus} truncata, unguicularis. Spica terminalis, tri-
pollicaris, subumbicata. Bractea lanceolata, purpurea, longitudine capsu-
lae, glabra. Flores parvi. Capsula semiuuicularis.

Clypeola Epidendrum.

^{Boottii}

~~Habitat~~ herb. Musci

Petiolus, uti prope basi vaginis membranaceis tecti. Folia cordato-subrotunda
nervosa, subvenosa, palmata. Scapus altitudine folii, simplicis simis.
Flores racemosi

myofurc Eudendrum

Habitat herb-myofur-

bulis linearis, basi vaginatis, in pollicibus, obtusa. Scapi filiformes, spithamei,
simplices, statim fere a basi florescenti. Flores minuti

teretifolium Epidendrum

Habitat herb. musci

Folia radicalia, teretia, tripollicana. Scapi erecti, remota ramosi; articulati;
Venter, sulcati: Articuli in medio gibbosi. Racemi laterales. Flores distincti.

umbellatum Epidendrum

Habitat herb. musci

Caules repentes, vaginati: vagina in fetis dissoluta, teretes, apice compositi, simpli-
cissimi. Bulbi oblongi, remoti, truncati, vix pollicares, solitarii. Folia exopi-
ca bulbi, petiolata, elliptica, obtusa, nervosa. Petiolus unguiculari.
Stipites teres, semi pedales, a basi bulbi, solitarii, nitidi, articulati, articulis
remotissimis. Vagina angusta, unguiculari, arcuata ad singulum articu-
lum.

Squamatum Epidendrum

Habitat herb. musci

Folia nulla. Scapus simplex, versis, pedalis, glaber, basi infractus. Squama
inferna ovata, sequenter lanceolata, cartilaginea remota, unguiculata, vagi-
nantia, ligula lanceolata vermiculata. Flores racemosi.

Fasciola Epidendrum.

Habitat herb. musci.

Totia radicalia, aggregata, suthamosa, concava, linearia, flexuosa. Scapi
plures, simplices, pollicares. Flores distantes, minuti. Squama ovata

Cautam nale Epidendrum

Habitat herb. massi

Caulis simplicissimus, inferne a vaginis ^{vag} ~~at~~ ~~stis~~, fetose, ~~simplex~~ ^{spittamoi}, vaginis
foliorum vestit. Dolea linearia, acuta, bipollicaria. Racemi compositi

Corymbium E

Habitat in yellow cliff Inf. H. Anici in cacto compresso parasiticum
D. D. Richard

album Cyp. foliis ovato lanceolatis caulini, petalis obtusi Hort. Kew

3. p. 203. Parki botan. magaz. pag. 216

Helleborine calice lobis duobus, manana, flore gemello candido,
venis purpureis striato Pluch. mant. 101. t. 410. fig. 3.

Habitat in America septentrionali.

Radix fibrosa

Cypripedium spectabile corollo labio ~~obtus~~ ovali basi
reverso concavo subtus canna obtusa, inferius
petalis obtusis longior Salust. in Lin. Trans. 1. p. 70
Tab. 3. fig. 3.

Hellebori

non vid.

hui quoque revocatur a Salust. Helleb. etc. Moni 3. p. 12. t. 11

umbellata Abronia L. Mark T. En pag 469 T. 108

Habitat in California

Flores capitato umbellati

Distichum. Epid est Epid. bifera Act. hist. nat. Paris. herb. Musch

~~Lyg...~~

non vid.

~~Lyg...~~

parviflorum

~~P. corolla labio superiore sagittiformi, basi deflexo
subtus canna anguste canaliculata, inferiore petalis
breviore compresso Salub. in Act. Soc. Lin. t. pag. 77. Tab
2. fig. 2. *~~

~~Hellebomii caliculus. Dula, manana caule folioso,
flore luteo minore Plukn. mant. 101. tab. 410. fig. 2.~~

non vid.

flos aëris E. caule tereti ramoso, foliis lanceolatis petalis lineari-
lin. l. v. p. 117. Act. upf. 1740. p. 37.

Notong gung Kompf. Am. 060. t. 069. fig. 1.

Habitat in Java

Petala linearia extrosperum lobosa curvata

florum tantum vid.

vanilla α foliis ovato oblongis nervosis sessilibus caulinis, cinnhis spiralis
Linn. S. V. p. 817, Act. Ups. 1740. p. 13.

Lobus oblongus aromaticus Clus. hist. exot. 72.

Lobus aromaticus subfusus terebinthi corniculis similis Bauh. pin. 404

Vanille merian Jun. 25. t. 25.

Vanillas piperis arbori jamaicensis inna pens Pluk. alm 381. t. 320.

fig. 4.

Vanilla flore viridi et albo, fructu nigricante Plum. gen. 25. t. 100.

β . Epidendrum caule scandente verti subramoso, foliis lanceolatis,
petalis lanceolatis Act. Ups. 1740. p. 37.

Angureh. Warma Rampf. Am. 867. t. 869. fig. 2.

Habitat in India utriusque arboribus

in herbar. desidentur

Scandentia

Claviculatum & Caule tereti ramoſo, foliis ſeſſilibus ſemiamplexicaulis acutis in
canis recurſis rigidis Sw. prod. p. 120

Corsi affinis, ſcandens plantaeſphylla Boen. bot. 1. 8. 224. 3-4.

Habitat in Jamaica; Hispaniola &

~~in herb. Scandentia~~
non vidi

Tenui folium & foliis caulinis serrulatis canaliculatis Lin. S.V. p. 010

Therou-mau-maravani Rheed. Mal. 12. p. 2. Tab. 5.

Habitat in India

non vid.

spathulatum & foliis caulinis oblongis alternis, obtusis acuminis, nectari labio
bifido divaricato Lin. S. C. p. 118.

Ponnampon - manava Rheed. Mat. 12. p. 7. tab. 3.

Helleborice amplissimo folio vano Plum. spec. 9. t. 100 fig. 2.

confer Vipum caryophyll. etc. Cat. esp. Carol. 2. p. 60. 4. 60.

Habitat in India

Caulis bipedalis vaginis foliorum arte vestis, aq. obscure
angulatus. Folia sesquipollicaria, crassa nervosa, emarginata,
rigida. Flores internodii duplo longiora. Flores in pediculis
semipedalis, remoti.

an americana Plum. ead. en

nervosum Epidendrum

Stadefiantha nervosa scapo uniflora Lin. Mant. 223

nervosa Tradescantia

gibbosum Epidendrum

Habitat in Java Commeson.

in Spathulatum refert Epid. 100 Plum. ic. fig. 2.

Flores basi gibbi purpurascetes interius in medio umbone magni
netalis lanceolatis inaequalibus nonnullis lateoribus

Caulis squamulis crassitie perno cyrea vaginis nervosis
Folia lanceolato elliptica obtusiuscula bipollicaria et ultra
multinervia

Spathulatum esse videtur

elongatum Epidendrum

Epidendrum elongatum Jacq. coll. 3. pag. 260

Habitat in pascuis gramineis ad Casaias

caespitosa. Caulis plures erecti 3 pedales, crispis culmi verticis.
Flos de purpurascens foliosi. Tota oblance oblonga integerrima
arseni nigra crassa, coracca patentissima 3 pollicibus Sagina
amplexicaulis striata caulis supra folios elongatus pedalis spathe
obtusius terminatus supra truncati floribus flos de muniti
ti. Petala lanceolata acuta duo interna basi angustata
Nectario lobum inferius 3 phyllum. folios medio bifido lobis
uti foliolis lateralibus inverse deltoides ore superiore ciliato
dentatis lobum superius nullum. filamenta 2. Anthera gemina
in funiculo filamentis in catulis striatis 4 loculari recedens
Pappulo oblance Jacq.

Scabiatur mihi de Jacq. An

non vid

Simplexima *Cercia* Lour. fl. Coch. 510.

Habitu pauciflora in rupibus et attonibus Chinae et Cochinchinae.

Radix fibrosa. Caulis simpleximus. ~~Floribus lateralibus~~ 1 pollicari
anis erectis, antepedunculatis, glabris, luteis. folia oblonga, emar-
ginata, plana, crassa, vaginantis, erecta, parva, pauciflora
terminalis, peltatis, erectis, pedunculatis: medio latere
cornu, corollae horizontaliter infidens germine. Spatha bre-
vis laciniata 1 flora. Cal. (phyllis) tubi corollae inaequaliter spi-
dit. Cor. corneiformis super: parte altera subulato-tubu-
lata longiore. altera brevior edentata spida: laciniis 3 lato-
rionis: bini alii lateralibus linearibus omnes aequales
Nectarium parvum polyfidum inaequale. filamentum,
filiforme breve, elasticum, pistillo adhaerens. Anthera compres-
sa subrotunda loculari opericulata. Germen inter perianthi-
um et corollam, lineare, curvum, bifidum. Stylus brevissimus
basi lacinae medio nectaris, simul cum stamine adnatus
super germen. Stigma obsoletum. Semina abortientia

Herba simplex quata Rumph. amb. lib. 11. c. 9. p. 111. tab. 51
fig. 2. huic valde similis
non videtur

Epidendrum

amabilis Calista Lour fl. Coch pag. 519

Habitat in Cochinchina parasitica arborum.

Bulbi lineares, intricati. Caulis sesquipedalis ^{sub} erectus, crispus, dens-
sulcatus, ad basin tumidus. Folia lanceolata, integerrima, serrata,
crassa, dura, apice reflexa alterna vagrantia. Racemi laterales
longi recedenti simpliciter. flores candidi. Squama sub prozulo
flores ante floriferam imbricata petala 2 latiora. Nectarium
bipartitum magnum autem, infra basin petalorum receptaculo
inserta. Labio interiore oblongo carnosio, basi bicornis: exteriore
tuberculato, integerrimo villosa magno in formam infundibuli
convolutum. filamentum. subulatum, planum breve apice
nectari insertum. Anthera operculata biloba, lobis oblongis
compressis nitidis. Germen contortum filiforme reflexum. Stylus
et stylus nullus nisi filiformis ne clavis. Semina abortientia

Emendandum

non vid.

centropeda ~~Pris~~ *Thonnespermum* Lour. fl. Coch. pag. 520

Habitat parviter repens arbori in Cochinchina.

Caulis lignosus compressus perennis. radice simplicis brevissimi. folia lanceolato-linearia integerrima reflexa glaberrima parva vaginantis. Specie amentiformis vixit
lateralis. Cal. communis amentiformis linearis compressus carnosus. squamis alternis diutis / flori penantibus.
Nectarium bipartitum inter duo petala infera receptaculo affixum: Labio interno trifido intra petala receptaculo laciniis lateralibus obtusis brevibus media longiore conica adpendente. Labio externo ovato integro extra petala infera exserto. filamentum 1. brevissimum adhaerens.
Anthera ovata biloculari operculata. Germen filiforme inferum. Stylus crispus basi nectarii inserto. Stigma simplex Capsula oblonga trigona 3-valvis / loculari polyperma

Epidendrum

non vid.

odorata Aendes Lour. fl. Coch. pag. 525

Habitat pendula ex arboribus Cochinchinae et Chinae.

fruticosa peripetua. bulbi lineares longi intricati. Caulis sub erectus, pedali. folia lineana emarginata magna crassa subnervosa. petioli breviter vaginantes. racemi axillares longi villosi flores pallidi suaves lentes. Spatha ovata parva. Petala 5 ovata, plana subaequalia. Nectarium 2 phyllum latro interiore horizontali oblongo carnosio, con cavo. exteriori operculiformi incurvato hinc tubuloso attenuato adpendente, inde dilatato, 3 fido. Lacinus laterales obtusi media conica brevior. Stamina filamenta 2. brevia, elastica apice nectarii interiori adhaerentia. anthera lenticularis operculata. Germen 3-locum tenue incurvum inferum stylus 0. stigma fossula minut

non vid.

Enderbura

articulatum Epidendrum foliis lanceolatis, floribus racemosis

Herba simplex quanta Rumph. amb. 6. p. 105. Tab 47. fig. 1

Epidendrum articulatum: caule articulato dependente radicante
foliis lanceolatis, nervis cymbiforme Burm. ind. 109

Habitat in India orientali

Caules pedales vaginis striatis. Folia bipollicaria coriacea
emarginata denticulo altero ubi omnibus foliis emarginatis
brevioris racemus terminalis facie spatulati et flos minor
figura monilifera

Furum E *caulescens*, foliis imbricatis lanceolatis, racemis axillaribus

Sept. 1. S. pag. 810

Thalia maritima Rhed. mat. 12. 75. Tab. 4.

Angroicum octavum f. *furum* Rumph. amb. 6. p. 104. 7. 105. fig. 1.

Habitat in India 4

non redi

Coccineum & foliis caulibus ensiformibus obtusis, pedunculis unifloris axilla-
ribus confertis Lin. S. V. p. 110. Biqu. Amer. 4. 135. Pl. Am. p. 205

Helleborie coccinea multiflora Plum. pec. 9. Gc. 100. fig. 1.

Habitat in America 4 bulbi subrotundi, compressi, globosi ad latera ^{caulis}

Caules plures vix pedales: folia ex bulbo, radicalia et cauboni
subensiformia emarginata obtusa avenia, nitida, crispula
glaberrima, basi conniventia, superne plana 4-6 pollicares

Pedunculi filiformes tenelli, bipollicares, uniflori axillares

8 loc. pollicares, bini vel terni, spathe paucis et vaginantibus vestiti: Petala
orato acuminata concava. Nectarii labium inferius lanceo-
lato-cordatum rigidulum, pubescentum

Caules vaginis foliorum vestiti, imbricati. Folia spithamea, lanceo-
lata, frenata, acuta herb. Surinam.

secundum E. foliis caulinis oblongis, speciosis secundis, nectari tubo longitudinali
corolla lin. 6. V. per. D. P. Jacq. Am. tab. 137. Pl. Amer. 285
Helleborie purpurea umbellata Plum. spec. 9. 4c. 104. fig. 1.

Habitat in America.

Planta bipedalis. Caulis teris glaber. Folia emarginata, nitida,
coriacea, avenia, rigida, amplexicaulia aeterna disticho-
tere tripolliciana, atroviolacea rubore cori suffusa. Spatha in-
feriore in parte spadicis nuda, vaginantes, superiores sepals mini-
moque. Spica longa laxa, sciunda. Flores pollicares. Nectari
labium inferius trifidum: lacinia media subrotunda, concava
emarginata, ascendente, tubo duplo brevior: lateribus
emarginatis conniventibus, paullo minoribus.

Lineare & foliis caulinis linearibus obtusis emarginatis, caule simpliciter saepe
Amer. tab. 131. Lin. t. 16. Plant. Am. pag. 203
Helleborus tenuifolius repens Plum. spec. g. fr. 102. fig. 1.
Habitat in America 4

Caules teretes pedales, apice vaginati vaginis foliorum persistentibus
tortis. Calicis sepala quatuor basi caulem vaginantia glabra
nitida distincta. Flores purpurei parvi in spica quadriflora
laxa. Petala ovato oblonga subsaepe acuta creta
tria exteriora paulo latiora. Nectarium minus. Labium supe-
rius oblongum, apice cucullatum petalis brevius. Labium
inferius tertio petali interiori figura saepe

biflorum L

Epidendrum biflorum foliis distichis linearibus lanceolatis acutis,
pedunculis bifloris solitariis vaginas foliorum perforantibus, ne-
ctariis lobis trifido acuminatis Torr. prodr. p. 60.

Habitat in Insula Societatis 4
Caulis sesquipedalis teris striatus. Folia graminea attenuata
4 pollicaria. Flores ab altero latere parum infra apicem
vagino.

Guttatum L. foliis lanceolatis canaliculatis, petalis cuneiformibus retusis
Gen. l. v. pag. 810

~~Helleborine foliis carnosis carnatis et fimbriatis Plum. spec. 9. Fi. 102.~~

~~Fig. 2.~~

~~Viscum delphinii flore albo guttato, minus, radice fibrosa Sloan.
hist. 1. p. 251. tab. 140. fig. 2.~~

~~Habitat in Jamaica.~~

~~Caulis ^{foliosus} ~~foliosus~~ imbricatus vaginis foliorum ^{canaliculata} ~~oblonga~~ oblonga
obtusis punctatis. Folia approximata ~~eniformia~~ ^{eniformia} acuta
plusquam pedalia. Pedunculus radicalis basi imbricatus
squamis duobus punctatis, articulatus foliolum lanceolatum
et unguiculare ad singulum articulum. Racemus com-
positus ^{petalis oblongis} Petala difformia uti pedunculi et bracteae puncta-
tate Plum. desin. ~~pedunculata punctatum~~~~

punctatum
guttatum

L. foliis lanceolatis nervosis vaginis imbricatis scapo
paniculato corollaeque punctatis Lin. l. v. p. 810

Helleborine ramosissima, cauliculis et floribus ramentosis

Plum. spec. 9. 4. 107

~~St~~

Habitat in America

non vid.

caudatum & foliis lanceolatis nervosis, spica paniculato: petalis maculatis
caudatis: duobus longissimis Lin. S. V. p. 810.

Helle bonnie ramosissima, caulis et floribus maculosis Plum. spec. g.

4c. 177.

• Habitat in America 4

non vidi

ovatum & foliis caulinis ovatis acutis amplexi caulibus nervosis, Rapis panicu-
latis Len. I. V. p. 110.

Arantali - maravara Rheed. Mal. 12. p. 15. t. 7.

Herba simplex major secunda Rumph. amb. 6. p. 111. t. 51. fig. 2.

Habitat in India

Caule folioso erecto

ramosum E - caule ramosissimo suffrutescente, foliis linearibus emarginatis,

racemis terminalibus compressis Sw. prodr. p. 120.

Epidendrum ramosum Jacq. Am. 221. t. 132.

Habitat in Jamaica

~~non vidi~~

nubans. Caulis simplicis, foliis ovato-lanceolatis cuneatis complexicaulis, spica
terminali nuda; Calice nectarii tubulo, intermediis tridentato Sw. prodr.

pag. 121.

Habitat in Jamaica.

huius similis E. pauciflori Jacq.

graminioides l caula erecta multiflora foliis distichis remotis linearibus
pedunculis longioribus Sw. prodr. p. 125.
Habitat in Jamaica 4

vomiciforme² caulescens, foliis ovato-acuminatis convexis canaliculatis, subtus
Iniquetris; siapis e finu foliorum sup. pro. pag. 124
Habitat in Jamaica.

vestitum & caule aphylo, vaginis undique imbricato teretibusculo bulbiferis; flori-
bus confertis & vaginis caulinis Sw. prodr. p. 124.
Habitat in Jamaica 4

proleserum & caulescens foliis distichis subimbricatis ovatis, bulbis & vaginis
foliorum distichis, floribus axillaribus sessilibus Sw. prod. pag. 124 -
Habitat in Jamaica 4

glaucum & caule compresso erecto in apice multifloro, foliis undique imbricatis
difficilis lato-lanceolatis glaberrimis subtus glaucis: capsulis nudis

In prodr. p. 124.

Habitat in Yamaica 4.