

Epilobium

1. angustifolium E. foliis ~~oppositis~~^{* Ramenibus dentatis} lanceolatis integrimis venosis, floribus
isoquibus
2. angustifolium E. foliis ~~oppositis~~ lanceolatis obsoletis denticulatis aenius, petalis
isoquibus integerrimis
3. latifolium E. foliis ellipticis lanceolatis subdenticulatis aenius caule
pubescente
- ** Ramenibus erectis regularibus, petalis bifidis
4. hispidum E. foliis lanceolato-ovatis formampliatis caulebus hispido, caule
ramosissimo, radice repente
5. villosum E. foliis lanceolato-oblongis dentatis pubescens caule tereti
formampliis villoso.
6. montanum E. foliis oppositis subpetiolatis, ovatis denticulatis
7. tetragonum E. foliis lanceolatis denticulatis: omni oppositis, caule tetragono
8. palustre E. foliis oppositis lanceolatis integrimis, petalis emarginatis
caule erecto

9. rotundifolium E. foliis oppositis pectinatis denticulatis
10. roseum E. foliis oppositis alterniisque ovato-lanceolatis petiolatis ferratis glabri
11. obscurum E. foliis oppositis alterniisque lanceolatis glabri ferratis basi decurrentibus
12. glabellum E. foliis oppositis oblongi denticulatis obtusis glaberrimi denticulatis obtusis sessilebus; capsulis erectis, caule ascendentem
13. alpinum E. foliis oppositis ovato-lanceolatis obtusis subrotundatis capsulis festi-
bus caule basi replete

Chamoneum alpinum menz. Bonnetto folio Tournes. Grff. r. h. 303 222 La Manche

origanifolium Epilobium
Habitat D. de la Mare

anagallidis-folium Epilobium

Habitat. Herb. Ca Marsh

Satris Epilobii alpini, palmaris vel panum ultra. Stolones procumbentes. Dolia
subrotunda, caulinæ obvfo, integerrima, suprema angustiora, alterna, sa-
mena versu apicem

Eupatorium

Chamoneuron orientale argenteum salicis folio flore magno Tournef. Cor.
Habitat in oriente herb. la Manth.

Radix herbarius; erectus, Tetragonus, superne, ad reliquo planta Vomentosa, in
canescens. Folia simplicia, linearis-lanceolata, pollicaria vel minora, ante
germina. Flores in racemo terminali, brevi, magnitudine *Eup. hispida*. Ca-
lyx laciniis linearis-lanceolata.

Oxyanthemum Epilobium

Habitat Heb-Ruck

Caules simplices, interdum scariosus

robusta

Erythronium

Chamoneuron armenum minime Hypericifolia radice granulosa
Tournef. Cor.

Habitat in Oriente herb. La Mant.

Racemi palmari vel paucim ulti, basi ramosis, Dolia inferiora fleschia,
opposita, suprema alterna, lanceolata, semi-pollucaria, integerrima,
glabra, avenia, acutu. Pedunculi astillares, remoti, folio longiores.

Capsula bipollucaria

vers; ope lenti vellosus.

Chamoneum orientale, minimum, *Hypenii* foliis, *radix* granulosa Tournef. Per.
pag. 2.

Habitat in Clemencia Rob. Tournef.
Palmaris, pedunculi axillares

habeo

angusti folium Epilobium foliis parvis linearis lanceolatis integrernis venosis, floribus inaequalibus Hort. Kew. 2. p. 47

Pseudolysimachium purpureum minus Led.

Lysimachia siliquula alia C. L. h.

Lysimachia chamaenon dicta angustifolia Baub. Pl. 245

Epilobium foliis parvis linearis lanceolatis floribus inaequalibus Lin. S. V. plaz. Elec. Dan. t. 289.

V3. Lysimachia velgo altera Lam.

Lysimachia Planonon dicta latifolia Baub. Pl. 245

Habitat in Europa boreali

Caulis interdum tripedalis teret, glaber, simplicifolius. Folii utrinque acutis glabris pilosulis pallidioribus et venosioribus ciliis linearibus oblongis acutis leopoldia. Racemus terminalis fructuosa. Germena tormentina. Calyx foliola linearis lanceolata longitudine petalorum redicellorum

angustifolium Epilobium foliis magis linearibus obsolete dentate alatis avenuis,
petalis ocreatis integerrimiis Hort. Kew. 2. p. 5
Lysimachia Chamoneenae dicta *alpina* Brach. gen. 245. prod. 116
Epilobium flore deiforme, foliis linearibus Hall. hist. 1001.
Epilobium angustifolium Weber dec. pl. min. cogn. p. 3.
Epilobium angustifolium v. Lin. Spec. pl. p. 494
Habitat in Alpibus Helvetiorum
~~Pauli magis ramosi fere~~
~~Cause seminis procedenti ab Epilobia angustifolia~~
~~irregularis. Flores pauciores, tantum a~~^{fusca}
~~germina et~~ⁱⁿ~~calyci~~
~~caulis leviter pubescens.~~
Epilobium Dodonei all. fl. p. 1016

3. *Catipolum Epilobium* foliis *Pancolato*, ellipticis, sub dentatae, aequali,^{aria}, caule
nu defende.

Epilobum Catipolum. foliis alternis *Pancolato*. evatis floribus uno
quealibus Lin-Spec. pl. 16. n. 4944 P.V. p. 359. fl. Jan t. 563.

Habitat in libera à montana et defende villopi

voxi grati pueris certe per defende villopi
Paulus petram vel gemmatae simplici longiori eructi gracilis perenne
columba. folia lesbia pollucana utrinque acuta evasimula
filii subtilissime per villopi. Flores in racemulo brevi mago oratum
hæc generis. germen canescens.

fruticosum Lepidolum calyle fructuoso ramosissimo, folius integerrimos
alterni hispidois Lour. fl. Cochinch. pag. 226.

Habitat Cochinchina

Ramulus rectus, tereti, 6 pedali. Tola lanceolata utrinque acuta
subpetiolata. flore luteo. Petala profunda emarginata
pedunculi uniflori. Cappula ignea semina non propagata

videtur ase / *Tussocka suffruticosa*

~~as Tussocka~~ ^{as} ~~as~~

Cat-folium Epilob. foliis alterno lanceolato - ovati utrinque mollescens.
Epilobium Cat-folium: foliis alterno lanceolato ovatis Lin Spc. pl.
page 379 Gmel. tab 3. p. 164
Habitat in Siberia

non vidi.

virgatum L. foliis oppositi oblongo-lanceolatis denticulatis - ses plicibus, caule
subterete virgato la Marsh - Ene. 2. pag 175.
an Chamaenelon seculum glabrum major et nitidum amygdalifolium Tournes.

303.
Habitat in Sicilia.

non ad.

origanifolium Epilobium foliis oppositis ovatis ac utri subdentatis caule erecto Lan
Marta Lac. 2. p. 372.

Chamoneuron origanifolii Tenuif. 303

13. caule foliisque pubescens

Habitat in Mont d'or

Paules bas non repentes, cedendum raro si debiles : folia ovatae pubescentes
et glabrae sive origani

non vidi.

alpinum Epilobium foliis opppositis ovato-lanceolatis obtusis integerrimis
flequis sessilibus caule repente Lin. S. V. pag. 359 St. Dan.
t. 322. Light. fl. Scot. p. 199. Tab. 10

Lysimachia pleurosa nana, prae nello foliis Boiss. mis. 2. p. 161. t. 100.
Chamoneuron alpinum, alpine foliis Schneid. alp. 132. 332.
Epilobium foliis ovato-oblongis integerrimis fl. Lapp. 150.

Habita in alpebus helvetiis Lapponicus &

Planta digitalis inferne repens. Folia basi angustiora, inferiora minora
8ericea vel duoterminalis. Cappula longitudine intenden plantae

12 glabellum Epilobium foliis opppositi ovali ^{oblongi} dentatissimis obtusis
glaberrimi seplebus capitulo erectis caule ad pendente.

Epilobium glabellum foliis oblongi dentatus obtusis: imis oppositis,
caule teretiusculo eretto Dorst. prod. n. 160.

Habitat in nova Zelandia linea e basi foliis pubtilissima decurrens
Caules spithamei simplicissimi glaberrimi ut & ota planta. Sola
frequenter dentibus attingue binis vel ternis obtusis, rot unguis
culana crassiuscula ^{angustiora minora} florata alterna. Capitulo feliforme
bipollie arcu breve pedicellati glabri.

"obscureum Epelobium (chamoneuron) foliis oppositi alternisque lanceolatis glabris ferratis bafi decurrentibus Schreb. Spec. pl. Lyp. p. 147. *

Habitat in humido Germania

Caulis teres glaber ramosus pilis raro spinis obtuso. Folia bipinnata
vel, inaequaliter serrata, serrulis apice glandulosis, acuta, ad notabilem a bafi distantiam decurrentia, tandem in lineam utraque per caulem ad proximum geniculum dependentem dependentia, unde carent et rara. Folia summa sessilia. Petala parva, purpurascens.
Germen albo velutinum flores at illares remoti

superioribus floribus ferr. alternis

1010icum Epilobium foliis oppositis alternisque ovato-lanceolatis petiolatis serratis
glabris Schreb. Spec. (Chamoneuron) p. 147.

Epilobium minus flore albo Schmid. opn. Gepr. p. 20. t. 20. fig. 73.

Habitat in humido Germania camopus rami operari

Paulus Vereo, glaber, summitate villosus. Solaia inferiora opposita, elegans
~~florata~~ ^{lutea} ~~lutea~~, alterna, pedicellata, glabra petiolata utrinque acuta
irregulariter serrata a concreta petiolata cinea decolorans unde supercrescit alternum basi
petiolis unguiculatis duplice cinea simili. Flores parvi. Petala dilatatae rufa aut albicans
cenis ^{at glauco} tea venis saturatis horibus. Ryncha cavata in dividit. Germen pulchellum
densum obductum Schreb. l.c.

ellipticas
~~lanceolati~~ serratis glabri inferiores superiores alter
inferiores opp

veneris. foliis magis oblongis caule robustiore rugidore

tetragonum Epilobium foliis lanceolatis dentice latis ~~in~~ ^{im} oppositis, canule tetragono
no Lin. S. V. pag. 359

gymnaethia minor Tabern: c. 854

gymnaethia filiformis glabra minor Baeh. p. n. 245. Ray Hist. 801.

Habitat in Europa

Carolis Bonaparte sum placuisse erectus vel subadpresso ^{aperte} inter flores canescens
fieri superne oculo armatis velli canoribus desuper. Tola poli
conus fimbriam plena ramula acutifolia, ore lenti marginat
losta subtus vellopolis coccineum glabra remotifolia denticula
la floralia alterna linearia. Flores brasi

oppositis glabri

an diversa a palustri, ex specimen a Dr. Lind communicata potius palustre

palustre Epilobium

rotundifolium Epilobium foliis oppositis subrotundis denticulatis Dcft. prodr.

p. 27. n. 161.

Habitat in Nov. Zealandia

non end.

^{polystre} Tetragnatum Epilobium foliis oppositis lanceolatis indecervimis, petalis emarginatis
caule erecto hui. s. v. pag. 359. fl. spec: 86. Dan. t. 347.
Chamoneorum ger.

Aymachia siliquea glabra angustifolia Baum. p. n. 245.

B Epilobium foliis lanceolatis, ramosa florens Lin. fl. caps. 140.

It habitat in Europa humidae in sculis ^{habe redens flumina} B. in alpibus superne ^{ramosus} ~~ramosus~~ ^{ramosissimus}
~~Stellata~~ ^{Stellata} ^{ramosissima} ^{ramosa} ^{ramosa} tener. Sola obsoleta dentata. Petala reflexa
non ad medium non fusa. Silique pedunculata hui. Stola glabra
excepto costa indumenta foliacea rameolorum germina incisa

teretis

6 montanum Epilobium folio opposito pubescenti ovato denticulatis

Pseudolysimachum purpureum primum Dod. pempt. 85.

Lysimachia filequosa glabra major Bauh. Pin. 245.

Habitat in Europa montosis.

Paulus Teres ^{one centris vellosis vel tenuis} mollissimus simplex. folia follicana, glabra nervis vena se.
Lesque follicana, floralia alterna. Alique tri follicares pedunculo
unguis ulani

q hirsutum Epilobium foliis orato - lanceolatis ferrarii completi caulebus hirsutis, caule
ramosissimo, radice repente Hort. Kew. 2 p. 5
Lysimachia purpurea Duckf. Hort. 491.
Lysimachia plequosa hirsuta, magno flore Baeh. Pl. 245.

Chamœnion robustum foliis op-

Epilobium hirsutum foliis oppositi lanceolatis serratis decurrenti ampliati
caulebus lini. L. V. pag. 359

Epilobium ramosum: foliis lanceolatis serratis decurrentibus inferioribus
oppositis, caule ramos. Hud. fl. Angl. p. 162.

Chamœnion fuscum Rumphii & ultra ut folia

Habitat in fossis Rumphii & ultra ut folia
Paulis erectus sequipedalis pilosus ramosus. Folia inferiora ciliis et ramis
conum opposita reliquo alterna, sequipollicaria ciliata ferrarii
majoris quam in sequente. Flores erecti quadriplite majoris
quam in villoso. Corpus pubescens

ferrarii

villosum Epilobium foliis oblongo-lanceolatis dentatis pubescentibus; caule vereti
villoso Hort. Ver. 2. p. 5.

Lysimachia siliquosa II. Tabern. c. 855

Lysimachia siliquosa hispida parvo flore major. Baed. Fl. 245. prodr. 160. Monj
h. 2. p. 270 f. 3. t. 11. fig. 4.

Lysimachia siliquosa hispida flore minore Baed. h. h. 2. p. 906.

Chamoneuron parviflorum

Epilobium foliis longis dentatis villosi, flore parvo Hall. h.

Chamoneuron parviflorum: foliis oppositis lanceolatis serratis pilosis caule
que villosa Schreb. Spec. pag. 146.

Epilobium hispidum: foliis lanceolatis serratis subcurrentibus; inferiori
bus lev. oppositis caule sub simplem Huds. fl. Ang. p. 161.

Epilobium hispidum Linn. Tract. Bot. pag. 494

Habitat in Europa humi dampuli, vel terram adspicere quam herpeti

Pauli simplem spinosum semipedatae folia opposita pollicaria siliqua basi
rotundata. Flores nutantes parvo capitulo glabriusculo.

Denticeulate

simplexis